Health Canada
Santé Canada

TUBERCULOSIS IN CANADA



1997

Canada

101-04880/

Our mission is to help the people of Canada maintain and improve their health.
Health Canada

HOW TO REACH US

For more information, copies of this report or other related reports, please contact:

Tuberculosis Prevention and Control
Centre for Infectious Disease Prevention and Control
Population and Public Health Branch
Health Canada
Room 0108B, Brooke Claxton Building
Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario K1A 0L2

Internal Postal Address: 0900B-1

Telephone: (613) 941-0238
Facsimile: (613) 946-3902

This report can also be accessed on the internet at:

http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc

The following figures, tables and explanatory text were prepared by:

Howard Njoo, MD, MHSc, FRCPC
Director
Tuberculosis Prevention and Control

Penny Nault
Tuberculosis Database Manager
Tuberculosis Prevention and Control

Linda Panaro, MDCM, MHSc, FRCPC
Medical Specialist
Tuberculosis Prevention and Control

ACKNOWLEDGEMENT

The authors would like to acknowledge the Provincial/Territorial Tuberculosis Programs and their teams for their contribution to and participation in the Canadian Tuberculosis Reporting System (CTBRS).

The authors would also like to thank the Document Dissemination Division, Population and Public Health Branch, for its assistance in preparing this report.

Published by authority of the Minister of Health

© Minister of Public Works and Government Services Canada 2000

Cat. H49-108/1997
ISBN 0-662-65226-6

This publication can be made available on computer diskette or audio-cassette or in large print upon request.

TUBERCULOSIS IN CANADA

1997

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 5

EXECUTIVE SUMMARY 7

FIGURES

Figure 1 Reported new active and relapsed tuberculosis incidence rate per 100,000 - Canada: 1924-1997 9

Figure 2 Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada: 1980-1997 9

Figure 3 Reported new active and relapsed tuberculosis incidence rate per 100,000 by age group - Canada: 1982-1997 10

Figure 4 Distribution of reported new active and relapsed tuberculosis cases by origin - Canada: 1980 and 1997 10

Figure 5 Reported new active and relapsed tuberculosis incidence rate per 100,000 by main diagnostic site - Canada: 1987-1997 11

Figure 6 Distribution of reported new active and relapsed tuberculosis cases by origin – provinces/territories: 1997 11

Figure 7 Reported new active and relapsed tuberculosis cases by age group and origin - Canada: 1997 12

Figure 8 Distribution of reported new active and relapsed tuberculosis cases by origin and main diagnostic site - Canada: 1997 12

TABLES

Table 1A Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997 13

Table 1B Reported new active tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997 14

Table 1C Reported relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997 15

Table 2A Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – Canada: 1987-1997 16

Table 2B Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – males – Canada: 1987-1997 17

Table 2C Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – females – Canada: 1987-1997 18

Table 3 Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace – Canada: 1987-1997 19

Table 4	Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by main diagnostic site – Canada: 1987-1997	20
Table 5A	Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – Canada and provinces/territories: 1997	21
Table 5B	Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – males – Canada and provinces/territories: 1997	22
Table 5C	Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – females – Canada and provinces/territories: 1997	23
Table 6	Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by birthplace - Canada and provinces/territories: 1997	24
Table 7	Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by main diagnostic site - Canada and provinces/territories: 1997	26
Table 8	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace, sex and age group – Canada: 1997	27
Table 9	Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group and main diagnostic site – Canada: 1997	29
Table 10	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and main diagnostic site – Canada: 1997	30
Table 11	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and activity status – Canada: 1997	31
Table 12	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997	32
Table 13	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and birthplace – Canada: 1997	33
Table 14	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada: 1997	34
Table 15	Reported New Active and Relapsed Tuberculosis Cases by Bacillary Status and Main Diagnostic Site – Canada and Provinces/Territories: 1997	35
Table 16	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997	39
Table 17	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by method of detection – Canada and provinces/territories: 1997	47
Table 18	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by method of detection and birthplace – Canada: 1997	47
Table 19	Reported new active and relapsed foreign-born tuberculosis cases by birthplace and year of arrival in Canada: 1997	48
Table 20	Reported new active and relapsed foreign-born tuberculosis cases by immigration status – Canada and provinces/territories: 1997	48
Table 21	Reported relapsed tuberculosis cases by length of inactive interval – Canada and provinces/territories: 1997	49
Table 22	Reported new active and relapsed tuberculosis cases and number of diagnoses by main diagnostic site – Canada: 1997	50
Table 23	Reported new active and relapsed tuberculosis cases reported in 1997 who died in 1997, by cause of death – Canada and provinces/territories: 1997	51
Table 24	Reported new active and relapsed tuberculosis cases reported in 1997 who died in 1997, by age group and sex – Canada: 1997	51
Table 25	Reported new active and relapsed tuberculosis cases by HIV status – Canada and provinces/territories: 1997	51

APPENDICES

Appendix 1A Population estimates by sex and age group – Canada and provinces/territories: 1997 52

Appendix 1B Population estimates by Canadian-born origin and foreign-born birthplace – Canada and provinces/territories: 1997. 53

Appendix 2 Active Tuberculosis Report Form – New and Relapsed Cases 54

Appendix 3 Technical Notes 55

Methodology and Data Quality Report 55
Data Collection 55
Data Processing 55
Calculation of Rates 55
Data Quality 56
Other Sources of Information 56

Definition of Terms 57
Tuberculosis Registry 57
Notification 57
Tuberculosis Case Definition 57
Diagnostic Classification 58
Deaths 58
Population Figures 58
More Information 59
References 59

INTRODUCTION

This is the third annual report on tuberculosis morbidity and mortality published by Tuberculosis Prevention and Control following the transfer of responsibility for the Canadian Tuberculosis Reporting System (CTBRS) from Statistics Canada to Health Canada.

The annual reports on tuberculosis morbidity and mortality have undergone and will continue to have revisions in format and content from year to year in response to changes in the epidemiology and treatment of tuberculosis. Changes to the report this year include modifications to the order of main diagnostic site (hierarchy), distribution of foreign-born cases by WHO region, inclusion of immigration status for foreign-born cases and inclusion of HIV status.

Prior to 1966, the reports focused on the characteristics of patients hospitalized in tuberculosis institutions. However, with the discovery and development of new antituberculosis drugs, more and more persons with active tuberculosis were treated as outpatients. Statistics on these patients were then included in annual reports.

To reflect the continuing decrease in institutional treatment, the reports began in 1975 to combine previously separate data on inpatients and outpatients. From 1976 onward, data on facilities and services in tuberculosis institutions were no longer included; since then, reports have presented data on all reported cases of tuberculosis in the population, irrespective of where treatment occurs.

Starting with the 1977 data year, reports were developed cooperatively by Statistics Canada, the Canadian Lung Association and provincial and territorial offices of tuberculosis control, and contained information essential for the surveillance and control of tuberculosis in Canada.

As a result of a review of the national tuberculosis surveillance system conducted jointly in 1996 by the directors of the provincial and territorial tuberculosis control programs and Health Canada, the reporting form was revised for the 1997 data year to include additional information relevant to tuberculosis prevention and control. The principal changes include the addition of data items on the immigration status for foreign-born cases and HIV status (see reporting form in Appendix 2). The annual report format was revised in 1997 to include tables with this new information.

Executive Summary

In 1997, a total of 1,975 cases of new active and relapsed tuberculosis (TB) cases was reported to the Division of Tuberculosis Prevention and Control from the ten provinces and two territories. This number represents an increase of 5.7% from 1996 and is the highest total since 2,074 cases were reported in 1994. New active cases made up the vast majority (90%) of the case notifications in 1997, with relapsed cases accounting for the other 10%.

Seven of the reporting jurisdictions had case rates below the national rate of 6.6 per 100,000 (Alberta, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Quebec and the Yukon Territory) and four of them (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and the Yukon Territory) reported fewer than 10 cases each. The three most populous provinces of Ontario, Quebec and British Columbia, which collectively make up 75% of Canada's population, accounted for 77% of the total number of reported cases in 1997. Compared with the previous year, seven reporting jurisdictions (Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, the Northwest Territories, Ontario and the Yukon Territory) reported a decrease in case numbers and rates. The overall increase in case notifications was due mainly to the increases experienced in Quebec, Alberta and British Columbia.

By age group, individuals aged 25 to 34 years made up the largest number of reported cases, accounting for 19% of the total. However, the corresponding case rate of 8.2 per 100,000 for this age group was surpassed by the age-specific rates of 8.8, 11.7 and 18.0 per 100,000 for those in the older age groups of 55 to 64, 65 to 74 and greater than 74 years, respectively.

Over time, the trends with respect to reported TB cases by birthplace have changed. From 1987 to 1997, the number of cases among Canadian-born non-Aboriginal individuals decreased by 44% (720 to 400 cases) while that among Aboriginals decreased by 26% (384 to 283 cases). During the same time period, the number of cases among foreign-born persons increased by 46% (868 to 1271 cases). In 1987, the proportions of all TB cases that were Canadian-born non-Aboriginal, Aboriginal and foreign-born were 37%, 19% and 44%, respectively. By 1997, these proportions had decreased among Canadian-born non-Aboriginals and Aboriginals to 20% and 14% respectively, whereas among the foreign-born the proportion had increased to 64%. Of note is that 38% of all the foreign-born TB cases reported in 1997 arrived in Canada in 1993 or later.

With regard to the distribution of TB cases by birthplace across the country in 1997, the provinces of Ontario, British Columbia and Alberta each reported that over 60% of their TB cases were foreign-born, particularly Ontario in which the proportion was 85%. In the Northwest Territories, Saskatchewan and Manitoba, TB cases of Aboriginal origin contributed the largest proportion to their respective total caseloads.

When age is considered, Canadian-born non-Aboriginal TB cases were relatively older than foreign-born and Aboriginal TB cases. The median age of Canadian-born non-Aboriginal TB cases was 58 years, while those of the foreign-born and Aboriginal TB cases were 43 and 32 years, respectively.

Overall, respiratory TB was the main diagnostic site for 62% of the reported cases in 1997. A larger proportion of Canadian-born non-Aboriginal TB cases had respiratory TB (70%) compared with that among both the Aboriginal and foreign-born cases (60%). Overall, TB of the peripheral lymph nodes was the second most commonly reported diagnostic site, with almost half of all such cases occurring in the foreign-born originating in the Western Pacific

region of the world. This diagnostic site accounted for 19% of all foreign-born TB cases. Among the Aboriginal TB cases, primary TB accounted for the most significant proportion (27%) of all notifications after respiratory TB.

A total of 1,782 of the 1,975 reported TB cases (90%) were laboratory confirmed. Of the 1,230 respiratory cases, 54% were smear (microscopy) positive and 84% were culture positive.

The majority of reported TB cases (79%) were detected through medical investigation of symptoms.

In recognition of the importance of the interaction of HIV infection with TB, collection of HIV status was added to the national TB surveillance system, beginning with cases for 1997. The analysis of this variable indicated that HIV status was unknown for 94% of the reported TB cases. Further collaborative efforts with each of the provincial and territorial TB control programs will be necessary to gain a better understanding of the extent of TB/HIV coinfection in Canada.

Of the 1,975 cases reported in 1997, 120 were reported to have died. Of these deaths, for 27 (23%) TB was reported as the underlying cause of death and for 42 (35%) TB was reported as contributing to death, but not as the underlying cause. It should be noted that the number of reported TB related deaths is an underestimate, as it includes only known deaths at the time of reporting.

Figure 1

Reported new active and relapsed tuberculosis incidence rate per 100,000 - Canada: 1924-1997



Figure 2

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada: 1980-1997



Figure 3

Reported new active and relapsed tuberculosis incidence rate per 100,000 by age group - Canada: 1982-1997



Figure 4

Distribution of reported new active and relapsed tuberculosis cases by origin – Canada: 1980 and 1997



Figure 5

Reported new active and relapsed tuberculosis incidence rate per 100,000 by main diagnostic site - Canada: 1987-1997



Figure 6

Distribution of reported new active and relapsed tuberculosis cases by origin – provinces/territories: 1997 (n=1,975)



Figure 7

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by age group and origin - Canada: 1997 (n=1,975)



Figure 8

Distribution of reported new active and relapsed tuberculosis cases by origin and main diagnostic site - Canada: 1997 (n=1,975)



Table 1A

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997

Year of Diagnosis		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
1987	Cases	1972	34	1	30	24	432	645	125	157	205	298	1	20
	Rate	7.4	5.9	0.8	3.3	3.3	6.3	6.7	11.4	15.1	8.4	9.7	3.8	35.9
1988	Cases	1947	65	4	26	18	423	635	111	149	176	300	4	36
	Rate	7.3	11.4	3.1	2.9	2.5	6.2	6.5	10.1	14.6	7.2	9.7	15	64.9
1989	Cases	2035	42	5	30	29	420	711	100	216	133	288	5	56
	Rate	7.4	7.3	3.8	3.3	3.9	6	7	9	21.1	5.3	9	18.3	97.3
1990	Cases	1997	28	1	23	34	412	730	92	223	156	265	10	23
	Rate	7.2	4.8	0.8	2.5	4.6	5.9	7.1	8.3	22.1	6.1	8	35.7	38.8
1991	Cases	2018	34	3	17	27	400	769	101	184	173	280	8	22
	Rate	7.2	5.9	2.3	1.9	3.6	5.6	7.3	9.1	18.3	6.7	8.3	27.4	35.9
1992	Cases	2108	34	2	13	19	424	822	86	133	222	323	3	27
	Rate	7.4	5.8	1.5	1.4	2.5	5.9	7.7	7.7	13.2	8.4	9.3	9.9	43.2
1993	Cases	2012	62	5	17	15	352	769	108	153	156	337	3	35
	Rate	7	10.6	3.8	1.8	2	4.9	7.1	9.6	15.1	5.8	9.4	9.8	55
1994	Cases	2074	14	-	12	16	361	831	116	147	178	324	10	65
	Rate	7.1	2.4	-	1.3	2.1	5	7.6	10.3	14.5	6.6	8.8	33.7	100.4
1995	Cases	1931	11	1	13	9	380	766	109	155	125	308	2	52
	Rate	6.5	1.9	0.7	1.4	1.2	5.2	6.9	9.6	15.3	4.5	8.2	6.6	79
1996	Cases	1869	24	3	15	15	332	771	97	113	140	317	6	36
	Rate	6.3	4.3	2.2	1.6	2	4.6	6.9	8.6	11.1	5	8.2	18.8	53.3
1997	Cases	1975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Rate	6.6	2.7	3.7	0.7	0.9	4.9	6.8	8.4	11.8	5.8	10.2	6.2	45.7

Table 1B

Reported new active tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997

Year of Diagnosis		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
1987	Cases	1797	33	1	26	20	420	570	113	140	195	266	1	12
	Rate	6.8	5.7	0.8	2.9	2.7	6.2	5.9	10.3	13.5	8	8.7	3.8	21.6
1988	Cases	1771	56	4	24	15	407	560	102	134	160	271	4	34
	Rate	6.6	9.8	3.1	2.7	2.1	6	5.7	9.3	13.1	6.6	8.7	15	61.3
1989	Cases	1829	37	5	21	22	407	627	87	203	121	252	3	44
	Rate	6.7	6.4	3.8	2.3	3	5.9	6.2	7.9	19.8	4.8	7.9	11	76.5
1990	Cases	1788	26	-	15	27	402	614	88	211	144	234	8	19
	Rate	6.4	4.5	-	1.6	3.6	5.7	5.9	7.9	20.9	5.6	7.1	28.5	32
1991	Cases	1806	32	3	12	22	382	661	89	170	152	253	8	22
	Rate	6.4	5.5	2.3	1.3	2.9	5.4	6.3	8	16.9	5.8	7.5	27.4	35.9
1992	Cases	1865	31	2	9	16	399	692	81	121	201	291	2	20
	Rate	6.5	5.3	1.5	1	2.1	5.6	6.5	7.2	12	7.6	8.4	6.6	32
1993	Cases	1772	59	5	14	12	311	653	95	145	143	304	3	28
	Rate	6.1	10.1	3.8	1.5	1.6	4.3	6	8.5	14.3	5.3	8.5	9.8	44
1994	Cases	1838	12	-	12	15	306	723	107	141	160	294	9	59
	Rate	6.3	2.1	-	1.3	2	4.2	6.6	9.5	13.9	5.9	8	30.3	91.1
1995	Cases	1726	9	1	10	8	348	657	97	143	115	290	2	46
	Rate	5.8	1.6	0.7	1.1	1.1	4.7	5.9	8.5	14.1	4.2	7.7	6.6	69.8
1996	Cases	1672	21	3	11	9	294	689	84	109	129	288	4	31
	Rate	5.6	3.7	2.2	1.2	1.2	4	6.2	7.4	10.7	4.6	7.4	12.5	45.9
1997	Cases	1769	13	4	5	6	323	687	86	110	150	359	2	24
	Rate	5.9	2.3	2.9	0.5	0.8	4.4	6.1	7.6	10.8	5.3	9.1	6.2	35.4

NB: Cases for which Activity Status is unknown are included in the total (Table 1A).

Table 1A

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997

Year of Diagnosis		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
1987	Cases	1972	34	1	30	24	432	645	125	157	205	298	1	20
	Rate	7.4	5.9	0.8	3.3	3.3	6.3	6.7	11.4	15.1	8.4	9.7	3.8	35.9
1988	Cases	1947	65	4	26	18	423	635	111	149	176	300	4	36
	Rate	7.3	11.4	3.1	2.9	2.5	6.2	6.5	10.1	14.6	7.2	9.7	15	64.9
1989	Cases	2035	42	5	30	29	420	711	100	216	133	288	5	56
	Rate	7.4	7.3	3.8	3.3	3.9	6	7	9	21.1	5.3	9	18.3	97.3
1990	Cases	1997	28	1	23	34	412	730	92	223	156	265	10	23
	Rate	7.2	4.8	0.8	2.5	4.6	5.9	7.1	8.3	22.1	6.1	8	35.7	38.8
1991	Cases	2018	34	3	17	27	400	769	101	184	173	280	8	22
	Rate	7.2	5.9	2.3	1.9	3.6	5.6	7.3	9.1	18.3	6.7	8.3	27.4	35.9
1992	Cases	2108	34	2	13	19	424	822	86	133	222	323	3	27
	Rate	7.4	5.8	1.5	1.4	2.5	5.9	7.7	7.7	13.2	8.4	9.3	9.9	43.2
1993	Cases	2012	62	5	17	15	352	769	108	153	156	337	3	35
	Rate	7	10.6	3.8	1.8	2	4.9	7.1	9.6	15.1	5.8	9.4	9.8	55
1994	Cases	2074	14	-	12	16	361	831	116	147	178	324	10	65
	Rate	7.1	2.4	-	1.3	2.1	5	7.6	10.3	14.5	6.6	8.8	33.7	100.4
1995	Cases	1931	11	1	13	9	380	766	109	155	125	308	2	52
	Rate	6.5	1.9	0.7	1.4	1.2	5.2	6.9	9.6	15.3	4.5	8.2	6.6	79
1996	Cases	1869	24	3	15	15	332	771	97	113	140	317	6	36
	Rate	6.3	4.3	2.2	1.6	2	4.6	6.9	8.6	11.1	5	8.2	18.8	53.3
1997	Cases	1975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Rate	6.6	2.7	3.7	0.7	0.9	4.9	6.8	8.4	11.8	5.8	10.2	6.2	45.7

Table 1B

Reported new active tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997

Year of Diagnosis		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
1987	Cases	1797	33	1	26	20	420	570	113	140	195	266	1	12
	Rate	6.8	5.7	0.8	2.9	2.7	6.2	5.9	10.3	13.5	8	8.7	3.8	21.6
1988	Cases	1771	56	4	24	15	407	560	102	134	160	271	4	34
	Rate	6.6	9.8	3.1	2.7	2.1	6	5.7	9.3	13.1	6.6	8.7	15	61.3
1989	Cases	1829	37	5	21	22	407	627	87	203	121	252	3	44
	Rate	6.7	6.4	3.8	2.3	3	5.9	6.2	7.9	19.8	4.8	7.9	11	76.5
1990	Cases	1788	26	-	15	27	402	614	88	211	144	234	8	19
	Rate	6.4	4.5	-	1.6	3.6	5.7	5.9	7.9	20.9	5.6	7.1	28.5	32
1991	Cases	1806	32	3	12	22	382	661	89	170	152	253	8	22
	Rate	6.4	5.5	2.3	1.3	2.9	5.4	6.3	8	16.9	5.8	7.5	27.4	35.9
1992	Cases	1865	31	2	9	16	399	692	81	121	201	291	2	20
	Rate	6.5	5.3	1.5	1	2.1	5.6	6.5	7.2	12	7.6	8.4	6.6	32
1993	Cases	1772	59	5	14	12	311	653	95	145	143	304	3	28
	Rate	6.1	10.1	3.8	1.5	1.6	4.3	6	8.5	14.3	5.3	8.5	9.8	44
1994	Cases	1838	12	-	12	15	306	723	107	141	160	294	9	59
	Rate	6.3	2.1	-	1.3	2	4.2	6.6	9.5	13.9	5.9	8	30.3	91.1
1995	Cases	1726	9	1	10	8	348	657	97	143	115	290	2	46
	Rate	5.8	1.6	0.7	1.1	1.1	4.7	5.9	8.5	14.1	4.2	7.7	6.6	69.8
1996	Cases	1672	21	3	11	9	294	689	84	109	129	288	4	31
	Rate	5.6	3.7	2.2	1.2	1.2	4	6.2	7.4	10.7	4.6	7.4	12.5	45.9
1997	Cases	1769	13	4	5	6	323	687	86	110	150	359	2	24
	Rate	5.9	2.3	2.9	0.5	0.8	4.4	6.1	7.6	10.8	5.3	9.1	6.2	35.4

NB: Cases for which Activity Status is unknown are included in the total (Table 1A).

Table 1C

Reported relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997

Year of Diagnosis		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
1987	Cases	175	1	-	4	4	12	75	12	17	10	32	-	8
	Rate	0.7	0.2	-	0.4	0.5	0.2	0.8	1.1	1.6	0.4	1	-	14.4
1988	Cases	176	9	-	2	3	16	75	9	15	16	29	-	2
	Rate	0.7	1.6	-	0.2	0.4	0.2	0.8	0.8	1.5	0.7	0.9	-	3.6
1989	Cases	206	5	-	9	7	13	84	13	13	12	36	2	12
	Rate	0.8	0.9	-	1	0.9	0.2	0.8	1.2	1.3	0.5	1.1	7.3	20.9
1990	Cases	180	2	1	8	7	10	87	4	12	12	31	2	4
	Rate	0.6	0.3	0.8	0.9	0.9	0.1	0.8	0.4	1.2	0.5	0.9	7.1	6.7
1991	Cases	206	2	-	5	5	18	102	12	14	21	27	-	-
	Rate	0.7	0.3	-	0.5	0.7	0.3	1	1.1	1.4	0.8	0.8	-	-
1992	Cases	241	3	-	4	3	25	128	5	12	21	32	1	7
	Rate	0.8	0.5	-	0.4	0.4	0.3	1.2	0.4	1.2	0.8	0.9	3.3	11.2
1993	Cases	238	3	-	3	3	41	114	13	8	13	33	-	7
	Rate	0.8	0.5	-	0.3	0.4	0.6	1.1	1.2	0.8	0.5	0.9	-	11
1994	Cases	228	2	-	-	1	55	100	9	6	18	30	1	6
	Rate	0.8	0.3	-	-	0.1	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	3.4	9.3
1995	Cases	195	2	-	3	1	28	103	12	12	10	18	-	6
	Rate	0.7	0.3	-	0.3	0.1	0.4	0.9	1.1	1.2	0.4	0.5	-	9.1
1996	Cases	178	3	-	3	5	36	72	9	4	11	29	1	5
	Rate	0.6	0.5	-	0.3	0.7	0.5	0.6	0.8	0.4	0.4	0.7	3.1	7.4
1997	Cases	197	2	1	2	1	34	70	10	11	16	43	-	7
	Rate	0.7	0.4	0.7	0.2	0.1	0.5	0.6	0.9	1.1	0.6	1.1	-	10.3

NB: Cases for which Activity Status is unknown are included in the total (Table 1A).

Table 2A

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – Canada: 1987-1997

Year of Diagnosis		TOTAL	Age Group										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Age Unk.
1987	Cases	1972	12	57	71	215	368	246	198	265	283	257	-
	Rate	7.4	3.2	3.8	1.9	4.9	7.5	6.3	7.5	11.1	16.3	23.1	-
1988	Cases	1947	12	33	52	227	384	241	198	260	274	266	-
	Rate	7.3	6.7	2.2	1.4	5.4	7.7	6	7.3	10.8	15.4	23.1	-
1989	Cases	2035	31	74	78	259	341	252	204	256	274	266	-
	Rate	7.4	8.1	4.9	2.1	6.2	6.7	6	7.3	10.6	15	22.1	-
1990	Cases	1997	44	91	66	208	400	240	181	244	280	241	2
	Rate	7.2	11	5.9	1.7	5.1	7.8	5.5	6.2	10.1	15	19.3	-
1991	Cases	2018	48	71	60	227	399	282	188	223	279	240	1
	Rate	7.2	11.9	4.6	1.6	5.6	7.8	6.3	6.2	9.2	14.5	18.6	-
1992	Cases	2108	25	83	85	242	405	286	191	224	276	290	1
	Rate	7.4	6.2	5.3	2.2	6	7.9	6.2	6	9.2	14	21.8	-
1993	Cases	2012	26	69	108	234	386	270	210	214	257	237	1
	Rate	7	6.6	4.3	2.7	5.8	7.6	5.7	6.2	8.7	12.7	17.3	-
1994	Cases	2074	20	72	98	274	411	261	224	212	271	231	-
	Rate	7.1	5.2	4.5	2.5	6.8	8.2	5.4	6.4	8.5	13.2	16.4	-
1995	Cases	1931	27	64	85	229	325	314	201	209	251	225	1
	Rate	6.5	7.1	4	2.1	5.7	6.6	6.4	5.5	8.3	12	15.3	-
1996	Cases	1869	11	68	63	214	356	304	191	193	250	219	-
	Rate	6.3	2.9	4.3	1.6	5.3	7.5	6.1	5	7.6	12	14.7	-
1997	Cases	1975	9	49	58	214	385	291	216	228	246	279	-
	Rate	6.6	2.5	3.1	1.4	5.3	8.2	5.7	5.5	8.8	11.7	18	-

Table 1C

Reported relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 - Canada and provinces/territories: 1987-1997

Year of Diagnosis		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
1987	Cases	175	1	-	4	4	12	75	12	17	10	32	-	8
	Rate	0.7	0.2	-	0.4	0.5	0.2	0.8	1.1	1.6	0.4	1	-	14.4
1988	Cases	176	9	-	2	3	16	75	9	15	16	29	-	2
	Rate	0.7	1.6	-	0.2	0.4	0.2	0.8	0.8	1.5	0.7	0.9	-	3.6
1989	Cases	206	5	-	9	7	13	84	13	13	12	36	2	12
	Rate	0.8	0.9	-	1	0.9	0.2	0.8	1.2	1.3	0.5	1.1	7.3	20.9
1990	Cases	180	2	1	8	7	10	87	4	12	12	31	2	4
	Rate	0.6	0.3	0.8	0.9	0.9	0.1	0.8	0.4	1.2	0.5	0.9	7.1	6.7
1991	Cases	206	2	-	5	5	18	102	12	14	21	27	-	-
	Rate	0.7	0.3	-	0.5	0.7	0.3	1	1.1	1.4	0.8	0.8	-	-
1992	Cases	241	3	-	4	3	25	128	5	12	21	32	1	7
	Rate	0.8	0.5	-	0.4	0.4	0.3	1.2	0.4	1.2	0.8	0.9	3.3	11.2
1993	Cases	238	3	-	3	3	41	114	13	8	13	33	-	7
	Rate	0.8	0.5	-	0.3	0.4	0.6	1.1	1.2	0.8	0.5	0.9	-	11
1994	Cases	228	2	-	-	1	55	100	9	6	18	30	1	6
	Rate	0.8	0.3	-	-	0.1	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	3.4	9.3
1995	Cases	195	2	-	3	1	28	103	12	12	10	18	-	6
	Rate	0.7	0.3	-	0.3	0.1	0.4	0.9	1.1	1.2	0.4	0.5	-	9.1
1996	Cases	178	3	-	3	5	36	72	9	4	11	29	1	5
	Rate	0.6	0.5	-	0.3	0.7	0.5	0.6	0.8	0.4	0.4	0.7	3.1	7.4
1997	Cases	197	2	1	2	1	34	70	10	11	16	43	-	7
	Rate	0.7	0.4	0.7	0.2	0.1	0.5	0.6	0.9	1.1	0.6	1.1	-	10.3

NB: Cases for which Activity Status is unknown are included in the total (Table 1A).

Table 2A

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – Canada: 1987-1997

Year of Diagnosis		TOTAL	Age Group										
			< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 +	Age Unk.
1987	Cases	1972	12	57	71	215	368	246	198	265	283	257	-
	Rate	7.4	3.2	3.8	1.9	4.9	7.5	6.3	7.5	11.1	16.3	23.1	-
1988	Cases	1947	12	33	52	227	384	241	198	260	274	266	-
	Rate	7.3	6.7	2.2	1.4	5.4	7.7	6	7.3	10.8	15.4	23.1	-
1989	Cases	2035	31	74	78	259	341	252	204	256	274	266	-
	Rate	7.4	8.1	4.9	2.1	6.2	6.7	6	7.3	10.6	15	22.1	-
1990	Cases	1997	44	91	66	208	400	240	181	244	280	241	2
	Rate	7.2	11	5.9	1.7	5.1	7.8	5.5	6.2	10.1	15	19.3	-
1991	Cases	2018	48	71	60	227	399	282	188	223	279	240	1
	Rate	7.2	11.9	4.6	1.6	5.6	7.8	6.3	6.2	9.2	14.5	18.6	-
1992	Cases	2108	25	83	85	242	405	286	191	224	276	290	1
	Rate	7.4	6.2	5.3	2.2	6	7.9	6.2	6	9.2	14	21.8	-
1993	Cases	2012	26	69	108	234	386	270	210	214	257	237	1
	Rate	7	6.6	4.3	2.7	5.8	7.6	5.7	6.2	8.7	12.7	17.3	-
1994	Cases	2074	20	72	98	274	411	261	224	212	271	231	-
	Rate	7.1	5.2	4.5	2.5	6.8	8.2	5.4	6.4	8.5	13.2	16.4	-
1995	Cases	1931	27	64	85	229	325	314	201	209	251	225	1
	Rate	6.5	7.1	4	2.1	5.7	6.6	6.4	5.5	8.3	12	15.3	-
1996	Cases	1869	11	68	63	214	356	304	191	193	250	219	-
	Rate	6.3	2.9	4.3	1.6	5.3	7.5	6.1	5	7.6	12	14.7	-
1997	Cases	1975	9	49	58	214	385	291	216	228	246	279	-
	Rate	6.6	2.5	3.1	1.4	5.3	8.2	5.7	5.5	8.8	11.7	18	-

Table 2B

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – males – Canada: 1987-1997

Year of Diagnosis		TOTAL	Age Group										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Age Unk.
1987	Cases	1131	7	30	32	103	221	141	123	155	170	149	-
	Rate	8.6	3.7	3.9	1.7	4.6	8.9	7.2	9.3	13.4	22	35.8	-
1988	Cases	1123	3	16	21	128	207	145	119	172	159	153	-
	Rate	8.5	-	2.1	1.1	5.9	8.2	7.1	8.7	14.7	20.1	35.4	-
1989	Cases	1152	15	43	39	121	178	146	132	175	160	143	-
	Rate	8.5	7.7	5.5	2	5.7	6.9	6.9	9.3	14.8	19.6	31.7	-
1990	Cases	1096	16	41	33	112	217	130	117	140	161	128	1
	Rate	8	7.8	5.2	1.7	5.4	8.3	5.9	8	11.8	19.2	27.3	-
1991	Cases	1174	30	38	31	135	235	162	107	119	179	137	1
	Rate	8.4	14.5	4.8	1.6	6.6	9.1	7.2	7.1	9.9	20.8	28.2	-
1992	Cases	1178	16	39	35	129	222	178	116	133	157	153	-
	Rate	8.3	7.7	4.8	1.8	6.3	8.6	7.7	7.2	11	17.7	30.6	-
1993	Cases	1135	13	35	62	124	207	154	130	132	144	133	1
	Rate	7.9	6.5	4.2	3.1	6	8.1	6.5	7.7	10.9	15.8	25.9	-
1994	Cases	1121	9	36	52	140	203	151	133	117	150	130	-
	Rate	7.7	4.6	4.3	2.6	6.8	8	6.3	7.5	9.5	16	24.6	-
1995	Cases	1044	9	30	40	112	166	191	118	122	145	111	-
	Rate	7.1	4.6	3.7	2	5.5	6.7	7.7	6.4	9.8	15.2	20.2	-
1996	Cases	1006	7	32	35	106	180	158	106	104	144	134	-
	Rate	6.8	3.6	3.9	1.7	5.1	7.5	6.3	5.6	8.3	15	24.1	-
1997	Cases	1051	6	27	25	93	193	158	118	130	139	163	-
	Rate	7.1	3.3	3.4	1.2	4.5	8.2	6.2	6	10.2	14.3	28.2	-

Table 2C

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – females – Canada: 1987-1997

Year of Diagnosis		TOTAL	Age Group										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Age Unk.
1987	Cases	841	5	27	39	112	147	105	75	110	113	108	-
	Rate	6.3	2.8	3.7	2.2	5.3	6.1	5.5	5.7	8.9	11.8	15.6	-
1988	Cases	824	9	17	31	99	177	96	79	88	115	113	-
	Rate	6.1	5	2.3	1.7	4.8	7.2	4.8	5.9	7.1	11.7	15.7	-
1989	Cases	883	16	31	39	138	163	106	72	81	114	123	-
	Rate	6.4	8.6	4.2	2.1	6.8	6.5	5.1	5.2	6.6	11.3	16.4	-
1990	Cases	901	28	50	33	96	183	110	64	104	119	113	1
	Rate	6.4	14.3	6.7	1.8	4.8	7.2	5.1	4.4	8.4	11.5	14.5	-
1991	Cases	844	18	33	29	92	164	120	81	104	100	103	-
	Rate	6	9.2	4.4	1.5	4.6	6.5	5.4	5.4	8.4	9.5	12.8	-
1992	Cases	930	9	44	50	113	183	108	75	91	119	137	1
	Rate	6.5	4.6	5.7	2.6	5.7	7.3	4.7	4.7	7.4	11	16.4	-
1993	Cases	877	13	34	46	110	179	116	80	82	113	104	-
	Rate	6	6.8	4.3	2.4	5.6	7.2	5	4.8	6.6	10.2	12.1	-
1994	Cases	953	11	36	46	134	208	110	91	95	121	101	-
	Rate	6.5	5.9	4.6	2.4	6.8	8.5	4.6	5.2	7.6	10.8	11.4	-
1995	Cases	887	18	34	45	117	159	123	83	87	106	114	1
	Rate	5.9	9.7	4.4	2.3	5.9	6.5	5	4.5	6.9	9.3	12.4	-
1996	Cases	863	4	36	28	108	176	146	85	89	106	85	-
	Rate	5.8	2.1	4.7	1.4	5.5	7.5	5.8	4.5	6.9	9.4	9.1	-
1997	Cases	923	3	22	33	121	192	133	98	98	107	116	-
	Rate	6.1	1.7	2.9	1.7	6.1	8.3	5.2	5	7.5	9.4	11.9	-

Table 2B

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – males – Canada: 1987-1997

Year of Diagnosis		TOTAL	Age Group										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Age Unk.
1987	Cases	1131	7	30	32	103	221	141	123	155	170	149	-
	Rate	8.6	3.7	3.9	1.7	4.6	8.9	7.2	9.3	13.4	22	35.8	-
1988	Cases	1123	3	16	21	128	207	145	119	172	159	153	-
	Rate	8.5	-	2.1	1.1	5.9	8.2	7.1	8.7	14.7	20.1	35.4	-
1989	Cases	1152	15	43	39	121	178	146	132	175	160	143	-
	Rate	8.5	7.7	5.5	2	5.7	6.9	6.9	9.3	14.8	19.6	31.7	-
1990	Cases	1096	16	41	33	112	217	130	117	140	161	128	1
	Rate	8	7.8	5.2	1.7	5.4	8.3	5.9	8	11.8	19.2	27.3	-
1991	Cases	1174	30	38	31	135	235	162	107	119	179	137	1
	Rate	8.4	14.5	4.8	1.6	6.6	9.1	7.2	7.1	9.9	20.8	28.2	-
1992	Cases	1178	16	39	35	129	222	178	116	133	157	153	-
	Rate	8.3	7.7	4.8	1.8	6.3	8.6	7.7	7.2	11	17.7	30.6	-
1993	Cases	1135	13	35	62	124	207	154	130	132	144	133	1
	Rate	7.9	6.5	4.2	3.1	6	8.1	6.5	7.7	10.9	15.8	25.9	-
1994	Cases	1121	9	36	52	140	203	151	133	117	150	130	-
	Rate	7.7	4.6	4.3	2.6	6.8	8	6.3	7.5	9.5	16	24.6	-
1995	Cases	1044	9	30	40	112	166	191	118	122	145	111	-
	Rate	7.1	4.6	3.7	2	5.5	6.7	7.7	6.4	9.8	15.2	20.2	-
1996	Cases	1006	7	32	35	106	180	158	106	104	144	134	-
	Rate	6.8	3.6	3.9	1.7	5.1	7.5	6.3	5.6	8.3	15	24.1	-
1997	Cases	1051	6	27	25	93	193	158	118	130	139	163	-
	Rate	7.1	3.3	3.4	1.2	4.5	8.2	6.2	6	10.2	14.3	28.2	-

Table 2C

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – females – Canada: 1987-1997

Year of Diagnosis		TOTAL	Age Group										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Age Unk.
1987	Cases	841	5	27	39	112	147	105	75	110	113	108	-
	Rate	6.3	2.8	3.7	2.2	5.3	6.1	5.5	5.7	8.9	11.8	15.6	-
1988	Cases	824	9	17	31	99	177	96	79	88	115	113	-
	Rate	6.1	5	2.3	1.7	4.8	7.2	4.8	5.9	7.1	11.7	15.7	-
1989	Cases	883	16	31	39	138	163	106	72	81	114	123	-
	Rate	6.4	8.6	4.2	2.1	6.8	6.5	5.1	5.2	6.6	11.3	16.4	-
1990	Cases	901	28	50	33	96	183	110	64	104	119	113	1
	Rate	6.4	14.3	6.7	1.8	4.8	7.2	5.1	4.4	8.4	11.5	14.5	-
1991	Cases	844	18	33	29	92	164	120	81	104	100	103	-
	Rate	6	9.2	4.4	1.5	4.6	6.5	5.4	5.4	8.4	9.5	12.8	-
1992	Cases	930	9	44	50	113	183	108	75	91	119	137	1
	Rate	6.5	4.6	5.7	2.6	5.7	7.3	4.7	4.7	7.4	11	16.4	-
1993	Cases	877	13	34	46	110	179	116	80	82	113	104	-
	Rate	6	6.8	4.3	2.4	5.6	7.2	5	4.8	6.6	10.2	12.1	-
1994	Cases	953	11	36	46	134	208	110	91	95	121	101	-
	Rate	6.5	5.9	4.6	2.4	6.8	8.5	4.6	5.2	7.6	10.8	11.4	-
1995	Cases	887	18	34	45	117	159	123	83	87	106	114	1
	Rate	5.9	9.7	4.4	2.3	5.9	6.5	5	4.5	6.9	9.3	12.4	-
1996	Cases	863	4	36	28	108	176	146	85	89	106	85	-
	Rate	5.8	2.1	4.7	1.4	5.5	7.5	5.8	4.5	6.9	9.4	9.1	-
1997	Cases	923	3	22	33	121	192	133	98	98	107	116	-
	Rate	6.1	1.7	2.9	1.7	6.1	8.3	5.2	5	7.5	9.4	11.9	-

Table 3

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace – Canada: 1987-1997

Birthplace		Year of Diagnosis										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Canadian-born	Aboriginal											
	Status Indian	283	236	303	295	259	322	260	268	265	219	212
	Non-Status Indian/Metis	89	75	73	72	58	39	55	95	56	51	52
	Inuit	12	21	34	8	22	26	58	35	24	26	19
	Total	**384**	**332**	**410**	**375**	**339**	**387**	**373**	**398**	**345**	**296**	**283**
	Non-aboriginal	720	724	666	682	670	587	576	490	435	371	400
	Total	**1104**	**1056**	**1076**	**1057**	**1009**	**974**	**949**	**888**	**780**	**667**	**683**
Foreign-born (WHO Region)	Africa	30	42	57	52	70	73	53	68	60	57	92
	Americas	107	83	100	79	92	119	98	99	116	99	103
	East Mediterranean	32	52	63	90	103	108	112	152	113	146	114
	Europe	219	203	204	181	159	170	148	145	139	114	134
	South East Asia	108	91	108	103	114	133	159	167	164	177	197
	Western Pacific	255	289	293	435	470	509	491	551	519	553	569
	Unknown Birthplace	117	131	134	-	1	22	2	4	29	25	62
	Total	**868**	**891**	**959**	**940**	**1009**	**1134**	**1063**	**1186**	**1140**	**1171**	**1271**
Unknown Birthplace		-	-	-	-	-	-	-	-	11	31	21
TOTAL		**1972**	**1947**	**2035**	**1997**	**2018**	**2108**	**2012**	**2074**	**1931**	**1869**	**1975**

Table 4

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by main diagnostic site – Canada: 1987-1997

Main Diagnostic Site		Year of Diagnosis										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Primary	Cases	144	109	190	230	206	193	189	152	163	120	130
	Rate	0.5	0.4	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4
Miliary/Disseminated	Cases	53	47	47	67	43	60	58	65	48	57	73
	Rate	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Respiratory (pulm/other resp)*	Cases	1334	1344	1336	1183	1217	1351	1260	1325	1244	1156	1230
	Rate	5	5	4.9	4.3	4.3	4.7	4.4	4.5	4.2	3.9	4.1
Meninges and CNS	Cases	15	19	14	17	15	17	19	18	22	19	25
	Rate	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Peripheral Lymph Node	Cases	228	218	249	223	223	259	281	301	249	242	266
	Rate	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	1	1	0.8	0.8	0.9
Other Sites*	Cases	198	210	199	220	242	220	202	206	199	263	247
	Rate	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8
Unknown	Cases	-	-	-	57	72	8	3	7	6	12	4
	Rate	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**Cases**	**1972**	**1947**	**2035**	**1997**	**2018**	**2108**	**2012**	**2074**	**1931**	**1869**	**1975**
	Rate	**7.4**	**7.3**	**7.4**	**7.2**	**7.2**	**7.4**	**7**	**7.1**	**6.5**	**6.3**	**6.6**

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 3

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace – Canada: 1987-1997

Birthplace		Year of Diagnosis										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Canadian-born	Aboriginal											
	Status Indian	283	236	303	295	259	322	260	268	265	219	212
	Non-Status Indian/Metis	89	75	73	72	58	39	55	95	56	51	52
	Inuit	12	21	34	8	22	26	58	35	24	26	19
	Total	**384**	**332**	**410**	**375**	**339**	**387**	**373**	**398**	**345**	**296**	**283**
	Non-aboriginal	720	724	666	682	670	587	576	490	435	371	400
	Total	**1104**	**1056**	**1076**	**1057**	**1009**	**974**	**949**	**888**	**780**	**667**	**683**
Foreign-born (WHO Region)	Africa	30	42	57	52	70	73	53	68	60	57	92
	Americas	107	83	100	79	92	119	98	99	116	99	103
	East Mediterranean	32	52	63	90	103	108	112	152	113	146	114
	Europe	219	203	204	181	159	170	148	145	139	114	134
	South East Asia	108	91	108	103	114	133	159	167	164	177	197
	Western Pacific	255	289	293	435	470	509	491	551	519	553	569
	Unknown Birthplace	117	131	134	-	1	22	2	4	29	25	62
	Total	**868**	**891**	**959**	**940**	**1009**	**1134**	**1063**	**1186**	**1140**	**1171**	**1271**
Unknown Birthplace		-	-	-	-	-	-	-	-	11	31	21
TOTAL		**1972**	**1947**	**2035**	**1997**	**2018**	**2108**	**2012**	**2074**	**1931**	**1869**	**1975**

Table 4

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by main diagnostic site – Canada: 1987-1997

Main Diagnostic Site		Year of Diagnosis										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Primary	Cases	144	109	190	230	206	193	189	152	163	120	130
	Rate	0.5	0.4	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4
Miliary/Disseminated	Cases	53	47	47	67	43	60	58	65	48	57	73
	Rate	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Respiratory (pulm/other resp)*	Cases	1334	1344	1336	1183	1217	1351	1260	1325	1244	1156	1230
	Rate	5	5	4.9	4.3	4.3	4.7	4.4	4.5	4.2	3.9	4.1
Meninges and CNS	Cases	15	19	14	17	15	17	19	18	22	19	25
	Rate	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Peripheral Lymph Node	Cases	228	218	249	223	223	259	281	301	249	242	266
	Rate	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	1	1	0.8	0.8	0.9
Other Sites*	Cases	198	210	199	220	242	220	202	206	199	263	247
	Rate	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8
Unknown	Cases	-	-	-	57	72	8	3	7	6	12	4
	Rate	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**Cases**	**1972**	**1947**	**2035**	**1997**	**2018**	**2108**	**2012**	**2074**	**1931**	**1869**	**1975**
	Rate	**7.4**	**7.3**	**7.4**	**7.2**	**7.2**	**7.4**	**7**	**7.1**	**6.5**	**6.3**	**6.6**

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 5A

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – Canada and provinces/territories: 1997

Age Group		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 1	Cases	9	-	-	-	-	1	1	-	7	-	-	-	-
	Rate	2.5	-	-	-	-	1.2	0.7	-	53.3	-	-	-	-
1 – 4	Cases	49	-	-	-	-	6	13	1	19	1	7	-	2
	Rate	3.1	-	-	-	-	1.7	2.1	1.5	33	0.6	3.6	-	32.4
5 – 14	Cases	58	-	-	-	-	5	11	2	29	3	8	-	-
	Rate	1.4	-	-	-	-	0.5	0.7	1.2	18.2	0.7	1.5	-	-
15 – 24	Cases	214	1	-	1	-	34	87	14	19	15	31	-	12
	Rate	5.3	1.1	-	0.8	-	3.5	5.9	8.9	12.6	3.7	5.9	-	109.5
25 – 34	Cases	385	1	-	2	-	64	167	12	17	28	90	-	4
	Rate	8.2	1.2	-	1.4	-	5.8	9.3	7.2	12.3	6.1	14.3	-	30.9
35 – 44	Cases	291	2	-	2	-	60	122	19	8	25	50	-	3
	Rate	5.7	2.2	-	1.3	-	4.7	6.4	10.5	5.1	4.9	7.3	-	28.5
45 – 54	Cases	216	1	-	-	1	32	89	10	6	18	54	-	5
	Rate	5.5	1.3	-	-	1	3.1	6.1	7.2	5.3	5.2	10.1	-	75.6
55 – 64	Cases	228	2	1	-	2	39	84	12	5	21	59	1	2
	Rate	8.8	4.3	8.5	-	3.1	5.8	8.6	13	6.1	9.9	17.4	47.5	65
65 – 74	Cases	246	4	2	1	1	46	104	12	3	27	45	1	-
	Rate	11.7	11.6	21.5	1.5	1.9	8.6	12.8	14.7	3.9	16.7	16	97.6	-
75 +	Cases	279	4	2	1	3	73	83	14	8	28	60	-	3
	Rate	18	15.2	23.9	1.8	6.9	20.3	14.4	19.3	11.1	23.9	27.5	-	420.8
TOTAL	Cases	1975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Rate	6.6	2.7	3.7	0.7	0.9	4.9	6.8	8.4	11.8	5.8	10.2	6.2	45.7

Table 5B

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – males – Canada and provinces/territories: 1997

Age Group		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 1	Cases	6	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-
	Rate	3.3	-	-	-	-	2.3	1.4	-	59.2	-	-	-	-
1 – 4	Cases	27	-	-	-	-	3	6	-	10	1	6	-	1
	Rate	3.4	-	-	-	-	1.6	1.9	-	34	1.2	6	-	31.3
5 – 14	Cases	25	-	-	-	-	2	5	1	11	-	6	-	-
	Rate	1.2	-	-	-	-	0.4	0.6	1.2	13.5	-	2.3	-	-
15 – 24	Cases	93	1	-	1	-	17	31	7	6	6	14	-	10
	Rate	4.5	2.2	-	1.6	-	3.4	4.1	8.6	7.7	2.9	5.2	-	176.8
25 – 34	Cases	193	-	-	-	-	34	89	5	10	14	38	-	3
	Rate	8.2	-	-	-	-	6.1	9.9	5.9	14.3	6	11.9	-	45
35 – 44	Cases	158	1	-	1	-	32	70	10	4	13	25	-	2
	Rate	6.2	2.2	-	1.3	-	5	7.4	11	5	5	7.3	-	35.6
45 – 54	Cases	118	1	-	-	1	18	45	5	4	8	32	-	4
	Rate	6	2.6	-	-	1.9	3.6	6.3	7.2	6.9	4.6	12	-	109.3
55 – 64	Cases	130	1	-	-	2	24	49	5	4	8	35	-	2
	Rate	10.2	4.3	-	-	6.3	7.4	10.2	10.9	9.8	7.5	20.6	-	120.7
65 – 74	Cases	139	2	1	1	1	29	50	7	3	15	29	1	-
	Rate	14.3	12.1	22.8	3.3	4.1	12.2	13.3	18.7	8.3	19.4	21.7	173.9	-
75 +	Cases	162	2	-	-	2	41	51	7	3	17	39	-	1
	Rate	28	19	-	-	12.3	32.6	23.8	25.6	10.5	37.3	45.7	-	271.7
TOTAL	**Cases**	**1051**	**8**	**1**	**3**	**6**	**201**	**397**	**47**	**59**	**82**	**224**	**1**	**23**
	Rate	**7.1**	**2.9**	**1.5**	**0.7**	**1.6**	**5.6**	**7.2**	**8.3**	**11.6**	**5.7**	**11.4**	**6**	**64.8**

Table 5A

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – Canada and provinces/territories: 1997

Age Group		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 1	Cases	9	-	-	-	-	1	1	-	7	-	-	-	-
	Rate	2.5	-	-	-	-	1.2	0.7	-	53.3	-	-	-	-
1 – 4	Cases	49	-	-	-	-	6	13	1	19	1	7	-	2
	Rate	3.1	-	-	-	-	1.7	2.1	1.5	33	0.6	3.6	-	32.4
5 – 14	Cases	58	-	-	-	-	5	11	2	29	3	8	-	-
	Rate	1.4	-	-	-	-	0.5	0.7	1.2	18.2	0.7	1.5	-	-
15 – 24	Cases	214	1	-	1	-	34	87	14	19	15	31	-	12
	Rate	5.3	1.1	-	0.8	-	3.5	5.9	8.9	12.6	3.7	5.9	-	109.5
25 – 34	Cases	385	1	-	2	-	64	167	12	17	28	90	-	4
	Rate	8.2	1.2	-	1.4	-	5.8	9.3	7.2	12.3	6.1	14.3	-	30.9
35 – 44	Cases	291	2	-	2	-	60	122	19	8	25	50	-	3
	Rate	5.7	2.2	-	1.3	-	4.7	6.4	10.5	5.1	4.9	7.3	-	28.5
45 – 54	Cases	216	1	-	-	1	32	89	10	6	18	54	-	5
	Rate	5.5	1.3	-	-	1	3.1	6.1	7.2	5.3	5.2	10.1	-	75.6
55 – 64	Cases	228	2	1	-	2	39	84	12	5	21	59	1	2
	Rate	8.8	4.3	8.5	-	3.1	5.8	8.6	13	6.1	9.9	17.4	47.5	65
65 – 74	Cases	246	4	2	1	1	46	104	12	3	27	45	1	-
	Rate	11.7	11.6	21.5	1.5	1.9	8.6	12.8	14.7	3.9	16.7	16	97.6	-
75 +	Cases	279	4	2	1	3	73	83	14	8	28	60	-	3
	Rate	18	15.2	23.9	1.8	6.9	20.3	14.4	19.3	11.1	23.9	27.5	-	420.8
TOTAL	Cases	1975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Rate	6.6	2.7	3.7	0.7	0.9	4.9	6.8	8.4	11.8	5.8	10.2	6.2	45.7

Table 5B

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – males – Canada and provinces/territories: 1997

Age Group		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 1	Cases	6	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-
	Rate	3.3	-	-	-	-	2.3	1.4	-	59.2	-	-	-	-
1 – 4	Cases	27	-	-	-	-	3	6	-	10	1	6	-	1
	Rate	3.4	-	-	-	-	1.6	1.9	-	34	1.2	6	-	31.3
5 – 14	Cases	25	-	-	-	-	2	5	1	11	-	6	-	-
	Rate	1.2	-	-	-	-	0.4	0.6	1.2	13.5	-	2.3	-	-
15 – 24	Cases	93	1	-	1	-	17	31	7	6	6	14	-	10
	Rate	4.5	2.2	-	1.6	-	3.4	4.1	8.6	7.7	2.9	5.2	-	176.8
25 – 34	Cases	193	-	-	-	-	34	89	5	10	14	38	-	3
	Rate	8.2	-	-	-	-	6.1	9.9	5.9	14.3	6	11.9	-	45
35 – 44	Cases	158	1	-	1	-	32	70	10	4	13	25	-	2
	Rate	6.2	2.2	-	1.3	-	5	7.4	11	5	5	7.3	-	35.6
45 – 54	Cases	118	1	-	-	1	18	45	5	4	8	32	-	4
	Rate	6	2.6	-	-	1.9	3.6	6.3	7.2	6.9	4.6	12	-	109.3
55 – 64	Cases	130	1	-	-	2	24	49	5	4	8	35	-	2
	Rate	10.2	4.3	-	-	6.3	7.4	10.2	10.9	9.8	7.5	20.6	-	120.7
65 – 74	Cases	139	2	1	1	1	29	50	7	3	15	29	1	-
	Rate	14.3	12.1	22.8	3.3	4.1	12.2	13.3	18.7	8.3	19.4	21.7	173.9	-
75 +	Cases	162	2	-	-	2	41	51	7	3	17	39	-	1
	Rate	28	19	-	-	12.3	32.6	23.8	25.6	10.5	37.3	45.7	-	271.7
TOTAL	Cases	1051	8	1	3	6	201	397	47	59	82	224	1	23
	Rate	7.1	2.9	1.5	0.7	1.6	5.6	7.2	8.3	11.6	5.7	11.4	6	64.8

Table 5C

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – females – Canada and provinces/territories: 1997

Age Group		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 1	Cases	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Rate	1.7	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-
1 – 4	Cases	22	-	-	-	-	3	7	1	9	-	1	-	1
	Rate	2.9	-	-	-	-	1.7	2.4	3.2	31.9	-	1.1	-	33.6
5 – 14	Cases	33	-	-	-	-	3	6	1	18	3	2	-	-
	Rate	1.7	-	-	-	-	0.7	0.8	1.2	23.1	1.4	0.8	-	-
15 – 24	Cases	121	-	-	-	-	17	56	7	13	9	17	-	2
	Rate	6.1	-	-	-	-	3.6	7.7	9.1	17.8	4.5	6.6	-	37.7
25 – 34	Cases	192	1	-	2	-	30	78	7	7	14	52	-	1
	Rate	8.3	2.3	-	2.8	-	5.6	8.7	8.6	10.2	6.2	16.8	-	15.9
35 – 44	Cases	133	1	-	1	-	28	52	9	4	12	25	-	1
	Rate	5.2	2.1	-	1.3	-	4.4	5.4	10.1	5.1	4.8	7.4	-	20.4
45 – 54	Cases	98	-	-	-	-	14	44	5	2	10	22	-	1
	Rate	5	-	-	-	-	2.7	6	7.2	3.6	5.9	8.3	-	33.9
55 – 64	Cases	98	1	1	-	-	15	35	7	1	13	24	1	-
	Rate	7.5	4.4	16.9	-	-	4.4	7	15	2.4	12.4	14.1	107.4	-
65 – 74	Cases	107	2	1	-	-	17	54	5	-	12	16	-	-
	Rate	9.4	11.1	20.3	-	-	5.8	12.3	11.3	-	14.2	10.9	-	-
75 +	Cases	116	2	2	1	1	32	32	7	5	11	21	-	2
	Rate	11.9	12.7	37.7	2.8	3.7	13.7	8.9	15.5	11.5	15.3	15.8	-	579.7
TOTAL	Cases	923	7	4	4	1	159	364	49	62	84	180	1	8
	Rate	6.1	2.5	5.8	0.8	0.3	4.3	6.4	8.6	12.1	6	9	6.5	24.8

Table 6

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by birthplace - Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace			CANADA	Province/Territory												
				Totals	NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Canadian-born	Aboriginal			ATLANTIC												
	Status Indian	Cases	212	2	-	-	-	2	-	9	38	82	28	35	-	18
		Rate	40.6	10.2					-	8.4	48.1	113.4	37.7	36.0	-	144.0
	Non-Status Indian/Metis	Cases	52	3	-	-	3	-	10	1	1	24	6	6	-	1
		Rate	8.2	9.3					9.5	0.5	1.7	56.1	5.8	6.1	-	21.7
	Inuit	Cases	19	1	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	11
		Rate	32.6	11.4					60.0	-	111.1	-	-	-	-	42.1
	Total	**Cases**	283	6	1	-	3	2	16	10	40	106	34	41	-	30
		Rate	23.3	9.9					9.4	3.3	29.2	91.7	18.8	20.7	-	69.3
	Non-aboriginal	Cases	400	20	11	4	1	4	154	102	27	7	28	62	-	-
		Rate	1.7	0.9					2.4	1.3	3.1	0.8	1.3	2.2	-	-
	Total	**Cases**	683	26	12	4	4	6	170	112	67	113	62	103	-	30
		Rate	2.8	1.1	2.2	3.0	0.4	0.8	2.6	1.3	6.7	11.7	2.6	3.5	-	46.5
Foreign-born (WHO Region)	Africa	Cases	92	1	-	-	-	1	19	52	3	-	8	9	-	-
		Rate	55.1	35.8	-	-	-	120.3	81.0	57.6	69.2	-	60.2	29.1	-	-
	Americas	Cases	103	-	-	-	-	-	48	38	3	2	2	10	-	-
		Rate	11.8	-	-	-	-	-	39.5	8.0	13.1	21.9	2.9	6.2	-	-
	East Mediterranean	Cases	114	2	-	-	2	-	21	77	3	-	3	8	-	-
		Rate	34.1	35.6	-	-	68.0	-	44.5	42.6	34.6	-	11.3	12.9	-	-
	Europe	Cases	134	1	-	1	-	-	32	70	-	1	10	18	1	1
		Rate	5.4	2.5	-	45.8	-	-	9.6	5.2	-	4.0	5.0	4.0	63.4	65.9
	South East Asia	Cases	197	-	-	-	-	-	22	110	2	1	7	55	-	-
		Rate	54.5	-	-	-	-	-	44.1	56.0	21.1	26.6	24.2	82.4	-	-
	Western Pacific	Cases	569	4	3	-	1	-	43	270	17	4	69	161	1	-
		Rate	51.1	21.9	138.1	-	10.4	-	27.9	44.7	58.4	34.5	77.6	78.3	142.5	-

...cont'd

Table 5C

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group – females – Canada and provinces/territories: 1997

Age Group		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 1	Cases	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Rate	1.7	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-
1 – 4	Cases	22	-	-	-	-	3	7	1	9	-	1	-	1
	Rate	2.9	-	-	-	-	1.7	2.4	3.2	31.9	-	1.1	-	33.6
5 – 14	Cases	33	-	-	-	-	3	6	1	18	3	2	-	-
	Rate	1.7	-	-	-	-	0.7	0.8	1.2	23.1	1.4	0.8	-	-
15 – 24	Cases	121	-	-	-	-	17	56	7	13	9	17	-	2
	Rate	6.1	-	-	-	-	3.6	7.7	9.1	17.8	4.5	6.6	-	37.7
25 – 34	Cases	192	1	-	2	-	30	78	7	7	14	52	-	1
	Rate	8.3	2.3	-	2.8	-	5.6	8.7	8.6	10.2	6.2	16.8	-	15.9
35 – 44	Cases	133	1	-	1	-	28	52	9	4	12	25	-	1
	Rate	5.2	2.1	-	1.3	-	4.4	5.4	10.1	5.1	4.8	7.4	-	20.4
45 – 54	Cases	98	-	-	-	-	14	44	5	2	10	22	-	1
	Rate	5	-	-	-	-	2.7	6	7.2	3.6	5.9	8.3	-	33.9
55 – 64	Cases	98	1	1	-	-	15	35	7	1	13	24	1	-
	Rate	7.5	4.4	16.9	-	-	4.4	7	15	2.4	12.4	14.1	107.4	-
65 – 74	Cases	107	2	1	-	-	17	54	5	-	12	16	-	-
	Rate	9.4	11.1	20.3	-	-	5.8	12.3	11.3	-	14.2	10.9	-	-
75 +	Cases	116	2	2	1	1	32	32	7	5	11	21	-	2
	Rate	11.9	12.7	37.7	2.8	3.7	13.7	8.9	15.5	11.5	15.3	15.8	-	579.7
TOTAL	**Cases**	923	7	4	4	1	159	364	49	62	84	180	1	8
	Rate	6.1	2.5	5.8	0.8	0.3	4.3	6.4	8.6	12.1	6	9	6.5	24.8

Table 6

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by birthplace - Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace			CANADA	Province/Territory												
				Totals	NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Canadian-born	Aboriginal			ATLANTIC												
	Status Indian	Cases	212	2	-	-	-	2	-	9	38	82	28	35	-	18
		Rate	40.6	10.2					-	8.4	48.1	113.4	37.7	36.0	-	144.0
	Non-Status Indian/Metis	Cases	52	3	-	-	3	-	10	1	1	24	6	6	-	1
		Rate	8.2	9.3					9.5	0.5	1.7	56.1	5.8	6.1	-	21.7
	Inuit	Cases	19	1	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	11
		Rate	32.6	11.4					60.0	-	111.1	-	-	-	-	42.1
	Total	**Cases**	283	6	1	-	3	2	16	10	40	106	34	41	-	30
		Rate	23.3	9.9					9.4	3.3	29.2	91.7	18.8	20.7	-	69.3
	Non-aboriginal	Cases	400	20	11	4	1	4	154	102	27	7	28	62	-	-
		Rate	1.7	0.9					2.4	1.3	3.1	0.8	1.3	2.2	-	-
	Total	**Cases**	683	26	12	4	4	6	170	112	67	113	62	103	-	30
		Rate	2.8	1.1	2.2	3.0	0.4	0.8	2.6	1.3	6.7	11.7	2.6	3.5	-	46.5
Foreign-born (WHO Region)	Africa	Cases	92	1	-	-	-	1	19	52	3	-	8	9	-	-
		Rate	55.1	35.8	-	-	-	120.3	81.0	57.6	69.2	-	60.2	29.1	-	-
	Americas	Cases	103	-	-	-	-	-	48	38	3	2	2	10	-	-
		Rate	11.8	-	-	-	-	-	39.5	8.0	13.1	21.9	2.9	6.2	-	-
	East Mediterranean	Cases	114	2	-	-	2	-	21	77	3	-	3	8	-	-
		Rate	34.1	35.6	-	-	68.0	-	44.5	42.6	34.6	-	11.3	12.9	-	-
	Europe	Cases	134	1	-	1	-	-	32	70	-	1	10	18	1	1
		Rate	5.4	2.5	-	45.8	-	-	9.6	5.2	-	4.0	5.0	4.0	63.4	65.9
	South East Asia	Cases	197	-	-	-	-	-	22	110	2	1	7	55	-	-
		Rate	54.5	-	-	-	-	-	44.1	56.0	21.1	26.6	24.2	82.4	-	-
	Western Pacific	Cases	569	4	3	-	1	-	43	270	17	4	69	161	1	-
		Rate	51.1	21.9	138.1	-	10.4	-	27.9	44.7	58.4	34.5	77.6	78.3	142.5	-

...cont'd

Table 6 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by birthplace - Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace			CANADA	Province/Territory												
				Totals	NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region)	Unknown Birthplace	Cases	62	-	-	-	-	-	2	27	1	-	5	27	-	-
		Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**Cases**	**1271**	8	3	1	3	1	187	644	29	8	104	288	2	1
		Rate	**23.9**	9.2	30.0	21.0	6.6	3.8	25.6	22.3	20.7	14.5	24.4	29.4	59.3	30.5
Unknown Birthplace		Cases	21	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	13	-	-
		Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**Cases**	**1975**	**34**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**
		Rate	**6.6**	**1.4**	**2.7**	**3.7**	**0.7**	**0.9**	**4.9**	**6.8**	**8.4**	**11.8**	**5.8**	**10.2**	**6.2**	**45.8**

Table 7

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by main diagnostic site - Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Primary	Cases	130	-	-	-	-	4	43	5	58	1	10	-	9
	Rate	0.4	-	-	-	-	0.1	0.4	0.4	5.7	-	0.3	-	13.3
Miliary/ Disseminated	Cases	73	-	-	-	-	16	12	7	7	14	17	-	-
	Rate	0.2	-	-	-	-	0.2	0.1	0.6	0.7	0.5	0.4	-	-
Respiratory (pulm/other resp)*	Cases	1230	9	3	6	7	250	442	60	42	108	280	2	21
	Rate	4.1	1.6	2.2	0.6	0.9	3.4	3.9	5.3	4.1	3.8	7.1	6.2	31
Meninges and CNS	Cases	25	1	-	-	-	5	10	1	-	1	7	-	-
	Rate	0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-
Peripheral Lymph Node	Cases	266	3	1	-	-	-	160	10	7	21	63	-	1
	Rate	0.9	0.5	0.7	-	-	-	1.4	0.9	0.7	0.7	1.6	-	1.5
Other Sites	Cases	247	2	1	1	-	82	93	13	7	21	27	-	-
	Rate	0.8	0.4	0.7	0.1	-	1.1	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7	-	-
Unknown	Cases	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**Cases**	**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**
	Rate	**6.6**	**2.7**	**3.7**	**0.7**	**0.9**	**4.9**	**6.8**	**8.4**	**11.8**	**5.8**	**10.2**	**6.2**	**45.7**

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 6 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by birthplace - Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace			CANADA	Province/Territory												
				Totals	NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region)	Unknown Birthplace	Cases	62	-	-	-	-	-	2	27	1	-	5	27	-	-
		Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	Cases	1271	8	3	1	3	1	187	644	29	8	104	288	2	1
		Rate	23.9	9.2	30.0	21.0	6.6	3.8	25.6	22.3	20.7	14.5	24.4	29.4	59.3	30.5
Unknown Birthplace		Cases	21	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	13	-	-
		Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		Cases	1975	34	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
		Rate	6.6	1.4	2.7	3.7	0.7	0.9	4.9	6.8	8.4	11.8	5.8	10.2	6.2	45.8

Table 7

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by main diagnostic site - Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site		CANADA	Province/Territory											
			NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Primary	Cases	130	-	-	-	-	4	43	5	58	1	10	-	9
	Rate	0.4	-	-	-	-	0.1	0.4	0.4	5.7	-	0.3	-	13.3
Miliary/ Disseminated	Cases	73	-	-	-	-	16	12	7	7	14	17	-	-
	Rate	0.2	-	-	-	-	0.2	0.1	0.6	0.7	0.5	0.4	-	-
Respiratory (pulm/other resp)*	Cases	1230	9	3	6	7	250	442	60	42	108	280	2	21
	Rate	4.1	1.6	2.2	0.6	0.9	3.4	3.9	5.3	4.1	3.8	7.1	6.2	31
Meninges and CNS	Cases	25	1	-	-	-	5	10	1	-	1	7	-	-
	Rate	0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-
Peripheral Lymph Node	Cases	266	3	1	-	-	-	160	10	7	21	63	-	1
	Rate	0.9	0.5	0.7	-	-	-	1.4	0.9	0.7	0.7	1.6	-	1.5
Other Sites	Cases	247	2	1	1	-	82	93	13	7	21	27	-	-
	Rate	0.8	0.4	0.7	0.1	-	1.1	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7	-	-
Unknown	Cases	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	Rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Cases	1975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Rate	6.6	2.7	3.7	0.7	0.9	4.9	6.8	8.4	11.8	5.8	10.2	6.2	45.7

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 8

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace, sex and age group – Canada: 1997

Birthplace			TOTAL	Age Group									
				< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Canadian-born	Aboriginal												
	Status Indian	Male	109	3	14	9	8	23	17	12	8	6	9
		Female	103	2	7	15	15	18	13	7	9	7	10
		Total	212	5	21	24	23	41	30	19	17	13	19
	Non-status Indian/Metis	Male	23	1	1	4	4	2	2	2	6	-	1
		Female	29	1	4	3	7	5	1	2	3	-	3
		Total	52	2	5	7	11	7	3	4	9	-	4
	Inuit	Male	12	-	-	1	8	-	-	1	1	1	-
		Female	7	-	-	-	3	-	2	-	1	1	-
		Total	19	-	-	1	11	-	2	1	2	2	-
	Total	**Male**	**144**	**4**	**15**	**14**	**20**	**25**	**19**	**15**	**15**	**7**	**10**
		Female	**139**	**3**	**11**	**18**	**25**	**23**	**16**	**9**	**13**	**8**	**13**
		Total	**283**	**7**	**26**	**32**	**45**	**48**	**35**	**24**	**28**	**15**	**23**
	Non-aboriginal	Male	244	2	10	6	7	22	30	32	38	43	54
		Female	156	-	9	6	9	11	18	19	14	28	42
		Total	400	2	19	12	16	33	48	51	52	71	96
	Total	**Male**	**388**	**6**	**25**	**20**	**27**	**47**	**49**	**47**	**53**	**50**	**64**
		Female	**295**	**3**	**20**	**24**	**34**	**34**	**34**	**28**	**27**	**36**	**55**
		Total	**683**	**9**	**45**	**44**	**61**	**81**	**83**	**75**	**80**	**86**	**119**
Foreign-born (WHO Region)	Africa	Male	48	-	-	1	5	23	13	2	3	-	1
		Female	44	-	-	4	9	19	3	2	4	2	1
		Total	92	-	-	5	14	42	16	4	7	2	2
	Americas	Male	51	-	1	-	4	14	18	4	2	2	6
		Female	52	-	1	2	9	12	12	4	2	6	4
		Total	103	-	2	2	13	26	30	8	4	8	10

...cont'd

Table 8 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace, sex and age group – Canada: 1997

Birthplace			TOTAL	Age Group									
				< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Foreign-born (WHO Region)	East Mediterranean	Male	60	-	-	1	15	17	13	3	3	6	2
		Female	54	-	1	-	11	19	6	7	6	3	1
		Total	114	-	1	1	26	36	19	10	9	9	3
	Europe	Male	82	-	-	-	4	6	6	11	13	19	23
		Female	52	-	-	-	2	5	8	6	8	8	15
		Total	134	-	-	-	6	11	14	17	21	27	38
	South East Asia	Male	105	-	-	-	9	25	16	12	15	12	16
		Female	92	-	-	1	20	18	10	10	13	12	8
		Total	197	-	-	1	29	43	26	22	28	24	24
	Western Pacific	Male	268	-	1	2	28	50	37	36	36	41	37
		Female	301	-	-	1	34	82	58	40	30	33	23
		Total	569	-	1	3	62	132	95	76	66	74	60
	Unknown Birthplace	Male	36	-	-	1	1	8	5	3	3	6	9
		Female	26	-	-	1	2	3	2	1	7	6	4
		Total	62	-	-	2	3	11	7	4	10	12	13
	Total	**Male**	**649**	-	**2**	**5**	**66**	**143**	**108**	**71**	**75**	**86**	**94**
		Female	**621**	-	**2**	**9**	**87**	**158**	**99**	**70**	**70**	**70**	**56**
		Total	**1271**	-	**4**	**14**	**153**	**301**	**207**	**141**	**145**	**156**	**150**
Unknown Birthplace		Male	14	-	-	-	-	3	1	-	2	3	5
		Female	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
		Total	21	-	-	-	-	3	1	-	3	4	10
TOTAL		**Male**	**1052**	**6**	**27**	**25**	**93**	**193**	**158**	**118**	**130**	**139**	**163**
		Female	**923**	**3**	**22**	**33**	**121**	**192**	**133**	**98**	**98**	**107**	**116**
		Total	**1975**	**9**	**49**	**58**	**214**	**385**	**291**	**216**	**228**	**246**	**279**

Table 8

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace, sex and age group – Canada: 1997

Birthplace			TOTAL	Age Group									
				< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Canadian-born	Aboriginal												
	Status Indian	Male	109	3	14	9	8	23	17	12	8	6	9
		Female	103	2	7	15	15	18	13	7	9	7	10
		Total	**212**	**5**	**21**	**24**	**23**	**41**	**30**	**19**	**17**	**13**	**19**
	Non-status Indian/Metis	Male	23	1	1	4	4	2	2	2	6	-	1
		Female	29	1	4	3	7	5	1	2	3	-	3
		Total	**52**	**2**	**5**	**7**	**11**	**7**	**3**	**4**	**9**	**-**	**4**
	Inuit	Male	12	-	-	1	8	-	-	1	1	1	-
		Female	7	-	-	-	3	-	2	-	1	1	-
		Total	**19**	**-**	**-**	**1**	**11**	**-**	**2**	**1**	**2**	**2**	**-**
	Total	**Male**	**144**	**4**	**15**	**14**	**20**	**25**	**19**	**15**	**15**	**7**	**10**
		Female	**139**	**3**	**11**	**18**	**25**	**23**	**16**	**9**	**13**	**8**	**13**
		Total	**283**	**7**	**26**	**32**	**45**	**48**	**35**	**24**	**28**	**15**	**23**
	Non-aboriginal	Male	244	2	10	6	7	22	30	32	38	43	54
		Female	156	-	9	6	9	11	18	19	14	28	42
		Total	**400**	**2**	**19**	**12**	**16**	**33**	**48**	**51**	**52**	**71**	**96**
	Total	**Male**	**388**	**6**	**25**	**20**	**27**	**47**	**49**	**47**	**53**	**50**	**64**
		Female	**295**	**3**	**20**	**24**	**34**	**34**	**34**	**28**	**27**	**36**	**55**
		Total	**683**	**9**	**45**	**44**	**61**	**81**	**83**	**75**	**80**	**86**	**119**
Foreign-born (WHO Region)	Africa	Male	48	-	-	1	5	23	13	2	3	-	1
		Female	44	-	-	4	9	19	3	2	4	2	1
		Total	**92**	**-**	**-**	**5**	**14**	**42**	**16**	**4**	**7**	**2**	**2**
	Americas	Male	51	-	1	-	4	14	18	4	2	2	6
		Female	52	-	1	2	9	12	12	4	2	6	4
		Total	**103**	**-**	**2**	**2**	**13**	**26**	**30**	**8**	**4**	**8**	**10**

...cont'd

Table 8 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace, sex and age group – Canada: 1997

Birthplace			TOTAL	Age Group									
				< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Foreign-born (WHO Region)	East Mediterranean	Male	60	-	-	1	15	17	13	3	3	6	2
		Female	54	-	1	-	11	19	6	7	6	3	1
		Total	**114**	**-**	**1**	**1**	**26**	**36**	**19**	**10**	**9**	**9**	**3**
	Europe	Male	82	-	-	-	4	6	6	11	13	19	23
		Female	52	-	-	-	2	5	8	6	8	8	15
		Total	**134**	**-**	**-**	**-**	**6**	**11**	**14**	**17**	**21**	**27**	**38**
	South East Asia	Male	105	-	-	-	9	25	16	12	15	12	16
		Female	92	-	-	1	20	18	10	10	13	12	8
		Total	**197**	**-**	**-**	**1**	**29**	**43**	**26**	**22**	**28**	**24**	**24**
	Western Pacific	Male	268	-	1	2	28	50	37	36	36	41	37
		Female	301	-	-	1	34	82	58	40	30	33	23
		Total	**569**	**-**	**1**	**3**	**62**	**132**	**95**	**76**	**66**	**74**	**60**
	Unknown Birthplace	Male	36	-	-	1	1	8	5	3	3	6	9
		Female	26	-	-	1	2	3	2	1	7	6	4
		Total	**62**	**-**	**-**	**2**	**3**	**11**	**7**	**4**	**10**	**12**	**13**
	Total	**Male**	**649**	**-**	**2**	**5**	**66**	**143**	**108**	**71**	**75**	**86**	**94**
		Female	**621**	**-**	**2**	**9**	**87**	**158**	**99**	**70**	**70**	**70**	**56**
		Total	**1271**	**-**	**4**	**14**	**153**	**301**	**207**	**141**	**145**	**156**	**150**
Unknown Birthplace		Male	14	-	-	-	-	3	1	-	2	3	5
		Female	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
		Total	**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1**	**-**	**3**	**4**	**10**
TOTAL		**Male**	**1052**	**6**	**27**	**25**	**93**	**193**	**158**	**118**	**130**	**139**	**163**
		Female	**923**	**3**	**22**	**33**	**121**	**192**	**133**	**98**	**98**	**107**	**116**
		Total	**1975**	**9**	**49**	**58**	**214**	**385**	**291**	**216**	**228**	**246**	**279**

Table 9

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group and main diagnostic site – Canada: 1997

Age Group		TOTAL	Main Diagnostic Site						
			Primary	Miliary/ Disseminated	Respiratory (pulm/ other resp)*	Meninges and CNS	Peripheral Lymph Node	Other Sites*	Unknown
< 1	Cases	9	8	-	1	-	-	-	-
	Rate	2.5	2.2	-	0.3	-	-	-	-
0 – 4	Cases	49	36	-	9	-	2	2	-
	Rate	3.1	2.3	-	0.6	-	0.1	0.1	-
5 – 14	Cases	58	33	-	10	1	8	6	-
	Rate	1.4	0.8	-	0.2	-	0.2	0.1	-
15 – 24	Cases	214	18	7	142	-	32	15	-
	Rate	5.3	0.4	0.2	3.5	-	0.8	0.4	-
25 – 34	Cases	385	10	11	241	7	74	41	1
	Rate	8.2	0.2	0.2	5.2	0.1	1.6	0.9	-
35 – 44	Cases	291	7	9	167	7	50	51	-
	Rate	5.7	0.1	0.2	3.3	0.1	1.0	1.0	-
45 – 54	Cases	216	6	9	119	2	35	44	1
	Rate	5.5	0.2	0.2	3.0	0.1	0.9	1.1	-
55 – 64	Cases	228	1	9	154	2	29	32	1
	Rate	8.8	-	0.3	6.0	0.1	1.1	1.2	-
65 – 74	Cases	246	4	10	175	4	21	31	1
	Rate	11.7	0.2	0.5	8.3	0.2	1.0	1.5	-
75 +	Cases	279	7	18	212	2	15	25	-
	Rate	18.0	0.5	1.2	13.7	0.1	1.0	1.6	-
TOTAL	**Cases**	**1975**	**130**	**73**	**1230**	**25**	**266**	**247**	**4**
	Rate	**6.6**	**0.4**	**0.2**	**4.1**	**0.1**	**0.9**	**0.8**	-

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 10

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and main diagnostic site – Canada: 1997

Birthplace		TOTAL	Main Diagnostic Site						
			Primary	Miliary/ Dissem-inated	Respiratory (pulm/ other resp)*	Meninges and CNS	Peripheral Lymph Node	Other Sites*	Unknown
Canadian-born	Aboriginal								
	Status Indian	**212**	62	10	126	3	4	7	-
	Non-status Indian/Metis	**52**	12	2	26	-	2	10	-
	Inuit	**19**	1	-	17	-	1	-	-
	Total Aboriginal	**283**	**75**	**12**	**169**	**3**	**7**	**17**	-
	Non-aboriginal	**400**	27	17	281	6	20	46	3
	Total Canadian-born	**683**	**102**	**29**	**450**	**9**	**27**	**63**	**3**
Foreign-born (WHO Region)	Africa	**92**	1	2	54	4	16	14	1
	Americas	**103**	1	6	68	2	4	22	-
	East Mediterranean	**114**	1	3	61	2	28	19	-
	Europe	**134**	6	5	83	4	13	23	-
	South East Asia	**197**	3	10	117	2	44	21	-
	Western Pacific	**569**	15	14	343	1	125	71	-
	Unknown Birthplace	**62**	1	2	37	1	9	12	-
	Total Foreign-born	**1271**	**28**	**42**	**763**	**16**	**239**	**182**	**1**
Unknown Birthplace		**21**	-	2	17	-	-	2	-
TOTAL		**1975**	**130**	**73**	**1230**	**25**	**266**	**247**	**4**

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 9

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and incidence rate per 100,000 by age group and main diagnostic site – Canada: 1997

Age Group		TOTAL	Main Diagnostic Site						
			Primary	Miliary/ Disseminated	Respiratory (pulm/ other resp)*	Meninges and CNS	Peripheral Lymph Node	Other Sites*	Unknown
< 1	Cases	9	8	-	1	-	-	-	-
	Rate	2.5	2.2	-	0.3	-	-	-	-
0 – 4	Cases	49	36	-	9	-	2	2	-
	Rate	3.1	2.3	-	0.6	-	0.1	0.1	-
5 – 14	Cases	58	33	-	10	1	8	6	-
	Rate	1.4	0.8	-	0.2	-	0.2	0.1	-
15 – 24	Cases	214	18	7	142	-	32	15	-
	Rate	5.3	0.4	0.2	3.5	-	0.8	0.4	-
25 – 34	Cases	385	10	11	241	7	74	41	1
	Rate	8.2	0.2	0.2	5.2	0.1	1.6	0.9	-
35 – 44	Cases	291	7	9	167	7	50	51	-
	Rate	5.7	0.1	0.2	3.3	0.1	1.0	1.0	-
45 – 54	Cases	216	6	9	119	2	35	44	1
	Rate	5.5	0.2	0.2	3.0	0.1	0.9	1.1	-
55 – 64	Cases	228	1	9	154	2	29	32	1
	Rate	8.8	-	0.3	6.0	0.1	1.1	1.2	-
65 – 74	Cases	246	4	10	175	4	21	31	1
	Rate	11.7	0.2	0.5	8.3	0.2	1.0	1.5	-
75 +	Cases	279	7	18	212	2	15	25	-
	Rate	18.0	0.5	1.2	13.7	0.1	1.0	1.6	-
TOTAL	Cases	1975	130	73	1230	25	266	247	4
	Rate	6.6	0.4	0.2	4.1	0.1	0.9	0.8	-

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 10

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and main diagnostic site – Canada: 1997

Birthplace		TOTAL	Main Diagnostic Site						
			Primary	Miliary/ Dissem-inated	Respiratory (pulm/ other resp)*	Meninges and CNS	Peripheral Lymph Node	Other Sites*	Unknown
Canadian-born	Aboriginal								
	Status Indian	212	62	10	126	3	4	7	-
	Non-status Indian/Metis	52	12	2	26	-	2	10	-
	Inuit	19	1	-	17	-	1	-	-
	Total Aboriginal	**283**	**75**	**12**	**169**	**3**	**7**	**17**	**-**
	Non-aboriginal	400	27	17	281	6	20	46	3
	Total Canadian-born	**683**	**102**	**29**	**450**	**9**	**27**	**63**	**3**
Foreign-born (WHO Region)	Africa	92	1	2	54	4	16	14	1
	Americas	103	1	6	68	2	4	22	-
	East Mediterranean	114	1	3	61	2	28	19	-
	Europe	134	6	5	83	4	13	23	-
	South East Asia	197	3	10	117	2	44	21	-
	Western Pacific	569	15	14	343	1	125	71	-
	Unknown Birthplace	62	1	2	37	1	9	12	-
	Total Foreign-born	**1271**	**28**	**42**	**763**	**16**	**239**	**182**	**1**
Unknown Birthplace		21	-	2	17	-	-	2	-
TOTAL		**1975**	**130**	**73**	**1230**	**25**	**266**	**247**	**4**

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 11

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and activity status – Canada: 1997

Birthplace		TOTAL	Activity Status		
			New Active Cases	Relapsed Cases	Unknown Status
Canadian-born	Aboriginal				
	Status Indian	212	181	31	-
	Non-Status Indian/Metis	52	42	10	-
	Inuit	19	14	5	-
	Total Aboriginal	**283**	**237**	**46**	**-**
	Non-aboriginal	400	355	42	3
	Total Canadian-born	**683**	**592**	**88**	**3**
Foreign-born (WHO Region)	Africa	92	86	3	3
	Americas	103	93	10	-
	East Mediterranean	114	109	5	-
	Europe	134	116	18	-
	South East Asia	197	187	9	1
	Western Pacific	569	512	56	1
	Unknown Birthplace	62	57	5	-
	Total Foreign-born	**1271**	**1160**	**106**	**5**
Unknown Birthplace		21	17	3	1
TOTAL		**1975**	**1769**	**197**	**9**

Table 12

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Bacillary Status	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
1. Microscopy positive													
a. Culture positive	759	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
b. Culture negative	52	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
c. Culture not done/unk.	142	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
Total	**953**	**7**	**2**	**3**	**6**	**201**	**378**	**51**	**30**	**61**	**199**	**1**	**14**
2. Microscopy negative													
a. Culture positive	415	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
b. Culture negative	87	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Total	**506**	**2**	**3**	**3**	**1**	**90**	**95**	**41**	**37**	**78**	**139**	**1**	**16**
3. Microscopy not done/unk.													
a. Culture positive	414	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
c. Culture not done/unk.	77	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
Total	**516**	**6**	**-**	**1**	**-**	**69**	**288**	**4**	**54**	**27**	**66**	**-**	**1**
TOTAL	**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Table 11

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and activity status – Canada: 1997

Birthplace		TOTAL	Activity Status		
			New Active Cases	Relapsed Cases	Unknown Status
Canadian-born	Aboriginal				
	Status Indian	212	181	31	-
	Non-Status Indian/Metis	52	42	10	-
	Inuit	19	14	5	-
	Total Aboriginal	**283**	**237**	**46**	-
	Non-aboriginal	400	355	42	3
	Total Canadian-born	**683**	**592**	**88**	**3**
Foreign-born (WHO Region)	Africa	92	86	3	3
	Americas	103	93	10	-
	East Mediterranean	114	109	5	-
	Europe	134	116	18	-
	South East Asia	197	187	9	1
	Western Pacific	569	512	56	1
	Unknown Birthplace	62	57	5	-
	Total Foreign-born	**1271**	**1160**	**106**	**5**
Unknown Birthplace		21	17	3	1
TOTAL		**1975**	**1769**	**197**	**9**

Table 12

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Bacillary Status	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
1. Microscopy positive													
a. Culture positive	759	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
b. Culture negative	52	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
c. Culture not done/unk.	142	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
Total	**953**	**7**	**2**	**3**	**6**	**201**	**378**	**51**	**30**	**61**	**199**	**1**	**14**
2. Microscopy negative													
a. Culture positive	415	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
b. Culture negative	87	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Total	**506**	**2**	**3**	**3**	**1**	**90**	**95**	**41**	**37**	**78**	**139**	**1**	**16**
3. Microscopy not done/unk.													
a. Culture positive	414	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
c. Culture not done/unk.	77	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
Total	**516**	**6**	**-**	**1**	**-**	**69**	**288**	**4**	**54**	**27**	**66**	**-**	**1**
TOTAL	**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Table 13

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and birthplace – Canada: 1997

Bacillary Status	TOTAL	Birthplace			
		Canadian-born Aboriginal	Canadian-born Non-aboriginal	Foreign-born	Unknown Birthplace
1. Microscopy positive					
a. Culture positive	**759**	113	171	466	9
b. Culture negative	**52**	6	11	35	-
c. Culture not done/unk.	**142**	1	30	110	1
Total	**953**	**120**	**212**	**611**	**10**
2. Microscopy negative					
a. Culture positive	**415**	60	86	265	4
b. Culture negative	**87**	27	22	38	-
c. Culture not done/unk.	**4**	-	2	2	-
Total	**506**	**87**	**110**	**305**	**4**
3. Microscopy not done/unk.					
a. Culture positive	**414**	28	66	314	6
b. Culture negative	**25**	25	-	-	-
c. Culture not done/unk.	**77**	23	12	41	1
Total	**516**	**76**	**78**	**355**	**7**
TOTAL	**1975**	**283**	**400**	**1271**	**21**

Table 14

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada: 1997

Bacillary Status	TOTAL	Main Diagnostic Site						
		Primary	Miliary/ Disseminated	Respiratory (pulm/ other resp)*	Meninges and CNS	Peripheral Lymph Node	Other Sites*	Unknown
1. Microscopy positive								
a. Culture positive	**759**	16	45	556	4	65	70	3
b. Culture negative	**52**	1	-	44	1	2	4	-
c. Culture not done/unk.	**142**	8	2	64	4	40	24	-
Total	**953**	**25**	**47**	**664**	**9**	**107**	**98**	**3**
2. Microscopy negative								
a. Culture positive	**415**	15	19	332	3	30	16	-
b. Culture negative	**87**	20	-	53	2	5	7	-
c. Culture not done/unk.	**4**	-	-	2	-	-	2	-
Total	**506**	**35**	**19**	**387**	**5**	**35**	**25**	**-**
3. Microscopy not done/unk.								
a. Culture positive	**414**	27	7	150	10	111	108	1
b. Culture negative	**25**	25	-	-	-	-	-	-
c. Culture not done/unk.	**77**	18	-	29	1	13	16	-
Total	**516**	**70**	**7**	**179**	**11**	**124**	**124**	**1**
TOTAL	**1975**	**130**	**73**	**1230**	**25**	**266**	**247**	**4**

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 13

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and birthplace – Canada: 1997

Bacillary Status	TOTAL	Birthplace			
		Canadian-born Aboriginal	Canadian-born Non-aboriginal	Foreign-born	Unknown Birthplace
1. Microscopy positive					
a. Culture positive	759	113	171	466	9
b. Culture negative	52	6	11	35	-
c. Culture not done/unk.	142	1	30	110	1
Total	**953**	**120**	**212**	**611**	**10**
2. Microscopy negative					
a. Culture positive	415	60	86	265	4
b. Culture negative	87	27	22	38	-
c. Culture not done/unk.	4	-	2	2	-
Total	**506**	**87**	**110**	**305**	**4**
3. Microscopy not done/unk.					
a. Culture positive	414	28	66	314	6
b. Culture negative	25	25	-	-	-
c. Culture not done/unk.	77	23	12	41	1
Total	**516**	**76**	**78**	**355**	**7**
TOTAL	**1975**	**283**	**400**	**1271**	**21**

Table 14

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada: 1997

Bacillary Status	TOTAL	Main Diagnostic Site						
		Primary	Miliary/ Disseminated	Respiratory (pulm/ other resp)*	Meninges and CNS	Peripheral Lymph Node	Other Sites*	Unknown
1. Microscopy positive								
a. Culture positive	759	16	45	556	4	65	70	3
b. Culture negative	52	1	-	44	1	2	4	-
c. Culture not done/unk.	142	8	2	64	4	40	24	-
Total	**953**	**25**	**47**	**664**	**9**	**107**	**98**	**3**
2. Microscopy negative								
a. Culture positive	415	15	19	332	3	30	16	-
b. Culture negative	87	20	-	53	2	5	7	-
c. Culture not done/unk.	4	-	-	2	-	-	2	-
Total	**506**	**35**	**19**	**387**	**5**	**35**	**25**	**-**
3. Microscopy not done/unk.								
a. Culture positive	414	27	7	150	10	111	108	1
b. Culture negative	25	25	-	-	-	-	-	-
c. Culture not done/unk.	77	18	-	29	1	13	16	-
Total	**516**	**70**	**7**	**179**	**11**	**124**	**124**	**1**
TOTAL	**1975**	**130**	**73**	**1230**	**25**	**266**	**247**	**4**

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 15

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Primary	1. Microscopy positive	a. Culture positive	16	-	-	-	-	-	12	-	1	-	1	-	2
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	15	-	-	-	-	-	4	1	4	-	1	-	5
		b. Culture negative	20	-	-	-	-	3	-	4	10	-	1	-	2
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	27	-	-	-	-	1	18	-	8	-	-	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	18	-	-	-	-	-	-	-	10	1	7	-	-
	Total		**130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**43**	**5**	**58**	**1**	**10**	**-**	**9**
Miliary/ Disseminated	1. Microscopy positive	a. Culture positive	45	-	-	-	-	14	2	6	3	8	12	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	19	-	-	-	-	2	2	1	4	6	4	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**12**	**7**	**7**	**14**	**17**	**-**	**-**

...cont'd

Table 15 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Respiratory (pulm/ other resp)*	1. Microscopy positive	a. Culture positive	556	5	1	2	6	146	156	29	23	42	134	1	11
		b. Culture negative	44	-	-	-	-	6	29	1	-	-	7	-	1
		c. Culture not done/unk.	64	-	-	-	-	-	62	1	-	-	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	332	1	2	2	1	65	88	24	10	48	84	-	7
		b. Culture negative	53	1	-	1	-	9	-	3	3	9	24	1	2
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	150	1	-	1	-	18	106	2	3	6	13	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	29	1	-	-	-	5	1	-	3	3	16	-	-
	Total		**1230**	**9**	**3**	**6**	**7**	**250**	**442**	**60**	**42**	**108**	**280**	**2**	**21**
Meninges and CNS	1. Microscopy positive	a. Culture positive	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
		b. Culture negative	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	10	1	-	-	-	4	3	-	-	-	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Total		**25**	**1**	**-**	**-**	**-**	**5**	**10**	**1**	**-**	**1**	**7**	**-**	**-**

* Please refer to Technical Notes for definition.

...cont'd

Table 15

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Primary	1. Microscopy positive	a. Culture positive	16	-	-	-	-	-	12	-	1	-	1	-	2
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	15	-	-	-	-	-	4	1	4	-	1	-	5
		b. Culture negative	20	-	-	-	-	3	-	4	10	-	1	-	2
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	27	-	-	-	-	1	18	-	8	-	-	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	18	-	-	-	-	-	-	-	10	1	7	-	-
	Total		**130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**43**	**5**	**58**	**1**	**10**	**-**	**9**
Miliary/ Disseminated	1. Microscopy positive	a. Culture positive	45	-	-	-	-	14	2	6	3	8	12	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	19	-	-	-	-	2	2	1	4	6	4	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**12**	**7**	**7**	**14**	**17**	**-**	**-**

...cont'd

Table 15 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Respiratory (pulm/ other resp)*	1. Microscopy positive	a. Culture positive	556	5	1	2	6	146	156	29	23	42	134	1	11
		b. Culture negative	44	-	-	-	-	6	29	1	-	-	7	-	1
		c. Culture not done/unk.	64	-	-	-	-	-	62	1	-	-	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	332	1	2	2	1	65	88	24	10	48	84	-	7
		b. Culture negative	53	1	-	1	-	9	-	3	3	9	24	1	2
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	150	1	-	1	-	18	106	2	3	6	13	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	29	1	-	-	-	5	1	-	3	3	16	-	-
	Total		**1230**	**9**	**3**	**6**	**7**	**250**	**442**	**60**	**42**	**108**	**280**	**2**	**21**
Meninges and CNS	1. Microscopy positive	a. Culture positive	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
		b. Culture negative	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	10	1	-	-	-	4	3	-	-	-	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Total		**25**	**1**	**-**	**-**	**-**	**5**	**10**	**1**	**-**	**1**	**7**	**-**	**-**

* Please refer to Technical Notes for definition.

...cont'd

Table 15 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Peripheral Lymph Node	1. Microscopy positive	a. Culture positive	65	2	-	-	-	-	27	5	2	3	26	-	-
		b. Culture negative	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	40	-	-	-	-	-	36	2	-	-	2	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	30	-	1	-	-	-	-	2	4	9	14	-	-
		b. Culture negative	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	111	1	-	-	-	-	97	-	-	2	11	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	1
	Total		**266**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**160**	**10**	**7**	**21**	**63**	**-**	**1**
Other Sites*	1. Microscopy positive	a. Culture positive	70	-	1	-	-	31	15	2	1	6	14	-	-
		b. Culture negative	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	24	-	-	1	-	2	18	1	-	1	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	16	-	-	-	-	6	1	5	-	-	4	-	-
		b. Culture negative	7	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	108	2	-	-	-	36	56	2	3	3	6	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	16	-	-	-	-	4	1	-	2	7	2	-	-
	Total		**247**	**2**	**1**	**1**	**-**	**82**	**93**	**13**	**7**	**21**	**27**	**-**	**-**

* Please refer to Technical Notes for definition.

...cont'd

Table 15 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Unknown	1. Microscopy positive	a. Culture positive	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	1. Microscopy positive	a. Culture positive	**759**	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
		b. Culture negative	**52**	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
		c. Culture not done/unk.	**142**	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	**415**	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
		b. Culture negative	**87**	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
		c. Culture not done/unk.	**4**	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	**414**	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
		b. Culture negative	**25**	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	**77**	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
	Total		**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Table 15 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Peripheral Lymph Node	1. Microscopy positive	a. Culture positive	65	2	-	-	-	-	27	5	2	3	26	-	-
		b. Culture negative	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	40	-	-	-	-	-	36	2	-	-	2	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	30	-	1	-	-	-	-	2	4	9	14	-	-
		b. Culture negative	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	111	1	-	-	-	-	97	-	-	2	11	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	1
	Total		**266**	**3**	**1**	-	-	-	**160**	**10**	**7**	**21**	**63**	-	**1**
Other Sites*	1. Microscopy positive	a. Culture positive	70	-	1	-	-	31	15	2	1	6	14	-	-
		b. Culture negative	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	24	-	-	1	-	2	18	1	-	1	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	16	-	-	-	-	6	1	5	-	-	4	-	-
		b. Culture negative	7	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	108	2	-	-	-	36	56	2	3	3	6	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	16	-	-	-	-	4	1	-	2	7	2	-	-
	Total		**247**	**2**	**1**	**1**	-	**82**	**93**	**13**	**7**	**21**	**27**	-	-

...cont'd

* Please refer to Technical Notes for definition.

Table 15 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by bacillary status and main diagnostic site – Canada and provinces/territories: 1997

Main Diagnostic Site	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Unknown	1. Microscopy positive	a. Culture positive	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**4**	-	-	-	-	**3**	**1**	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1. Microscopy positive	a. Culture positive	**759**	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
		b. Culture negative	**52**	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
		c. Culture not done/unk.	**142**	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	**415**	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
		b. Culture negative	**87**	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
		c. Culture not done/unk.	**4**	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	**414**	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
		b. Culture negative	**25**	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	**77**	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
	Total		**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Table 16

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Canadian-born	Aboriginal														
	Status Indian														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	84	-	-	-	2	-	5	24	16	15	14	-	8
		b. Culture negative	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	49	-	-	-	-	-	-	10	14	10	7	-	8
		b. Culture negative	20	-	-	-	-	-	-	-	13	1	5	-	1
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	17	-	-	-	-	-	4	-	8	2	3	-	-
		b. Culture negative	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	14	-	-	-	-	-	-	-	9	-	5	-	-
	Total Status Indian		**212**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**9**	**38**	**82**	**28**	**35**	**-**	**18**
	Non-status Indian/Metis														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	20	-	-	1	-	3	1	-	8	5	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
		b. Culture negative	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	11	-	-	1	-	4	-	-	4	-	2	-	-
		b. Culture negative	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	7	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-
	Total Non-status Indian/Metis		**52**	**-**	**-**	**3**	**-**	**10**	**1**	**1**	**24**	**6**	**6**	**-**	**1**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Canadian-born (Cont'd)	*Aboriginal (cont'd)*														
	Inuit														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	9	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	5
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
		b. Culture negative	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Total Inuit		**19**	**1**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**
	Total														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	113	-	-	1	2	6	6	25	24	20	16	-	13
		b. Culture negative	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	60	-	-	-	-	2	-	11	17	11	8	-	11
		b. Culture negative	27	1	-	-	-	2	-	-	14	1	5	-	4
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	28	-	-	1	-	4	4	-	12	2	5	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	23	-	-	-	-	2	-	-	14	-	6	-	1
	Total Aboriginal		**283**	**1**	**-**	**3**	**2**	**16**	**10**	**40**	**106**	**34**	**41**	**-**	**30**

...cont'd

Table 16

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Canadian-born	Aboriginal														
	Status Indian														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	84	-	-	-	2	-	5	24	16	15	14	-	8
		b. Culture negative	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	49	-	-	-	-	-	-	10	14	10	7	-	8
		b. Culture negative	20	-	-	-	-	-	-	-	13	1	5	-	1
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	17	-	-	-	-	-	4	-	8	2	3	-	-
		b. Culture negative	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	14	-	-	-	-	-	-	-	9	-	5	-	-
	Total Status Indian		212	-	-	-	2	-	9	38	82	28	35	-	18
	Non-status Indian/Metis														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	20	-	-	1	-	3	1	-	8	5	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
		b. Culture negative	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	11	-	-	1	-	4	-	-	4	-	2	-	-
		b. Culture negative	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	7	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-
	Total Non-status Indian/Metis		52	-	-	3	-	10	1	1	24	6	6	-	1

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Canadian-born *(Cont'd)*	Aboriginal *(cont'd)*														
	Inuit														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	9	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	5
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
		b. Culture negative	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Total Inuit		**19**	**1**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**
	Total														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	113	-	-	1	2	6	6	25	24	20	16	-	13
		b. Culture negative	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	60	-	-	-	-	2	-	11	17	11	8	-	11
		b. Culture negative	27	1	-	-	-	2	-	-	14	1	5	-	4
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	28	-	-	1	-	4	4	-	12	2	5	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	23	-	-	-	-	2	-	-	14	-	6	-	1
	Total Aboriginal		**283**	**1**	**-**	**3**	**2**	**16**	**10**	**40**	**106**	**34**	**41**	**-**	**30**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Canadian-born *(Cont'd)*	Non-aboriginal														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	171	4	2	1	4	92	22	8	2	8	28	-	-
		b. Culture negative	11	-	-	-	-	4	4	1	-	-	2	-	-
		c. Culture not done/unk.	30	-	-	-	-	-	26	2	-	1	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	86	1	2	-	-	25	17	12	2	10	17	-	-
		b. Culture negative	22	-	-	-	-	8	-	3	1	4	6	-	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	66	5	-	-	-	22	33	1	1	2	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	12	1	-	-	-	2	-	-	1	3	5	-	-
	Total Non-aboriginal		**400**	**11**	**4**	**1**	**4**	**154**	**102**	**27**	**7**	**28**	**62**	**-**	**-**
	Canadian-born														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	284	4	2	2	6	98	28	33	26	28	44	-	13
		b. Culture negative	17	-	-	-	-	4	4	5	-	-	3	-	1
		c. Culture not done/unk.	31	-	-	1	-	-	26	2	-	1	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	146	1	2	-	-	27	17	23	19	21	25	-	11
		b. Culture negative	49	1	-	-	-	10	-	3	15	5	11	-	4
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	94	5	-	1	-	26	37	1	13	4	7	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	35	1	-	-	-	4	-	-	15	3	11	-	1
	Total Canadian-born		**683**	**12**	**4**	**4**	**6**	**170**	**112**	**67**	**113**	**62**	**103**	**-**	**30**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region)	Africa														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	37	-	-	-	-	11	18	1	-	3	4	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	17	-	-	-	1	5	6	1	-	2	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	22	-	-	-	-	2	17	1	-	1	1	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Total Africa		**92**	**-**	**-**	**-**	**1**	**19**	**52**	**3**	**-**	**8**	**9**	**-**	**-**
	Americas														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	54	-	-	-	-	28	16	2	1	2	5	-	-
		b. Culture negative	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
		c. Culture not done/unk.	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	12	-	-	-	-	6	1	-	1	-	4	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	23	-	-	-	-	9	13	1	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Total Americas		**103**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48**	**38**	**3**	**2**	**2**	**10**	**-**	**-**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Canadian-born *(Cont'd)*	Non-aboriginal														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	171	4	2	1	4	92	22	8	2	8	28	-	-
		b. Culture negative	11	-	-	-	-	4	4	1	-	-	2	-	-
		c. Culture not done/unk.	30	-	-	-	-	-	26	2	-	1	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	86	1	2	-	-	25	17	12	2	10	17	-	-
		b. Culture negative	22	-	-	-	-	8	-	3	1	4	6	-	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	66	5	-	-	-	22	33	1	1	2	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	12	1	-	-	-	2	-	-	1	3	5	-	-
	Total Non-aboriginal		**400**	**11**	**4**	**1**	**4**	**154**	**102**	**27**	**7**	**28**	**62**	**-**	**-**
	Canadian-born														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	284	4	2	2	6	98	28	33	26	28	44	-	13
		b. Culture negative	17	-	-	-	-	4	4	5	-	-	3	-	1
		c. Culture not done/unk.	31	-	-	1	-	-	26	2	-	1	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	146	1	2	-	-	27	17	23	19	21	25	-	11
		b. Culture negative	49	1	-	-	-	10	-	3	15	5	11	-	4
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	94	5	-	1	-	26	37	1	13	4	7	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	35	1	-	-	-	4	-	-	15	3	11	-	1
	Total Canadian-born		**683**	**12**	**4**	**4**	**6**	**170**	**112**	**67**	**113**	**62**	**103**	**-**	**30**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region)	Africa														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	37	-	-	-	-	11	18	1	-	3	4	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	17	-	-	-	1	5	6	1	-	2	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	22	-	-	-	-	2	17	1	-	1	1	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Total Africa		**92**	-	-	-	1	19	52	3	-	8	9	-	-
	Americas														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	54	-	-	-	-	28	16	2	1	2	5	-	-
		b. Culture negative	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
		c. Culture not done/unk.	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	12	-	-	-	-	6	1	-	1	-	4	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	23	-	-	-	-	9	13	1	-	-	-	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Total Americas		**103**	-	-	-	-	48	38	3	2	2	10	-	-

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region) *(cont'd)*	East Mediterranean														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	28	-	-	-	-	8	15	2	-	-	3	-	-
		b. Culture negative	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	24	-	-	1	-	6	11	-	-	3	3	-	-
		b. Culture negative	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	36	-	-	-	-	6	29	-	-	-	1	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Total East Mediterranean		**114**	**-**	**-**	**2**	**-**	**21**	**77**	**3**	**-**	**3**	**8**	**-**	**-**
	Europe														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	49	-	-	-	-	14	21	-	-	4	10	-	-
		b. Culture negative	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	39	-	1	-	-	13	16	-	-	3	5	-	1
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	33	-	-	-	-	4	25	-	1	1	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	Total Europe		**134**	**-**	**1**	**-**	**-**	**32**	**70**	**-**	**1**	**10**	**18**	**1**	**1**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region) *(cont'd)*	South East Asia														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	76	-	-	-	-	14	30	-	1	3	28	-	-
		b. Culture negative	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		c. Culture not done/unk.	23	-	-	-	-	1	21	-	-	-	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	35	-	-	-	-	4	10	2	-	3	16	-	-
		b. Culture negative	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	51	-	-	-	-	3	45	-	-	1	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	Total South East Asia		**197**	-	-	-	-	**22**	**110**	**2**	**1**	**7**	**55**	-	-
	Western Pacific														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	200	3	-	-	-	18	80	4	2	18	74	1	-
		b. Culture negative	13	-	-	-	-	-	10	-	-	1	2	-	-
		c. Culture not done/unk.	48	-	-	-	-	1	43	2	-	-	2	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	124	-	-	1	-	12	31	6	2	28	44	-	-
		b. Culture negative	28	-	-	-	-	2	-	4	-	10	12	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	134	-	-	-	-	8	105	1	-	4	16	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	22	-	-	-	-	2	1	-	-	8	11	-	-
	Total Western Pacific		**569**	**3**	-	**1**	-	**43**	**270**	**17**	**4**	**69**	**161**	**1**	-

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region) *(cont'd)*	East Mediterranean														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	28	-	-	-	-	8	15	2	-	-	3	-	-
		b. Culture negative	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	24	-	-	1	-	6	11	-	-	3	3	-	-
		b. Culture negative	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	36	-	-	-	-	6	29	-	-	-	1	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Total East Mediterranean		**114**	**-**	**-**	**2**	**-**	**21**	**77**	**3**	**-**	**3**	**8**	**-**	**-**
	Europe														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	49	-	-	-	-	14	21	-	-	4	10	-	-
		b. Culture negative	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	39	-	1	-	-	13	16	-	-	3	5	-	1
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	33	-	-	-	-	4	25	-	1	1	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	Total Europe		**134**	**-**	**1**	**-**	**-**	**32**	**70**	**-**	**1**	**10**	**18**	**1**	**1**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region) *(cont'd)*	South East Asia														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	76	-	-	-	-	14	30	-	1	3	28	-	-
		b. Culture negative	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		c. Culture not done/unk.	23	-	-	-	-	1	21	-	-	-	1	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	35	-	-	-	-	4	10	2	-	3	16	-	-
		b. Culture negative	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	51	-	-	-	-	3	45	-	-	1	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	Total South East Asia		**197**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**110**	**2**	**1**	**7**	**55**	**-**	**-**
	Western Pacific														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	200	3	-	-	-	18	80	4	2	18	74	1	-
		b. Culture negative	13	-	-	-	-	-	10	-	-	1	2	-	-
		c. Culture not done/unk.	48	-	-	-	-	1	43	2	-	-	2	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	124	-	-	1	-	12	31	6	2	28	44	-	-
		b. Culture negative	28	-	-	-	-	2	-	4	-	10	12	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	134	-	-	-	-	8	105	1	-	4	16	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	22	-	-	-	-	2	1	-	-	8	11	-	-
	Total Western Pacific		**569**	**3**	**-**	**1**	**-**	**43**	**270**	**17**	**4**	**69**	**161**	**1**	**-**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region) *(cont'd)*	Unknown Birthplace														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	22	-	-	-	-	1	6	-	-	1	14	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	14	-	-	-	-	1	3	1	-	3	6	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	15	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
	Total Unknown Birthplace		**62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**27**	**1**	**-**	**5**	**27**	**-**	**-**
	Foreign-born														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	466	3	-	-	-	94	186	9	4	31	138	1	-
		b. Culture negative	35	-	-	-	-	2	28	-	-	1	4	-	-
		c. Culture not done/unk.	110	-	-	-	-	2	103	2	-	-	3	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	265	-	1	2	1	47	78	10	3	42	80	-	1
		b. Culture negative	38	-	-	1	-	3	-	5	-	10	18	1	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done unk.	a. Culture positive	314	-	-	-	-	32	247	3	1	7	24	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	41	-	-	-	-	5	2	-	-	13	21	-	-
	Total Foreign-born		**1271**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Unknown Birthplace	1. Microscopy positive	a. Culture positive	9	-	-	-	-	1	2	-	-	-	6	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	6	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Total		**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**5**	**-**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**
TOTAL	1. Microscopy positive	a. Culture positive	759	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
		b. Culture negative	52	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
		c. Culture not done/unk.	142	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	415	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
		b. Culture negative	87	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
		c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	414	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	77	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
	Total		**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Foreign-born (WHO Region) *(cont'd)*	Unknown Birthplace														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	22	-	-	-	-	1	6	-	-	1	14	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	14	-	-	-	-	1	3	1	-	3	6	-	-
		b. Culture negative	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	15	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
	Total Unknown Birthplace		**62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**27**	**1**	**-**	**5**	**27**	**-**	**-**
	Foreign-born														
	1. Microscopy positive	a. Culture positive	466	3	-	-	-	94	186	9	4	31	138	1	-
		b. Culture negative	35	-	-	-	-	2	28	-	-	1	4	-	-
		c. Culture not done/unk.	110	-	-	-	-	2	103	2	-	-	3	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	265	-	1	2	1	47	78	10	3	42	80	-	1
		b. Culture negative	38	-	-	1	-	3	-	5	-	10	18	1	-
		c. Culture not done/unk.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	314	-	-	-	-	32	247	3	1	7	24	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	41	-	-	-	-	5	2	-	-	13	21	-	-
	Total Foreign-born		**1271**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**

...cont'd

Table 16 *Cont'd*

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by birthplace and bacillary status – Canada and provinces/territories: 1997

Birthplace	Bacillary Status		CANADA	Province/Territory											
				NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Unknown Birthplace	1. Microscopy positive	a. Culture positive	9	-	-	-	-	1	2	-	-	-	6	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	6	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-
		b. Culture negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Total		**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**5**	**-**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**
TOTAL	1. Microscopy positive	a. Culture positive	759	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
		b. Culture negative	52	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
		c. Culture not done/unk.	142	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
	2. Microscopy negative	a. Culture positive	415	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
		b. Culture negative	87	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
		c. Culture not done/unk.	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopy not done/ unk.	a. Culture positive	414	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture not done/unk.	77	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
	Total		**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Table 17

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by method of detection – Canada and provinces/territories: 1997

Method of Detection	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Immigration	70	-	-	-	-	-	32	-	-	10	28	-	-
Symptoms/Incidental Findings	1560	15	5	6	7	282	626	81	68	137	313	2	18
Post-Mortem	27	-	-	-	-	7	6	2	-	-	12	-	-
Contact Investigation	105	-	-	1	-	14	17	11	25	6	18	-	13
Screening	129	-	-	-	-	30	46	1	28	7	17	-	-
Other	61	-	-	-	-	24	24	1	-	-	12	-	-
Unknown	23	-	-	-	-	3	10	-	-	6	4	-	-
TOTAL	**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Table 18

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by method of detection and birthplace – Canada: 1997

Method of Detection	TOTAL	Birthplace					
		Canadian-born				Foreign-born	Unknown birthplace
		Status Indian	Non-Status Indian/Metis	Inuit	Non-aboriginal		
Immigration	70	-	-	-	-	70	-
Symptoms/Incidental Findings	1560	132	40	13	321	1038	16
Post-Mortem	27	2	-	-	8	14	3
Contact Investigation	105	42	9	6	25	23	-
Screening	129	32	2	-	24	70	1
Other	61	-	1	-	21	39	-
Unknown	23	4	-	-	1	17	1
TOTAL	**1975**	**212**	**52**	**19**	**400**	**1271**	**21**

Table 19

Reported new active and relapsed foreign-born tuberculosis cases by birthplace and year of arrival in Canada: 1997

Birthplace (WHO Region)	TOTAL	Year of Arrival									
		≤ 1962	1963-1972	1973-1982	1983-1992	1993	1994	1995	1996	1997	Unk.
Africa	92	-	2	5	32	3	6	7	15	19	3
Americas	103	4	5	13	35	10	4	5	5	15	7
East Mediterranean	114	1	6	5	40	6	14	8	20	13	1
Europe	134	45	20	16	10	3	2	7	4	8	16
South East Asia	197	3	14	21	61	17	9	14	24	25	9
Western Pacific	569	7	22	93	213	27	58	47	44	35	23
Unknown	62	6	4	2	5	1	1	1	6	2	34
TOTAL	**1271**	**66**	**73**	**155**	**396**	**67**	**94**	**89**	**118**	**117**	**93**

Table 20

Reported new active and relapsed foreign-born tuberculosis cases by immigration status – Canada and provinces/territories: 1997

Immigration Status	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Landed immigrant or Canadian citizen	330	1	-	1	-	-	-	28	-	93	204	2	1
Refugee claimant	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-
Non-resident (visitor, student, illegal alien)	36	1	-	1	-	-	-	1	-	6	27	-	-
Other	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unknown	897	-	1	-	1	187	644	-	8	4	52	-	-
TOTAL	**1271**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**

Table 17

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by method of detection – Canada and provinces/territories: 1997

Method of Detection	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Immigration	70	-	-	-	-	-	32	-	-	10	28	-	-
Symptoms/Incidental Findings	1560	15	5	6	7	282	626	81	68	137	313	2	18
Post-Mortem	27	-	-	-	-	7	6	2	-	-	12	-	-
Contact Investigation	105	-	-	1	-	14	17	11	25	6	18	-	13
Screening	129	-	-	-	-	30	46	1	28	7	17	-	-
Other	61	-	-	-	-	24	24	1	-	-	12	-	-
Unknown	23	-	-	-	-	3	10	-	-	6	4	-	-
TOTAL	**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Table 18

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by method of detection and birthplace – Canada: 1997

Method of Detection	TOTAL	Birthplace					
		Canadian-born				Foreign-born	Unknown birthplace
		Status Indian	Non-Status Indian/Metis	Inuit	Non-aboriginal		
Immigration	70	-	-	-	-	70	-
Symptoms/Incidental Findings	1560	132	40	13	321	1038	16
Post-Mortem	27	2	-	-	8	14	3
Contact Investigation	105	42	9	6	25	23	-
Screening	129	32	2	-	24	70	1
Other	61	-	1	-	21	39	-
Unknown	23	4	-	-	1	17	1
TOTAL	**1975**	**212**	**52**	**19**	**400**	**1271**	**21**

Table 19

Reported new active and relapsed foreign-born tuberculosis cases by birthplace and year of arrival in Canada: 1997

Birthplace (WHO Region)	TOTAL	Year of Arrival									
		≤ 1962	1963-1972	1973-1982	1983-1992	1993	1994	1995	1996	1997	Unk.
Africa	92	-	2	5	32	3	6	7	15	19	3
Americas	103	4	5	13	35	10	4	5	5	15	7
East Mediterranean	114	1	6	5	40	6	14	8	20	13	1
Europe	134	45	20	16	10	3	2	7	4	8	16
South East Asia	197	3	14	21	61	17	9	14	24	25	9
Western Pacific	569	7	22	93	213	27	58	47	44	35	23
Unknown	62	6	4	2	5	1	1	1	6	2	34
TOTAL	**1271**	**66**	**73**	**155**	**396**	**67**	**94**	**89**	**118**	**117**	**93**

Table 20

Reported new active and relapsed foreign-born tuberculosis cases by immigration status – Canada and provinces/territories: 1997

Immigration Status	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Landed immigrant or Canadian citizen	330	1	-	1	-	-	-	28	-	93	204	2	1
Refugee claimant	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-
Non-resident (visitor, student, illegal alien)	36	1	-	1	-	-	-	1	-	6	27	-	-
Other	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unknown	897	-	1	-	1	187	644	-	8	4	52	-	-
TOTAL	**1271**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**

Table 21

Reported relapsed tuberculosis cases by length of inactive interval – Canada and provinces/territories: 1997

Interval	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 2 years	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
2-5 years	24	-	-	-	-	2	-	4	6	2	8	-	2
6-9 years	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-
10-19 years	10	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	-	-
20+ years	67	2	1	1	1	20	-	6	3	11	18	-	4
Unknown	88	-	-	1	-	8	70	-	-	-	9	-	-
TOTAL	**197**	**2**	**1**	**2**	**1**	**34**	**70**	**10**	**11**	**16**	**43**	**-**	**7**

Table 22

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and number of diagnoses by main diagnostic site – Canada: 1997

	Main Diagnostic Site							
	TOTAL	Primary	Miliary/ Disseminated	Respiratory (pulm/ other resp)	Meninges and CNS	Peripheral Lymph Node	Other Sites	Unknown
Total Number of Cases	**1975**	**130**	**73**	**1230**	**25**	**266**	**247**	**4**
Primary	**130**	130	-	-	-	-	-	-
Miliary/Disseminated	**73**	-	73	-	-	-	-	-
Pulmonary	**1136**	2	11	1123	-	-	-	-
Pulmonary (with silicosis)	**-**	-	-	-	-	-	-	-
Pleurisy (tuberculosis)	**117**	-	1	116	-	-	-	-
Other respiratory	**24**	1	1	22	-	-	-	-
Meninges and CNS	**27**	-	2	-	25	-	-	-
Peripheral lymph node	**292**	-	3	23	-	266	-	-
Abdominal	**38**	-	2	14	-	-	22	-
Bones and joints	**74**	-	6	8	1	3	56	-
Genitourinary	**75**	-	7	10	-	-	58	-
Other non-respiratory	**136**	-	2	17	-	2	115	-
Unknown	**4**	-	-	-	-	-	-	4
Total Diagnoses	**2123**							

Table 21

Reported relapsed tuberculosis cases by length of inactive interval – Canada and provinces/territories: 1997

Interval	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 2 years	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
2-5 years	24	-	-	-	-	2	-	4	6	2	8	-	2
6-9 years	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-
10-19 years	10	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	-	-
20+ years	67	2	1	1	1	20	-	6	3	11	18	-	4
Unknown	88	-	-	1	-	8	70	-	-	-	9	-	-
TOTAL	**197**	**2**	**1**	**2**	**1**	**34**	**70**	**10**	**11**	**16**	**43**	**-**	**7**

Table 22

Reported new active and relapsed tuberculosis cases and number of diagnoses by main diagnostic site – Canada: 1997

	Main Diagnostic Site							
	TOTAL	Primary	Miliary/ Disseminated	Respiratory (pulm/ other resp)	Meninges and CNS	Peripheral Lymph Node	Other Sites	Unknown
Total Number of Cases	**1975**	**130**	**73**	**1230**	**25**	**266**	**247**	**4**
Primary	**130**	130	-	-	-	-	-	-
Miliary/Disseminated	**73**	-	73	-	-	-	-	-
Pulmonary	**1136**	2	11	1123	-	-	-	-
Pulmonary (with silicosis)	**-**	-	-	-	-	-	-	-
Pleurisy (tuberculosis)	**117**	-	1	116	-	-	-	-
Other respiratory	**24**	1	1	22	-	-	-	-
Meninges and CNS	**27**	-	2	-	25	-	-	-
Peripheral lymph node	**292**	-	3	23	-	266	-	-
Abdominal	**38**	-	2	14	-	-	22	-
Bones and joints	**74**	-	6	8	1	3	56	-
Genitourinary	**75**	-	7	10	-	-	58	-
Other non-respiratory	**136**	-	2	17	-	2	115	-
Unknown	**4**	-	-	-	-	-	-	4
Total Diagnoses	**2123**							

Table 23

Reported new active and relapsed tuberculosis cases reported in 1997 who died in 1997, by cause of death – Canada and provinces/territories: 1997

Cause of Death	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
TB was underlying cause of death	27	1	-	-	-	9	9	2	1	1	4	-	-
TB contributed to death but was not the underlying cause	42	-	-	-	-	13	12	-	3	7	6	-	1
TB did not contribute to death	47	1	1	-	-	10	15	1	1	5	13	-	-
Cause not reported	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**120**	**2**	**1**	**-**	**-**	**33**	**39**	**3**	**5**	**13**	**23**	**-**	**1**

Table 24

Reported new active and relapsed tuberculosis cases reported in 1997 who died in 1997, by age group and sex – Canada: 1997

Sex	TOTAL	Age Group									
		< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Male	74	-	-	-	1	8	2	4	3	19	37
Female	46	-	-	-	1	2	3	7	7	7	19
TOTAL	**120**	**-**	**-**	**-**	**2**	**10**	**5**	**11**	**10**	**26**	**56**

NB: These numbers are based on number of known deaths at time of reporting.

Table 25

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by HIV status – Canada and provinces/territories: 1997

HIV Status	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Positive	32	-	-	-	-	-	12	2	1	2	15	-	-
Negative	80	1	-	-	2	-	-	38	-	13	13	-	13
Unknown	1863	14	5	7	5	360	749	56	120	151	376	2	18
TOTAL	**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

APPENDIX 1A

Population estimates by sex and age group – Canada and provinces/territories: 1997

TOTAL	CANADA	NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 1	356,261	5,550	1,609	10,118	8,073	82,450	135,780	14,882	13,138	37,516	45,265	460	1,420
1 – 4	1,567,274	23,946	7,109	45,038	35,468	362,844	606,761	64,782	57,636	160,243	195,382	1,896	6,169
5 – 14	4,065,267	75,835	20,175	125,052	99,521	924,293	1,528,721	165,590	159,480	430,837	516,675	5,132	13,954
15 – 24	4,056,924	87,451	19,696	127,098	107,516	981,457	1,478,534	157,911	150,534	407,199	524,306	4,261	10,961
25 – 34	4,667,557	85,146	19,611	140,965	114,917	1,097,645	1,799,315	166,837	138,674	457,759	628,077	5,672	12,939
35 – 44	5,116,961	92,525	21,364	156,089	126,048	1,279,088	1,896,015	180,430	158,263	509,366	680,658	6,602	10,513
45 – 54	3,933,599	76,925	17,813	125,659	101,973	1,018,497	1,452,119	139,217	113,889	344,084	532,168	4,645	6,610
55 – 64	2,584,878	45,995	11,760	82,613	64,562	670,745	977,551	92,444	82,332	212,040	339,651	2,106	3,079
65 – 74	2,110,648	34,485	9,315	65,553	52,446	532,290	813,336	81,730	76,286	161,793	280,969	1,025	1,420
75 +	1,549,047	26,286	8,383	56,349	43,336	358,864	574,411	72,665	71,972	117,369	218,249	450	713
TOTAL	30,008,416	554,144	136,835	934,534	753,860	7,308,175	11,262,543	1,136,488	1,022,204	2,838,206	3,961,400	32,249	67,778
Male													
< 1	183,619	2,786	866	5,272	4,266	42,584	69,607	7,659	6,758	19,518	23,304	254	745
1 – 4	803,182	12,384	3,681	23,033	18,280	185,055	311,245	33,146	29,441	82,364	100,399	962	3,192
5 – 14	2,084,480	38,809	10,244	64,157	50,981	472,681	784,741	84,951	81,585	221,124	265,363	2,689	7,155
15 – 24	2,075,994	44,874	10,049	64,377	55,335	503,074	754,762	81,127	77,491	209,167	267,831	2,252	5,655
25 – 34	2,359,559	42,213	9,821	70,326	58,386	561,401	901,340	85,201	69,964	233,262	318,151	2,831	6,663
35 – 44	2,561,930	45,795	10,609	77,286	62,976	644,213	941,005	90,955	80,156	259,384	340,592	3,340	5,619
45 – 54	1,963,212	38,692	8,893	62,638	51,327	505,879	719,207	69,835	57,682	175,328	267,543	2,530	3,658
55 – 64	1,274,285	23,235	5,827	40,853	31,935	326,346	480,150	45,786	40,734	106,808	169,759	1,175	1,657
65 – 74	975,160	16,547	4,382	29,884	24,109	238,649	375,383	37,532	36,182	77,497	133,664	575	756
75 +	578,135	10,504	3,081	20,678	16,325	125,794	214,403	27,392	28,496	45,570	85,331	193	368
TOTAL	14,859,536	275,839	67,453	458,504	373,940	3,605,676	5,551,843	563,584	508,489	1,630,022	1,971,937	16,801	35,468
Female													
< 1	172,642	2,764	743	4,846	3,807	39,866	66,173	7,223	6,380	17,998	21,961	206	675
1 – 4	764,092	11,562	3,428	22,005	17,188	177,789	295,516	31,636	28,195	77,879	94,983	934	2,977
5 – 14	1,980,787	37,026	9,931	60,895	48,540	451,614	743,980	80,639	77,895	209,713	251,312	2,443	6,799
15 – 24	1,980,930	42,577	9,647	62,721	52,181	478,383	723,772	76,784	73,043	198,032	256,475	2,009	5,306
25 – 34	2,307,998	42,933	9,790	70,639	56,531	536,244	897,975	81,636	68,710	224,497	309,926	2,841	6,276
35 – 44	2,555,031	46,730	10,755	78,803	63,072	634,875	955,010	89,475	78,107	249,982	340,066	3,262	4,894
45 – 54	1,970,387	38,233	8,920	63,021	50,646	512,618	732,912	69,382	56,207	168,756	264,625	2,115	2,952
55 – 64	1,310,593	22,760	5,933	41,760	32,607	344,399	497,401	46,658	41,598	105,232	169,892	931	1,422
65 – 74	1,135,488	17,938	4,933	35,669	28,337	293,641	437,953	44,198	40,104	84,296	147,305	450	664
75 +	970,912	15,782	5,302	35,671	27,011	233,070	360,008	45,273	43,476	71,799	132,918	257	345
TOTAL	15,148,860	278,305	69,382	476,030	379,920	3,702,499	5,710,700	572,904	513,715	1,408,184	1,989,463	15,448	32,310

Source: Statistics Canada

Table 23

Reported new active and relapsed tuberculosis cases reported in 1997 who died in 1997, by cause of death – Canada and provinces/territories: 1997

Cause of Death	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
TB was underlying cause of death	27	1	-	-	-	9	9	2	1	1	4	-	-
TB contributed to death but was not the underlying cause	42	-	-	-	-	13	12	-	3	7	6	-	1
TB did not contribute to death	47	1	1	-	-	10	15	1	1	5	13	-	-
Cause not reported	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**120**	**2**	**1**	**-**	**-**	**33**	**39**	**3**	**5**	**13**	**23**	**-**	**1**

Table 24

Reported new active and relapsed tuberculosis cases reported in 1997 who died in 1997, by age group and sex – Canada: 1997

Sex	TOTAL	Age Group									
		< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Male	74	-	-	-	1	8	2	4	3	19	37
Female	46	-	-	-	1	2	3	7	7	7	19
TOTAL	**120**	**-**	**-**	**-**	**2**	**10**	**5**	**11**	**10**	**26**	**56**

NB: These numbers are based on number of known deaths at time of reporting.

Table 25

Reported new active and relapsed tuberculosis cases by HIV status – Canada and provinces/territories: 1997

HIV Status	CANADA	Province/Territory											
		NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
Positive	32	-	-	-	-	-	12	2	1	2	15	-	-
Negative	80	1	-	-	2	-	-	38	-	13	13	-	13
Unknown	1863	14	5	7	5	360	749	56	120	151	376	2	18
TOTAL	**1975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

APPENDIX 1A

Population estimates by sex and age group – Canada and provinces/territories: 1997

TOTAL														
	CANADA	NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
< 1	356,261	5,550	1,609	10,118	8,073	82,450	135,780	14,882	13,138	37,516	45,265	460	1,420
1 – 4	1,567,274	23,946	7,109	45,018	35,468	362,844	606,761	64,782	57,646	160,241	195,382	1,896	6,169
5 – 14	4,065,267	75,835	20,175	125,052	99,521	924,295	1,528,721	165,590	159,480	430,837	516,675	5,132	13,954
15 – 24	4,056,924	87,451	19,696	127,098	107,516	981,457	1,478,534	157,911	150,514	407,190	524,306	4,261	10,961
25 – 34	4,667,557	85,146	19,611	140,965	114,917	1,097,645	1,709,115	166,837	148,674	457,759	628,077	5,672	12,939
35 – 44	5,116,961	92,525	21,464	156,089	126,048	1,279,088	1,896,015	180,410	158,261	509,366	680,658	6,602	10,513
45 – 54	3,913,599	76,925	17,811	125,659	101,973	1,018,497	1,452,119	139,217	113,889	344,084	532,168	4,645	6,610
55 – 64	2,584,878	45,995	11,760	82,611	64,562	670,745	977,551	92,444	82,112	212,040	319,651	2,106	3,079
65 – 74	2,110,648	34,485	9,315	65,553	52,446	532,290	813,316	81,730	76,286	161,791	280,969	1,025	1,420
75 +	1,549,047	26,286	8,383	56,349	41,316	358,864	574,411	72,665	71,972	117,369	218,249	450	713
TOTAL	30,008,416	554,144	136,835	934,534	753,860	7,308,175	11,262,543	1,116,488	1,022,204	2,838,206	3,961,400	32,249	67,778
Male													
< 1	183,619	2,786	866	5,272	4,266	42,584	69,607	7,659	6,758	19,518	23,304	254	745
1 – 4	803,182	12,384	3,681	23,031	18,280	185,055	311,245	33,146	29,441	82,364	100,399	962	3,192
5 – 14	2,084,480	38,809	10,244	64,157	50,981	472,681	784,741	84,951	81,585	221,124	265,363	2,689	7,155
15 – 24	2,075,994	44,874	10,049	64,377	55,115	503,074	754,762	81,127	77,491	209,167	267,831	2,252	5,655
25 – 34	2,359,559	42,213	9,821	70,326	58,386	561,401	901,340	85,201	69,964	233,262	318,151	2,831	6,063
35 – 44	2,561,910	45,795	10,609	77,286	62,976	644,213	941,005	90,955	80,156	259,384	340,592	3,340	5,619
45 – 54	1,963,212	38,692	8,893	62,638	51,327	505,879	719,207	69,835	57,682	175,328	267,543	2,530	3,658
55 – 64	1,274,285	23,215	5,827	40,853	31,955	326,146	480,150	45,786	40,734	106,808	169,759	1,175	1,657
65 – 74	975,160	16,547	4,382	29,884	24,109	238,649	375,383	37,512	36,182	77,497	133,664	575	756
75 +	578,135	10,504	3,081	20,678	16,325	125,794	214,403	27,192	28,496	45,570	85,331	193	368
TOTAL	14,859,536	275,839	67,453	458,504	373,940	3,605,676	5,551,843	563,584	508,489	1,430,022	1,971,937	16,801	35,468
Female													
< 1	172,642	2,764	743	4,846	3,807	39,866	66,173	7,223	6,380	17,998	21,961	206	675
1 – 4	764,092	11,562	3,428	22,005	17,188	177,789	295,516	31,636	28,195	77,879	94,983	934	2,977
5 – 14	1,980,787	37,026	9,931	60,895	48,540	451,614	743,980	80,639	77,895	209,713	251,312	2,443	6,799
15 – 24	1,980,930	42,577	9,647	62,721	52,181	478,381	721,772	76,784	73,043	198,012	256,475	2,009	5,306
25 – 34	2,307,998	42,933	9,790	70,639	56,531	536,244	807,975	81,636	68,710	224,497	309,926	2,841	6,276
35 – 44	2,555,051	46,730	10,855	78,803	63,072	634,875	955,010	89,475	78,107	249,982	340,066	3,262	4,894
45 – 54	1,950,387	38,233	8,920	63,021	50,646	512,618	732,912	69,382	56,207	168,756	264,625	2,115	2,952
55 – 64	1,310,593	22,780	5,933	41,760	32,607	344,599	497,401	46,658	41,598	105,232	169,892	931	1,422
65 – 74	1,135,488	17,938	4,933	35,669	28,337	293,641	437,933	44,198	40,104	84,296	147,305	450	664
75 +	970,912	15,782	5,402	35,671	27,011	233,070	360,008	45,271	43,476	71,799	132,918	257	345
TOTAL	15,148,860	278,305	69,182	476,010	379,920	3,702,499	5,710,700	572,904	513,715	1,408,184	1,989,463	15,448	32,310

Source: Statistics Canada

APPENDIX 1B

Population estimates by Canadian-born origin and foreign-born birthplace – Canada and provinces/territories: 1997

TOTAL[1]	CANADA	NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
	30,008,416	554,144	136,835	934,534	753,860	7,308,175	11,262,543	1,136,488	1,022,204	2,838,206	3,961,400	32,249	67,778
Canadian-born													
Aboriginal				Atlantic Region									
Status Indian	522,400			19,600		54,800	107,000	79,000	72,400	74,300	97,100	5,600	12,500
NSI/Metis	632,800			12,100		105,000	187,600	57,200	42,800	103,400	98,400	1,700	4,600
Inuit	58,300			8,600		10,000	6,100	900	600	1,400	2,300	200	26,100
Total Aboriginal	1,211,400			60,500		169,800	300,800	137,200	115,600	181,100	197,700	7,500	43,400
Non-aboriginal	23,476,747			2,232,386		6,408,919	8,067,864	859,410	851,568	2,231,442	2,782,478	21,174	21,200
Total	24,690,147			2,292,886		6,578,719	8,368,664	996,610	967,168	2,412,542	2,980,178	28,874	64,500
		544,142	132,064	888,899	727,781								
Foreign-born (WHO Region)													
Africa	166,966	344	153	1,465	811	23,465	90,222	4,335	1,762	14,285	30,895	105	103
Americas	875,651	1,724	794	7,596	4,126	121,592	474,871	22,886	9,149	69,886	161,787	552	540
East Mediterranean	134,448	697	107	2,941	1,668	47,144	180,566	8,669	1,538	26,592	61,908	209	207
Europe	2,466,176	4,367	2,183	20,874	11,982	311,226	1,347,571	65,364	23,216	198,089	454,209	1,578	1,518
South East Asia	301,357	695	126	4,117	1,778	49,848	196,111	9,475	3,757	28,881	66,716	229	221
Western Pacific	1,112,937	2,173	1,007	9,635	5,490	154,134	603,949	29,123	11,607	88,873	205,577	702	686
Other Unknown	711	1	1	6	1	97	388	19	7	57	111	-	-
Total	**5,318,269**	**10,002**	**4,771**	**45,635**	**26,079**	**729,456**	**2,893,879**	**139,872**	**55,036**	**425,664**	**981,222**	**3,375**	**3,278**

Sources: Canada – Demography Division, Statistics Canada
Aboriginal – Projected – Indian and Northern Affairs Canada
Non-aboriginal – Calculated – based on Population Estimates from Demography Division, Statistics Canada
Foreign – Projected – Demography Division, Statistics Canada (based on WHO Region)

APPENDIX 1B

Population estimates by Canadian-born origin and foreign-born birthplace – Canada and provinces/territories: 1997

TOTAL[1]	CANADA	NFLD	PEI	NS	NB	QUE	ONT	MAN	SASK	ALTA	BC	YUK	NWT
	30,008,416	554,144	136,835	934,534	733,860	7,308,175	11,262,543	1,136,488	1,022,204	2,838,306	3,961,400	32,249	67,778
Canadian-born													
Aboriginal				Atlantic Region									
Status Indian	522,400		19,600			54,800	107,000	79,000	72,300	74,300	97,100	5 600	12,500
NSI/Metis	632,800		32,100			105,000	187,600	57,200	42,800	103,400	98,300	1,700	4,600
Inuit	58,300		8,800			10,000	6,100	900	600	3,300	2,300	200	26,100
Total Aboriginal	1,213,400		60,500			169,800	300,800	137,200	115,600	181,100	197,700	7,500	43,300
Non-aboriginal	23,476,747		2,232,386			6,408,919	8,067,864	859,416	851,568	2,231,442	2,782,478	21,374	21,200
Total	24,690,147		2,292,886			6,578,719	8,368,664	996,616	967,168	2,412,542	2,980,178	28,874	64,500
		544,142	132,044	888,699	727,781								
Foreign-born (WHO Region)													
Africa	166,966	344	153	1,465	831	23,465	90,222	4,335	1,762	13,285	30,895	105	103
Americas	875,653	1,724	794	7,596	4,326	121,542	474,871	22,886	9,149	69,886	161,787	552	540
East Mediterranean	334,448	697	307	2,943	1,668	47,144	180,566	8,669	3,538	26,592	61,908	209	207
Europe	2,466,176	4,367	2,183	20,874	11,982	333,226	1,347,571	65,364	25,216	198,089	454,209	1,578	1,518
South East Asia	361,357	695	326	3,117	1,778	49,848	196,311	9,475	3,757	28,883	66,716	229	223
Western Pacific	1,112,957	2,173	1,007	9,635	5,490	134,134	603,949	29,123	11,607	88,873	205,577	702	686
Other/Unknown	711	1	1	6	3	97	388	19	7	57	131	-	-
Total	5,318,269	10,002	4,771	45,635	26,079	729,456	2,893,879	139,872	55,036	425,664	981,222	3,375	3,278

Source(s): Canada: Demography Division, Statistics Canada
Aboriginal: Projected – Indian and Northern Affairs Canada
Non-aboriginal: Calculated – based on Population Estimates from Demography Division, Statistics Canada
Foreign: Projected – Demography Division, Statistics Canada (based on WHO Region)

APPENDIX 2

Active Tuberculosis Report Form – New and Relapsed Cases

Serial No. _____

For Internal Use Only
Date received at LCDC: Year / Month / Day — LCDC Number
Confidential when completed

Province/Territory/Patient ID

1. Reporting province/territory
2. Register case number
3. Unique identifier *(may be name or patient identifier)*
4. Date of birth: Year / Month / Day
5. Sex: 1 M 2 F

Name of Patient

6. Surname — Given Name — Birth Surname

Usual Residence

7. Number — Street — City/Town/Village — County and Health Unit — Postal Code — Geo Codes: PR / CD / PR / HUID

Origin

8.
1 Status Indian (registered)
Lives on reserve most of the time: 1 Yes 2 No 8 Not Applicable 9 Unknown
2 Métis
3 Inuit
4 Other aboriginal (specify) _____
5 Canadian Born non-Aboriginal
If under age 20, country of birth of mother _____ country of birth of father _____
9 Foreign-Born
(a) Country of Birth _____
(b) Year of Arrival in Canada _____
(c) Immigration status: (current status)
1 Landed immigrant/ now Canadian citizen
2 Refugee claimant
3 Non-resident (migrant worker, visitor, student, illegal alien)
8 Other (specify) _____
9 Unknown

Diagnosis

9. Date of diagnosis: Year / Month / Day

10. Diagnosis (ICD9)
List Diagnoses *(check all that apply)*

- Pulmonary: 011.0; 011.1; 011.2; 011.3; 011.4; 011.5; 011.6; 011.7; 011.8; 011.9
  - With Silicosis: 502
- Miliary/Disseminated: 018.0; 018.8; 018.9
- Primary: 010.0; 010.1; 010.8; 010.9
- Pleurisy (tuberculosis): 012.0
- Other respiratory: 012.1; 012.2; 012.3; 012.8; 137.0
- Central nervous system: 013.0; 013.1; 013.8; 013.9; 137.1
- Abdominal: 014
- Bones and joints: 015.0; 015.1; 015.2; 015.7; 015.8; 015.9; 137.3
- Genitourinary: 016.0; 016.1; 016.2; 016.3; 016.4; 016.8; 016.9; 137.2
- Peripheral lymph nodes (non-respiratory): 017.2
- Other non-respiratory *(specify)*: 017.0; 017.1; 017.3; 017.4; 017.5; 017.6; 017.7; 017.8; 137.4

Bacillary Status

11. *Check all that apply:*

	Microscopy							Culture						
	Sputum	Bronchial Wash	GI Wash	Node biopsy	Urine	CSF	Other	Sputum	Bronchial Wash	GI Wash	Node biopsy	Urine	CSF	Other
Negative														
Positive														
Not Done/ Unknown														

12. Case Criteria
1 Positive culture
2 No positive culture, clinical diagnosis

13. Antibiotic resistance to initial positive culture
1 Yes – *(check all that apply)*: 1 INH 2 SM 3 EMB 4 RMP 5 PZA 8 Other *(specify)* _____
2 No 9 Unknown

14. Date Treatment Started: Year / Month / Day

15. Initial Drugs Prescribed *(check all boxes that apply)*
1 INH 2 SM 3 EMB 4 RMP 5 PZA 8 Other *(specify)* _____ 7 No drugs prescribed 9 Unknown

16. Case Finding
1 Symptoms compatible with site of diagnosis
2 Incidental findings
3 Post-mortem
4 Contact investigation
5 Post-landing surveillance
6 Pre-landing immigration evaluation (in Canada)
7 Occupational screening program
8 Other screening
9 Other *(specify)* _____
10 Unknown

17. First episode of TB
1 Yes 2 No
If no: (a) Year of previous diagnosis _____
(b) Previous diagnosis occurred in:
1 Canada 2 Other Country: _____
(c) Previous treatment with *(check all antibiotics used)*:
1 INH 2 SM 3 EMB 4 RMP 5 PZA 8 Other *(specify)* _____

18. Patient died before completion of therapy
1 Yes
1 TB was the cause of death
2 TB contributed to death but was not the underlying cause
3 TB did not contribute to death but was an incidental finding
Date of death: Year / Month / Day
2 No 3 Not applicable 9 Unknown

19. HIV status
1 Positive
2 Negative
9 Unknown

HCSC 4388E (01-97) — DISPONIBLE EN FRANÇAIS

APPENDIX 3
TECHNICAL NOTES

METHODOLOGY AND DATA QUALITY REPORT

Data Collection

The Canadian Tuberculosis Reporting System (CTBRS) maintained by Tuberculosis Prevention and Control at the Centre for Infectious Disease Prevention and Control, Health Canada, is derived from records of provincial/territorial tuberculosis registries, upon which the tuberculosis control system in each jurisdiction is based. The reporting system is designed to capture information on every new active or relapsed case of tuberculosis occurring in Canadian residents and visitors. All provinces and territories have legislation requiring physicians, laboratories and other health officials to report cases of tuberculosis to an office of tuberculosis control. In most provinces and territories, information on cases is collected using a standard notification form (see Appendix 2), and reported to Tuberculosis Prevention and Control annually.

Information is included on age, sex, residence, aboriginal status, country of birth, diagnosis, and bacteriological status. The Canadian Tuberculosis Control Committee is responsible for determining the content of the database. Recent revisions have resulted in the inclusion of more detail on high risk populations, methods of detecting cases, antibiotic resistance, treatment date, drugs prescribed, previous TB history and, for deceased persons, information on cause and date of death.

Case reports are completed in the provincial/territorial registries, where codes are entered for diagnosis (using the ICD-9), residence, birthplace and other items. Some provinces have computerized their data, and four provinces currently send data in electronic form.

Data Processing

Case notifications received at Tuberculosis Prevention and Control are logged, checked for completeness and reasonableness, and filed. Data are captured in a standard format on computer, with validity and correlation edits being an integral part of the data entry program. Lists of cases together with any queries arising from edit failures are returned to provincial/territorial directors for review, correction of errors and ascertainment of completeness of case lists for the year.

Calculation of Rates

The rates used in this report have been calculated using population figures provided by the Demography Division of Statistics Canada and Indian and Northern Affairs Canada (see Appendices 1A and 1B). The population estimates have been adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. For more information, see "Population Figures" in the Definitions of Terms section and reference[1]. Because of adjustment of the

population estimates and updates to the reported number of cases in some provinces, case counts and rates appearing in this report may differ slightly from those in previous reports.

Data Quality

Several aspects of data quality affect the usefulness of the data: completeness of reporting (or coverage), completeness of item response, accuracy or validity of responses and timeliness.

Coverage of the tuberculosis reporting system has not been explicitly reviewed at the national level, although there is some evidence that coverage can vary according to the vigilance of the provincial/territorial offices of tuberculosis control in their case-finding efforts.

One form of coverage error may occur if cases that do not meet the criteria for inclusion with regard to case definition or resident status in Canada are included in the national system. Also, tabulations in annual reports may be slightly incomplete because case notifications received after a cut-off date are not included. In this report, the data for 1996 differ slightly from those presented in previous reports. The changes result from updates to the reported case files.

Of the cases reported to Tuberculosis Prevention and Control, reporting of most core data items is virtually complete. Reporting is less complete for some of the data items introduced in 1997.

Some limitations should be kept in mind when using and interpreting the data. For the variable referring to "origin", the definitions of "Registered Indian", "Unregistered Indian or Métis", "Inuit" and "Other" as reported on the case notification forms may not strictly correspond to the definitions used by the Census or by Indian and Northern Affairs Canada in estimating corresponding populations. Also the terms "new active" and "relapsed" may be interpreted differently in different provinces/territories; the definitions of these terms were revised effective January 1, 1997 (see Definitions of Terms).

In addition, while data in this report are generally tabulated according to year of diagnosis, since 1990, Ontario data have been tabulated according to episode date (which is the closest approximation of date of onset of illness). Since 1997, Quebec dates have been tabulated according to report date.

Other Sources of Information

In addition to these annual data on new active and relapsed cases of tuberculosis in Canada, the numbers of tuberculosis cases are presented monthly, based on date of diagnosis, by province, age group and sex as part of the "Notifiable Disease Summary" appearing in the *Canada Communicable Disease Report*.

While the latter series provides useful current information, the consolidated annual data on new and relapsed cases appearing in this report must be considered the more authoritative source of information on tuberculosis in Canada.

DEFINITION OF TERMS

Tuberculosis Registry

The central organization within a province/territory that receives, records and accumulates information on and follows up all reported cases of tuberculosis, and maintains a register of persons with tuberculosis.

Notification

The receipt of a report concerning a new active or relapsed case of tuberculosis meeting the tuberculosis case definition.

Tuberculosis Case Definition

Effective January 1, 1997:

I TB Case Definition in the Canadian Tuberculosis reporting system

a. Cases with *Mycobacterium tuberculosis* complex (i.e. *M. tuberculosis, M. bovis* [excluding BCG strain] or *M. africanum)* demonstrated on culture

OR

b. In the absence of bacteriological proof, cases clinically compatible with active tuberculosis that have, for example:

i chest x-ray changes compatible with active tuberculosis including idiopathic pleurisy with effusion

ii active extrapulmonary tuberculosis (meningeal, bone, kidney, peripheral lymph nodes etc.)

iii pathologic or post-mortem evidence of active tuberculosis

Note: Molecular biological techniques are research tools and are not included in the definition.

II Cases of tuberculosis diagnosed in Canada include all cases: Canadian born, immigrants, refugees, refugee claimants, students, visitors, migrant workers and illegal aliens.

Visitors = those non-Canadians travelling with or without a visa, stopping in Canada en route

III New and Relapsed (Reactivated) Cases of Tuberculosis

New Case: No documented evidence or history of previously active tuberculosis.

Relapsed (Reactivated) Case: Documented evidence or history of previously active tuberculosis which became inactive.

Inactive tuberculosis:

a. Cultures for *Mycobacterium tuberculosis* negative for at least six months

OR

b. In the absence of cultures, chest (or other) x-rays, stable for a minimum of six months.

Diagnostic Classification

The classification used is the *International Classification of Diseases, 9th Edition*. Up to five diagnoses per case are captured and presented as Main Diagnostic Site using the following hierarchy: Primary, Miliary, Respiration (includes Pulmonary Pleurisy and other respiratory), Meninges and CNS, Peripheral Lymph Node and Other Sites. Based on this classification, a case can have more than one diagnosis.

Deaths

This report contains statistics on deaths from the Canadian Tuberculosis Reporting System, which introduced new questions in 1990 concerning deaths of persons registered as cases of active tuberculosis. These statistics are shown in Tables 23 and 24 and are based on the patient's status at time of reporting (for Ontario they are based on "episode date").

Population Figures

In 1993, Statistics Canada introduced a new series of population estimates that include non-permanent residents and adjustments for net census undercoverage. The series for provinces and territories comprises annual population estimates beginning with 1971.

In this report the 1997 overall population estimates for Canada and provinces/territories by sex and age group are based on adjusted 1996 census data.

Population estimates of Canadian-born Aboriginal people are based on Projections of Population with Aboriginal Ancestry, Canada, Provinces/Regions and Territories, 1991-2016 (Statistics Canada), and Population Projections of Registered Indians, 1991-2015 (Indian and Northern Affairs Canada).

Population estimates of Foreign-born people by birthplace are based on 1996 Census data (Statistics Canada).

The 1996 population estimates of total Canadian-born people are calculated by subtracting the foreign-born census (1996) figures from 1996 population estimates (Statistic Canada).

The 1996 population estimates of Canadian-born non-Aboriginal people are calculated by subtracting the total Aboriginal estimates from total Canadian-born estimates.

Population
Persons whose usual place of residence is somewhere in Canada or who are non-permanent residents. In census years this is the enumerated population adjusted for net census undercoverage, while population estimates are used for intercensal years.

Non-permanent residents
The following five groups of persons residing in Canada, referred to globally as "non-permanent residents", were added to the census population universe in 1991: persons claiming refugee status, persons holding a student authorization, persons holding an employment authorization, persons holding a minister's permit and all non-Canadian-born dependants of the aforementioned individuals.

Net census undercoverage
The difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe, while the latter refers to persons either enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe. Undercoverage exceeds overcoverage with few exceptions at all levels of demographic and geographic disaggregation.

More Information

More information on definitions used and coding instructions is available upon request from Tuberculosis Prevention and Control, Population and Public Health Branch at Health Canada. Medical terminology regarding bacteriological aspects, diagnosis, dissemination, treatment, prevention, screening and control of tuberculosis is well documented in *Canadian Tuberculosis Standards, Fourth Edition*, 1996, available from the Canadian Lung Association[2].

References

(1) *Annual Demographic Statistics*. Statistics Canada Catalogue 91-213.
(2) *Canadian Tuberculosis Standards, Fourth Edition*. Canadian Lung Association, Ottawa, 1996.

Santé Canada
Health Canada

LA TUBERCULOSE AU CANADA



1997

Canada

Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à maintenir et à améliorer leur état de santé.
Santé Canada

COMMENT COMMUNIQUER AVEC NOUS

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce rapport ou d'autres rapports, veuillez communiquer avec nous à :

Division de la lutte antituberculeuse
Bureau du VIH/sida, MTS et de la tuberculose
Direction générale de la santé de la population et de la santé publique
Santé Canada
Pièce 0108B, Édifice Brooke Claxton
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0L2

Indice de l'adresse : 0900B-1

Téléphone : **(613) 941-0238**
Télécopieur : **(613) 946-3902**

Ce rapport est aussi accessible sur le site Web du LLCM :

http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc

Les tableaux suivants et les textes d'explication ont été préparés par :

Howard Njoo, MD, MHSc, FRCPC
Directeur
Division de la lutte antituberculeuse

Penny Nault
Gestionnaire, base de données sur la tuberculose
Division de la lutte antituberculeuse

Linda Panaro, MDCM, MHSc, FRCPC
Medical Specialist
Division de la lutte antituberculeuse

REMERCIEMENTS

Les auteurs aimeraient remercier les membres des équipes des Programmes de tuberculose provinciaux/territoriaux pour leur contribution et leur participation au Système canadien de déclaration de la tuberculose.

Les auteurs aimeraient également remercier la Division de la diffusion des documents, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, pour son aide dans la préparation du présent rapport.

Publication autorisée par le ministre de la Santé

© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2000

Cat. H49-108/1997
ISBN 0-662-65226-6

On peut obtenir sur demande la présente publication sur disquette, en gros caractères ou sur bande sonore.

La tuberculose au Canada

1997

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 5

SOMMAIRE EXÉCUTIF 7

FIGURES

Figure 1 Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada : 1924-1997 9

Figure 2 Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada : 1980-1997 9

Figure 3 Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – Canada : 1982-1997 10

Figure 4 Distribution des nouveaux cas évolutifs et des cas de rechute de tuberculose signalés selon l'origine – Canada : 1980-1997 10

Figure 5 Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le site diagnostique principal – Canada : 1987-1997 11

Figure 6 Distribution des nouveaux cas évolutifs et des cas de rechute de tuberculose signalés selon l'origine – provinces/territoires : 1997 11

Figure 7 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge et l'origine – Canada : 1997 12

Figure 8 Distribution des nouveaux cas évolutifs et des cas de rechute de tuberculose signalés selon l'origine et le site diagnostique principal – Canada : 1997 12

TABLEAUX

Tableau 1A Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997 13

Tableau 1B Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997 14

Tableau 1C Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997 15

Tableau 2A Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – Canada : 1987-1997 16

Tableau 2B Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – hommes – Canada : 1987-1997 17

Tableau 2C Taux d'incidence pour 100 000, et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – femmes – Canada : 1987-1997 18

Tableau 3 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naisssance – Canada : 1987-1997 19

Tableau 4 Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le site diagnostique principal – Canada : 1987-1997 20

Tableau 5A Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – Canada et provinces/territoires : 1997 21

Tableau 5B Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – hommes – Canada et provinces/territoires : 1997 22

Tableau 5C Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – femmes – Canada et provinces/territoires : 1997 23

Tableau 6 Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance – Canada et provinces/territoires : 1997 24

Tableau 7 Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997 26

Tableau 8 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance, le sexe et le groupe d'âge – Canada : 1997 27

Tableau 9 Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge et le site diagnostique principal – Canada : 1997 29

Tableau 10 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et le site diagnostique principal – Canada : 1997 30

Tableau 11 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et la situation du cas – Canada : 1997 31

Tableau 12 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires : 1997 32

Tableau 13 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le lieu de naissance – Canada : 1997. 33

Tableau 14 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada : 1997 34

Tableau 15 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997 35

Tableau 16 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires : 1997 39

Tableau 17 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon la méthode de détection – Canada et provinces/territoires : 1997 47

Tableau 18 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon la méthode de détection et le lieu de naissance : 1997 47

Tableau 19 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose chez les Canadiens nés à l'étranger signalés selon le lieu de naissance et l'année d'arrivée au Canada : 1997 48

Tableau 20 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose chez les Canadiens nés à l'étranger, selon leur statut d'immigrant(e) – Canada et provinces/territoires : 1997 48

Tableau 21 Cas de rechute de tuberculose signalés selon l'intervalle inactif – Canada et provinces/territoires : 1997 49

Tableau 22 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose et nombre de diagnostics signalés selon le site diagnostique principal – Canada : 1997 50

Tableau 23 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés en 1997 qui sont décédés en 1997, selon la cause de décès – Canada et provinces/territoires : 1997 51

Tableau 24 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés en 1997 qui sont décédés en 1997, selon le groupe d'âge et le sexe – Canada : 1997 51

Tableau 25 Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le statut sérologique pour le VIH – Canada et provinces/territoires: 1997 52

ANNEXES

Annexe 1A Estimations de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces/territoires : 1997 53

Annexe 1B Estimations de la population, selon une origine canadienne ou lieu de naissance à l'étranger, Canada et provinces/territoires : 1997 54

Annexe 2 Formulaire de déclaration des cas de tuberculose évolutive – Nouveaux cas et cas de rechute . . 55

Annexe 3 Notes techniques 56

Méthodologie et rapport sur la qualité des données 56
Collecte des données 56
Traitement des données 56
Calcul des taux 57
Qualité des données 57
Autres sources de renseignements 58

Définition des termes 59
Registre de la tuberculose 59
Avis 59
Définition de cas de tuberculose 59
Classification diagnostique 60
Décès 60
Estimations de la population 60
Renseignements supplémentaires 61
Références 61

INTRODUCTION

Voici le deuxième rapport annuel sur la morbidité et la mortalité associées à la tuberculose, publié par la Division de la lutte antituberculeuse depuis que la responsabilité du Système canadien de déclaration de la tuberculose (SCDT) a été transférée de Statistique Canada à Santé Canada.

La présentation et le contenu des rapports annuels sur la morbidité et la mortalité associées à la tuberculose ont fait l'objet de modifications au fil des ans, et cette tendance se maintiendra, compte tenu des changements dans l'épidémiologie et le traitement de la tuberculose. Les modifications apportées au rapport de cette année comportent des changements du site diagnostique primaire (selon une hiérarchie), des indications de la distribution des cas nés à l'étranger selon les régions de l'OMS, et l'inclusion du statut d'immigrant(e) des cas nés à l'étranger et du statut sérologique pour le VIH.

Avant 1966, les rapports étaient axés sur les caractéristiques des patients hospitalisés dans les établissements de traitement de la tuberculose. Cependant, avec la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments antituberculeux, un nombre de plus en plus grand de personnes atteintes de tuberculose évolutive ont été traitées en consultation externe. Depuis lors, les rapports annuels contiennent des statistiques sur ces patients.

Comme les traitements en établissement sont de moins en moins fréquents, on a commencé en 1975 à combiner les données sur les patients hospitalisés et les patients traités en consultation externe, alors qu'auparavant, ces données étaient prises en compte séparément. À partir de 1976, on a cessé d'inclure les données sur les installations et services dans les établissements de traitement de la tuberculose; depuis, les rapports contiennent des données sur tous les cas de tuberculose recensés dans la population, quel que soit l'établissement qui dispense le traitement.

Depuis l'année d'étude 1977, les rapports étaient élaborés conjointement par Statistique Canada, l'Association pulmonaire du Canada et les bureaux provinciaux et territoriaux de lutte antituberculeuse, et contenaient des renseignements essentiels à des fins de surveillance et de lutte contre la tuberculose au Canada.

Par suite d'une étude du système national de surveillance de la tuberculose, effectuée en 1996 conjointement par les directeurs provinciaux et territoriaux de la lutte antituberculeuse et par Santé Canada, on a révisé les formules de rapport pour l'année d'étude 1997 pour tenir compte des renseignements additionnels concernant la prévention et la lutte antituberculeuse. Les principaux changements visent notamment les renseignements sur le statut d'immigrant(e) des cas nés à l'étranger et le statut sérologique pour le VIH (voir la formule de rapport présentée à l'annexe 2). Le rapport, dont la présentation a été modifiée en 1997, comprend maintenant des tableaux contenant ces nouvelles données.

Sommaire exécutif

En 1997, un total de 1 975 nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose ont été signalés à la Division de la lutte antituberculeuse par les dix provinces et les deux territoires. Ce nombre représente une hausse de 5,7 % par rapport à 1996 et le plus haut total depuis 1994, année au cours de laquelle 2 074 cas ont été signalés. Les nouveaux cas évolutifs constituaient la grande majorité (90 %) des cas signalés en 1997 et l'autre 10 % était composé de cas de rechute.

Sept des administrations qui faisaient rapport avaient des taux de cas inférieurs au taux national de 6,6 pour 100 000 (l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec et le Yukon) et quatre d'entre elles (le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon) ont signalé moins de dix cas chacune. Les trois provinces les plus peuplées, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, qui forment ensemble 75 % de la population canadienne, représentaient 77 % du total de cas signalés en 1997. Par rapport à l'année précédente, sept administrations qui faisaient rapport (le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest, l'Ontario et le Yukon) ont fait état d'une baisse du nombre de cas et des taux. La hausse générale des cas déclarés était causée principalement par les hausses constatées au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Par groupe d'âge, les personnes âgées de 25 à 34 ans formaient le plus grand nombre de cas déclarés, ce qui représente 19 % du total. Cependant, le taux de cas correspondant, 8,2 pour 100 000 pour ce groupe d'âge a été dépassé par les taux établis en fonction de l'âge chez les personnes plus âgées. En effet, les taux de cas étaient respectivement de 8,8, de 11,7 et de18,0 pour 100 000 pour les groupes d'âges suivants : de 55 à 64 ans, de 65 à 74 ans et de 74 ans et plus.

Au fil du temps, les tendances se rapportant aux cas de tuberculose en fonction du lieu de naissance ont changé. De 1987 à 1997, le nombre de cas parmi les personnes nées au Canada et qui ne sont pas d'origine autochtone a diminué de 44 % (de 720 à 400 cas), alors que le nombre de cas parmi les Autochtones a diminué de 26 % (de 384 à 283). Au cours de cette même période, le nombre de cas parmi les personnes nées à l'étranger a augmenté de 46 % (de 868 à 1 271). En 1987, les proportions de tous les cas de tuberculose chez les Canadiens qui ne sont pas autochtones, les Autochtones et les immigrants étaient respectivement de 37 %, de 19 % et de 44 %. En 1997, les proportions de tous les cas de tuberculose chez les personnes non autochtones nées au Canada et chez les Autochtones avaient baissé de 20 % et de 14 % respectivement, alors que le nombre de cas chez les personnes nées à l'étranger avaient augmenté de 64 %. Il est à noter que parmi tous les cas de tuberculose signalés en 1997 selon le lieu de naissance à l'étranger, 38 % des personnes atteintes sont arrivées au Canada en 1993 ou après cette date.

Lorsqu'on regarde la répartition des cas de tuberculose en fonction du lieu de naissance au pays en 1997, l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta ont toutes signalé que plus de 60 % de leurs cas de tuberculose venaient de l'étranger, en particulier en Ontario où la proportion était de 85 %. Dans les Territoires du Nord-Ouest, en Saskatchewan et au Manitoba, les cas de tuberculose d'origine autochtone ont représenté la plus grande proportion si l'on tient compte du nombre total de cas.

En tenant compte de l'âge, les Canadiens nés au Canada et non autochtones qui ont eu la tuberculose étaient relativement âgés, si on les compare aux cas de tuberculose chez les

personnes nées à l'étranger et chez les Autochtones. L'âge moyen des personnes nées au Canada victimes de tuberculose était de 58 ans, alors que les personnes nées à l'étranger et les Autochtones étaient âgés respectivement de 43 ans et de 32 ans.

Dans l'ensemble, la tuberculose respiratoire était le diagnostic principal pour 62 % des cas signalés en 1997. La proportion de cas de tuberculose respiratoire était plus élevée chez les personnes non autochtones nées au Canada (70 %) que chez les Autochtones et les personnes nées à l'étranger (60 %). De façon générale, les ganglions lymphatiques périphériques se classaient au deuxième rang des régions les plus souvent affectées par la tuberculose. Presque la moitié de tous ces cas sont originaires de la région du Pacifique occidental. Ce site de diagnostique représentait 19 % de tous les cas de tuberculose venant de l'étranger. Parmi les cas de tuberculose chez les Autochtones, la tuberculose primaire représentait la plus grande proportion (27 %) de tous les cas signalés après la tuberculose respiratoire.

Un total de 1 782 des 1 975 cas de tuberculose signalés (90 %) ont été confirmés par des épreuves de laboratoire. Des 1 230 cas de tuberculose respiratoire, 54 % ont été confirmés par examens microscopiques (frottis) et 84 % par des cultures.

La majorité des cas de tuberculose signalés (79 %) ont été découverts grâce à l'examen médical des symptômes.

Comme on reconnaît l'importance de l'interaction de l'infection au VIH avec la tuberculose, les données sur l'état sérologique relativement au VIH ont été ajoutées au système de surveillance national de la tuberculose pour les cas à compter de 1997. L'analyse de cette variable a indiqué que l'état sérologique relativement au VIH était inconnu dans 94 % des cas de tuberculose signalés. Il faudra que les programmes de surveillance de la tuberculose des territoires et des provinces collaborent davantage si l'on veut acquérir une meilleure compréhension de l'ampleur de la co-infection de la tuberculose avec le VIH au Canada.

Des 1 975 cas signalés en 1997, on a signalé 120 décès. On a signalé que la tuberculose était la cause initiale de 27 (23 %) de ces décès et qu'elle avait contribué aux décès de 42 (35 %) personnes sans en être la cause initiale. Il faudrait prendre note que le nombre de décès attribuables à la tuberculose signalé est sous-évalué puisque seuls les décès connus au moment du signalement sont déclarés.

Figure 1

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada : 1924-1997



Figure 2

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada : 1980-1997



Figure 3

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – Canada : 1982-1997



Figure 4

Distribution des nouveaux cas évolutifs et des cas de rechute de tuberculose signalés selon l'origine – Canada : 1980 et 1997



Figure 5

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le site diagnostique principal – Canada : 1987-1997



Figure 6

Distribution des nouveaux cas évolutifs et des cas de rechute de tuberculose signalés selon l'origine – provinces/territoires : 1997 (n=1 975)



Figure 7

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge et l'origine – Canada : 1997 (n=1 975)



Figure 8

Distribution des nouveaux cas évolutifs et des cas de rechute de tuberculose signalés selon l'origine et le site diagnostique principal – Canada : 1997 (n=1 975)



Tableau 1A

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997

Année du diagnostic		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
1987	Cas	1 972	34	1	30	24	432	645	125	157	205	298	1	20
	Taux	7,4	5,9	0,8	3,3	3,3	6,3	6,7	11,4	15,1	8,4	9,7	3,8	35,9
1988	Cas	1 947	65	4	26	18	423	635	111	149	176	300	4	36
	Taux	7,3	11,4	3,1	2,9	2,5	6,2	6,5	10,1	14,6	7,2	9,7	15	64,9
1989	Cas	2 035	42	5	30	29	420	711	100	216	133	288	5	56
	Taux	7,4	7,3	3,8	3,3	3,9	6	7	9	21,1	5,3	9	18,3	97,3
1990	Cas	1 997	28	1	23	34	412	730	92	223	156	265	10	23
	Taux	7,2	4,8	0,8	2,5	4,6	5,9	7,1	8,3	22,1	6,1	8	35,7	38,8
1991	Cas	2 018	34	3	17	27	400	769	101	184	173	280	8	22
	Taux	7,2	5,9	2,3	1,9	3,6	5,6	7,3	9,1	18,3	6,7	8,3	27,4	35,9
1992	Cas	2 108	34	2	13	19	424	822	86	133	222	323	3	27
	Taux	7,4	5,8	1,5	1,4	2,5	5,9	7,7	7,7	13,2	8,4	9,3	9,9	43,2
1993	Cas	2 012	62	5	17	15	352	769	108	153	156	337	3	35
	Taux	7	10,6	3,8	1,8	2	4,9	7,1	9,6	15,1	5,8	9,4	9,8	55
1994	Cas	2 074	14	-	12	16	361	831	116	147	178	324	10	65
	Taux	7,1	2,4	-	1,3	2,1	5	7,6	10,3	14,5	6,6	8,8	33,7	100,4
1995	Cas	1 931	11	1	13	9	380	766	109	155	125	308	2	52
	Taux	6,5	1,9	0,7	1,4	1,2	5,2	6,9	9,6	15,3	4,5	8,2	6,6	79
1996	Cas	1 869	24	3	15	15	332	771	97	113	140	317	6	36
	Taux	6,3	4,3	2,2	1,6	2	4,6	6,9	8,6	11,1	5	8,2	18,8	53,3
1997	Cas	1 975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Taux	6,6	2,7	3,7	0,7	0,9	4,9	6,8	8,4	11,8	5,8	10,2	6,2	45,7

Tableau 1A

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997

Année du diagnostic		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
1987	Cas	1 972	34	1	30	24	432	645	125	157	205	298	1	20
	Taux	7,4	5,9	0,8	3,3	3,3	6,3	6,7	11,4	15,1	8,4	9,7	3,8	35,9
1988	Cas	1 947	65	4	26	18	423	635	111	149	176	300	4	36
	Taux	7,3	11,4	3,1	2,9	2,5	6,2	6,5	10,1	14,6	7,2	9,7	15	64,9
1989	Cas	2 035	42	5	30	29	420	711	100	216	133	288	5	56
	Taux	7,4	7,3	3,8	3,3	3,9	6	7	9	21,1	5,3	9	18,3	97,3
1990	Cas	1 997	28	1	23	34	412	730	92	223	156	265	10	23
	Taux	7,2	4,8	0,8	2,5	4,6	5,9	7,1	8,3	22,1	6,1	8	35,7	38,8
1991	Cas	2 018	34	3	17	27	400	769	101	184	173	280	8	22
	Taux	7,2	5,9	2,3	1,9	3,6	5,6	7,3	9,1	18,3	6,7	8,3	27,4	35,9
1992	Cas	2 108	34	2	13	19	424	822	86	133	222	323	3	27
	Taux	7,4	5,8	1,5	1,4	2,5	5,9	7,7	7,7	13,2	8,4	9,3	9,9	43,2
1993	Cas	2 012	62	5	17	15	352	769	108	153	156	337	3	35
	Taux	7	10,6	3,8	1,8	2	4,9	7,1	9,6	15,1	5,8	9,4	9,8	55
1994	Cas	2 074	14	-	12	16	361	831	116	147	178	324	10	65
	Taux	7,1	2,4	-	1,3	2,1	5	7,6	10,3	14,5	6,6	8,8	33,7	100,4
1995	Cas	1 931	11	1	13	9	380	766	109	155	125	308	2	52
	Taux	6,5	1,9	0,7	1,4	1,2	5,2	6,9	9,6	15,3	4,5	8,2	6,6	79
1996	Cas	1 869	24	3	15	15	332	771	97	113	140	317	6	36
	Taux	6,3	4,3	2,2	1,6	2	4,6	6,9	8,6	11,1	5	8,2	18,8	53,3
1997	Cas	1 975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Taux	6,6	2,7	3,7	0,7	0,9	4,9	6,8	8,4	11,8	5,8	10,2	6,2	45,7

Tableau 1B

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997

Année du diagnostic		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
1987	Cas	1 797	33	1	26	20	420	570	113	140	195	266	1	12
	Taux	6,8	5,7	0,8	2,9	2,7	6,2	5,9	10,3	13,5	8	8,7	3,8	21,6
1988	Cas	1 771	56	4	24	15	407	560	102	134	160	271	4	34
	Taux	6,6	9,8	3,1	2,7	2,1	6	5,7	9,3	13,1	6,6	8,7	15	61,3
1989	Cas	1 829	37	5	21	22	407	627	87	203	121	252	3	44
	Taux	6,7	6,4	3,8	2,3	3	5,9	6,2	7,9	19,8	4,8	7,9	11	76,5
1990	Cas	1 788	26	-	15	27	402	614	88	211	144	234	8	19
	Taux	6,4	4,5	-	1,6	3,6	5,7	5,9	7,9	20,9	5,6	7,1	28,5	32
1991	Cas	1 806	32	3	12	22	382	661	89	170	152	253	8	22
	Taux	6,4	5,5	2,3	1,3	2,9	5,4	6,3	8	16,9	5,8	7,5	27,4	35,9
1992	Cas	1 865	31	2	9	16	399	692	81	121	201	291	2	20
	Taux	6,5	5,3	1,5	1	2,1	5,6	6,5	7,2	12	7,6	8,4	6,6	32
1993	Cas	1 772	59	5	14	12	311	653	95	145	143	304	3	28
	Taux	6,1	10,1	3,8	1,5	1,6	4,3	6	8,5	14,3	5,3	8,5	9,8	44
1994	Cas	1 838	12	-	12	15	306	723	107	141	160	294	9	59
	Taux	6,3	2,1	-	1,3	2	4,2	6,6	9,5	13,9	5,9	8	30,3	91,1
1995	Cas	1 726	9	1	10	8	348	657	97	143	115	290	2	46
	Taux	5,8	1,6	0,7	1,1	1,1	4,7	5,9	8,5	14,1	4,2	7,7	6,6	69,8
1996	Cas	1 672	21	3	11	9	294	689	84	109	129	288	4	31
	Taux	5,6	3,7	2,2	1,2	1,2	4	6,2	7,4	10,7	4,6	7,4	12,5	45,9
1997	Cas	1 769	13	4	5	6	323	687	86	110	150	359	2	24
	Taux	5,9	2,3	2,9	0,5	0,8	4,4	6,1	7,6	10,8	5,3	9,1	6,2	35,4

N.B. : Les cas pour lesquels l'activité n'est pas précisée sont compris dans le total (tableau 1A).

Tableau 1C

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997

Année du diagnostic		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
1987	Cas	**175**	1	-	4	4	12	75	12	17	10	32	-	8
	Taux	**0,7**	0,2	-	0,4	0,5	0,2	0,8	1,1	1,6	0,4	1	-	14,4
1988	Cas	**176**	9	-	2	3	16	75	9	15	16	29	-	2
	Taux	**0,7**	1,6	-	0,2	0,4	0,2	0,8	0,8	1,5	0,7	0,9	-	3,6
1989	Cas	**206**	5	-	9	7	13	84	13	13	12	36	2	12
	Taux	**0,8**	0,9	-	1	0,9	0,2	0,8	1,2	1,3	0,5	1,1	7,3	20,9
1990	Cas	**180**	2	1	8	7	10	87	4	12	12	31	2	4
	Taux	**0,6**	0,3	0,8	0,9	0,9	0,1	0,8	0,4	1,2	0,5	0,9	7,1	6,7
1991	Cas	**206**	2	-	5	5	18	102	12	14	21	27	-	-
	Taux	**0,7**	0,3	-	0,5	0,7	0,3	1	1,1	1,4	0,8	0,8	-	-
1992	Cas	**241**	3	-	4	3	25	128	5	12	21	32	1	7
	Taux	**0,8**	0,5	-	0,4	0,4	0,3	1,2	0,4	1,2	0,8	0,9	3,3	11,2
1993	Cas	**238**	3	-	3	3	41	114	13	8	13	33	-	7
	Taux	**0,8**	0,5	-	0,3	0,4	0,6	1,1	1,2	0,8	0,5	0,9	-	11
1994	Cas	**228**	2	-	-	1	55	100	9	6	18	30	1	6
	Taux	**0,8**	0,3	-	-	0,1	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,8	3,4	9,3
1995	Cas	**195**	2	-	3	1	28	103	12	12	10	18	-	6
	Taux	**0,7**	0,3	-	0,3	0,1	0,4	0,9	1,1	1,2	0,4	0,5	-	9,1
1996	Cas	**178**	3	-	3	5	36	72	9	4	11	29	1	5
	Taux	**0,6**	0,5	-	0,3	0,7	0,5	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	3,1	7,4
1997	Cas	**197**	2	1	2	1	34	70	10	11	16	43	-	7
	Taux	**0,7**	0,4	0,7	0,2	0,1	0,5	0,6	0,9	1,1	0,6	1,1	-	10,3

N.B. : Les cas pour lesquels l'activité n'est pas précisée sont compris dans le total (tableau 1A).

Tableau 1B

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997

Année du diagnostic		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
1987	Cas	1 797	33	1	26	20	420	570	113	140	195	266	1	12
	Taux	6,8	5,7	0,8	2,9	2,7	6,2	5,9	10,3	13,5	8	8,7	3,8	21,6
1988	Cas	1 771	56	4	24	15	407	560	102	134	160	271	4	34
	Taux	6,6	9,8	3,1	2,7	2,1	6	5,7	9,3	13,1	6,6	8,7	15	61,3
1989	Cas	1 829	37	5	21	22	407	627	87	203	121	252	3	44
	Taux	6,7	6,4	3,8	2,3	3	5,9	6,2	7,9	19,8	4,8	7,9	11	76,5
1990	Cas	1 788	26	-	15	27	402	614	88	211	144	234	8	19
	Taux	6,4	4,5	-	1,6	3,6	5,7	5,9	7,9	20,9	5,6	7,1	28,5	32
1991	Cas	1 806	32	3	12	22	382	661	89	170	152	253	8	22
	Taux	6,4	5,5	2,3	1,3	2,9	5,4	6,3	8	16,9	5,8	7,5	27,4	35,9
1992	Cas	1 865	31	2	9	16	399	692	81	121	201	291	2	20
	Taux	6,5	5,3	1,5	1	2,1	5,6	6,5	7,2	12	7,6	8,4	6,6	32
1993	Cas	1 772	59	5	14	12	311	653	95	145	143	304	3	28
	Taux	6,1	10,1	3,8	1,5	1,6	4,3	6	8,5	14,3	5,3	8,5	9,8	44
1994	Cas	1 838	12	-	12	15	306	723	107	141	160	294	9	59
	Taux	6,3	2,1	-	1,3	2	4,2	6,6	9,5	13,9	5,9	8	30,3	91,1
1995	Cas	1 726	9	1	10	8	348	657	97	143	115	290	2	46
	Taux	5,8	1,6	0,7	1,1	1,1	4,7	5,9	8,5	14,1	4,2	7,7	6,6	69,8
1996	Cas	1 672	21	3	11	9	294	689	84	109	129	288	4	31
	Taux	5,6	3,7	2,2	1,2	1,2	4	6,2	7,4	10,7	4,6	7,4	12,5	45,9
1997	Cas	1 769	13	4	5	6	323	687	86	110	150	359	2	24
	Taux	5,9	2,3	2,9	0,5	0,8	4,4	6,1	7,6	10,8	5,3	9,1	6,2	35,4

N.B. : Les cas pour lesquels l'activité n'est pas précisée sont compris dans le total (tableau 1A).

Tableau 1C

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de cas de rechute de tuberculose signalés – Canada et provinces/territoires : 1987-1997

Année du diagnostic		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
1987	Cas	175	1	-	4	4	12	75	12	17	10	32	-	8
	Taux	0,7	0,2	-	0,4	0,5	0,2	0,8	1,1	1,6	0,4	1	-	14,4
1988	Cas	176	9	-	2	3	16	75	9	15	16	29	-	2
	Taux	0,7	1,6	-	0,2	0,4	0,2	0,8	0,8	1,5	0,7	0,9	-	3,6
1989	Cas	206	5	-	9	7	13	84	13	13	12	36	2	12
	Taux	0,8	0,9	-	1	0,9	0,2	0,8	1,2	1,3	0,5	1,1	7,3	20,9
1990	Cas	180	2	1	8	7	10	87	4	12	12	31	2	4
	Taux	0,6	0,3	0,8	0,9	0,9	0,1	0,8	0,4	1,2	0,5	0,9	7,1	6,7
1991	Cas	206	2	-	5	5	18	102	12	14	21	27	-	-
	Taux	0,7	0,3	-	0,5	0,7	0,3	1	1,1	1,4	0,8	0,8	-	-
1992	Cas	241	3	-	4	3	25	128	5	12	21	32	1	7
	Taux	0,8	0,5	-	0,4	0,4	0,3	1,2	0,4	1,2	0,8	0,9	3,3	11,2
1993	Cas	238	3	-	3	3	41	114	13	8	13	33	-	7
	Taux	0,8	0,5	-	0,3	0,4	0,6	1,1	1,2	0,8	0,5	0,9	-	11
1994	Cas	228	2	-	-	1	55	100	9	6	18	30	1	6
	Taux	0,8	0,3	-	-	0,1	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,8	3,4	9,3
1995	Cas	195	2	-	3	1	28	103	12	12	10	18	-	6
	Taux	0,7	0,3	-	0,3	0,1	0,4	0,9	1,1	1,2	0,4	0,5	-	9,1
1996	Cas	178	3	-	3	5	36	72	9	4	11	29	1	5
	Taux	0,6	0,5	-	0,3	0,7	0,5	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	3,1	7,4
1997	Cas	197	2	1	2	1	34	70	10	11	16	43	-	7
	Taux	0,7	0,4	0,7	0,2	0,1	0,5	0,6	0,9	1,1	0,6	1,1	-	10,3

N.B. : Les cas pour lesquels l'activité n'est pas précisée sont compris dans le total (tableau 1A).

Tableau 2A

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – Canada : 1987-1997

Année du diagnostic		TOTAL	Groupe d'âge										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Inconnu
1987	Cas	1 972	12	57	71	215	368	246	198	265	283	257	-
	Taux	7,4	3,2	3,8	1,9	4,9	7,5	6,3	7,5	11,1	16,3	23,1	-
1988	Cas	1 947	12	33	52	227	384	241	198	260	274	266	-
	Taux	7,3	6,7	2,2	1,4	5,4	7,7	6	7,3	10,8	15,4	23,1	-
1989	Cas	2 035	31	74	78	259	341	252	204	256	274	266	-
	Taux	7,4	8,1	4,9	2,1	6,2	6,7	6	7,3	10,6	15	22,1	-
1990	Cas	1 997	44	91	66	208	400	240	181	244	280	241	2
	Taux	7,2	11	5,9	1,7	5,1	7,8	5,5	6,2	10,1	15	19,3	-
1991	Cas	2 018	48	71	60	227	399	282	188	223	279	240	1
	Taux	7,2	11,9	4,6	1,6	5,6	7,8	6,3	6,2	9,2	14,5	18,6	-
1992	Cas	2 108	25	83	85	242	405	286	191	224	276	290	1
	Taux	7,4	6,2	5,3	2,2	6	7,9	6,2	6	9,2	14	21,8	-
1993	Cas	2 012	26	69	108	234	386	270	210	214	257	237	1
	Taux	7	6,6	4,3	2,7	5,8	7,6	5,7	6,2	8,7	12,7	17,3	-
1994	Cas	2 074	20	72	98	274	411	261	224	212	271	231	-
	Taux	7,1	5,2	4,5	2,5	6,8	8,2	5,4	6,4	8,5	13,2	16,4	-
1995	Cas	1 931	27	64	85	229	325	314	201	209	251	225	1
	Taux	6,5	7,1	4	2,1	5,7	6,6	6,4	5,5	8,3	12	15,3	-
1996	Cas	1 869	11	68	63	214	356	304	191	193	250	219	-
	Taux	6,3	2,9	4,3	1,6	5,3	7,5	6,1	5	7,6	12	14,7	-
1997	Cas	1 975	9	49	58	214	385	291	216	228	246	279	-
	Taux	6,6	2,5	3,1	1,4	5,3	8,2	5,7	5,5	8,8	11,7	18	-

Tableau 2B

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – hommes – Canada : 1987-1997

Année du diagnostic		TOTAL	Groupe d'âge										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Inconnu
1987	Cas	1 131	7	30	32	103	221	141	123	155	170	149	-
	Taux	8,6	3,7	3,9	1,7	4,6	8,9	7,2	9,3	13,4	22	35,8	-
1988	Cas	1 123	3	16	21	128	207	145	119	172	159	153	-
	Taux	8,5	-	2,1	1,1	5,9	8,2	7,1	8,7	14,7	20,1	35,4	-
1989	Cas	1 152	15	43	39	121	178	146	132	175	160	143	-
	Taux	8,5	7,7	5,5	2	5,7	6,9	6,9	9,3	14,8	19,6	31,7	-
1990	Cas	1 096	16	41	33	112	217	130	117	140	161	128	1
	Taux	8	7,8	5,2	1,7	5,4	8,3	5,9	8	11,8	19,2	27,3	-
1991	Cas	1 174	30	38	31	135	235	162	107	119	179	137	1
	Taux	8,4	14,5	4,8	1,6	6,6	9,1	7,2	7,1	9,9	20,8	28,2	-
1992	Cas	1 178	16	39	35	129	222	178	116	133	157	153	-
	Taux	8,3	7,7	4,8	1,8	6,3	8,6	7,7	7,2	11	17,7	30,6	-
1993	Cas	1 135	13	35	62	124	207	154	130	132	144	133	1
	Taux	7,9	6,5	4,2	3,1	6	8,1	6,5	7,7	10,9	15,8	25,9	-
1994	Cas	1 121	9	36	52	140	203	151	133	117	150	130	-
	Taux	7,7	4,6	4,3	2,6	6,8	8	6,3	7,5	9,5	16	24,6	-
1995	Cas	1 044	9	30	40	112	166	191	118	122	145	111	-
	Taux	7,1	4,6	3,7	2	5,5	6,7	7,7	6,4	9,8	15,2	20,2	-
1996	Cas	1 006	7	32	35	106	180	158	106	104	144	134	-
	Taux	6,8	3,6	3,9	1,7	5,1	7,5	6,3	5,6	8,3	15	24,1	-
1997	Cas	1 051	6	27	25	93	193	158	118	130	139	162	-
	Taux	7,1	3,3	3,4	1,2	4,5	8,2	6,2	6	10,2	14,3	28	-

Tableau 2A

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – Canada : 1987-1997

Année du diagnostic		TOTAL	Groupe d'âge										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Inconnu
1987	Cas	1 972	12	57	71	215	368	246	198	265	283	257	-
	Taux	7,4	3,2	3,8	1,9	4,9	7,5	6,3	7,5	11,1	16,3	23,1	-
1988	Cas	1 947	12	33	52	227	384	241	198	260	274	266	-
	Taux	7,3	6,7	2,2	1,4	5,4	7,7	6	7,3	10,8	15,4	23,1	-
1989	Cas	2 035	31	74	78	259	341	252	204	256	274	266	-
	Taux	7,4	8,1	4,9	2,1	6,2	6,7	6	7,3	10,6	15	22,1	-
1990	Cas	1 997	44	91	66	208	400	240	181	244	280	241	2
	Taux	7,2	11	5,9	1,7	5,1	7,8	5,5	6,2	10,1	15	19,3	-
1991	Cas	2 018	48	71	60	227	399	282	188	223	279	240	1
	Taux	7,2	11,9	4,6	1,6	5,6	7,8	6,3	6,2	9,2	14,5	18,6	-
1992	Cas	2 108	25	83	85	242	405	286	191	224	276	290	1
	Taux	7,4	6,2	5,3	2,2	6	7,9	6,2	6	9,2	14	21,8	-
1993	Cas	2 012	26	69	108	234	386	270	210	214	257	237	1
	Taux	7	6,6	4,3	2,7	5,8	7,6	5,7	6,2	8,7	12,7	17,3	-
1994	Cas	2 074	20	72	98	274	411	261	224	212	271	231	-
	Taux	7,1	5,2	4,5	2,5	6,8	8,2	5,4	6,4	8,5	13,2	16,4	-
1995	Cas	1 931	27	64	85	229	325	314	201	209	251	225	1
	Taux	6,5	7,1	4	2,1	5,7	6,6	6,4	5,5	8,3	12	15,3	-
1996	Cas	1 869	11	68	63	214	356	304	191	193	250	219	-
	Taux	6,3	2,9	4,3	1,6	5,3	7,5	6,1	5	7,6	12	14,7	-
1997	Cas	1 975	9	49	58	214	385	291	216	228	246	279	-
	Taux	6,6	2,5	3,1	1,4	5,3	8,2	5,7	5,5	8,8	11,7	18	-

Tableau 2B

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – hommes – Canada : 1987-1997

Année du diagnostic		TOTAL	Groupe d'âge										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Inconnu
1987	Cas	1 131	7	30	32	103	221	141	123	155	170	149	-
	Taux	8,6	3,7	3,9	1,7	4,6	8,9	7,2	9,3	13,4	22	35,8	-
1988	Cas	1 123	3	16	21	128	207	145	119	172	159	153	-
	Taux	8,5	-	2,1	1,1	5,9	8,2	7,1	8,7	14,7	20,1	35,4	-
1989	Cas	1 152	15	43	39	121	178	146	132	175	160	143	-
	Taux	8,5	7,7	5,5	2	5,7	6,9	6,9	9,3	14,8	19,6	31,7	-
1990	Cas	1 096	16	41	33	112	217	130	117	140	161	128	1
	Taux	8	7,8	5,2	1,7	5,4	8,3	5,9	8	11,8	19,2	27,3	-
1991	Cas	1 174	30	38	31	135	235	162	107	119	179	137	1
	Taux	8,4	14,5	4,8	1,6	6,6	9,1	7,2	7,1	9,9	20,8	28,2	-
1992	Cas	1 178	16	39	35	129	222	178	116	133	157	153	-
	Taux	8,3	7,7	4,8	1,8	6,3	8,6	7,7	7,2	11	17,7	30,6	-
1993	Cas	1 135	13	35	62	124	207	154	130	132	144	133	1
	Taux	7,9	6,5	4,2	3,1	6	8,1	6,5	7,7	10,9	15,8	25,9	-
1994	Cas	1 121	9	36	52	140	203	151	133	117	150	130	-
	Taux	7,7	4,6	4,3	2,6	6,8	8	6,3	7,5	9,5	16	24,6	-
1995	Cas	1 044	9	30	40	112	166	191	118	122	145	111	-
	Taux	7,1	4,6	3,7	2	5,5	6,7	7,7	6,4	9,8	15,2	20,2	-
1996	Cas	1 006	7	32	35	106	180	158	106	104	144	134	-
	Taux	6,8	3,6	3,9	1,7	5,1	7,5	6,3	5,6	8,3	15	24,1	-
1997	Cas	1 051	6	27	25	93	193	158	118	130	139	162	-
	Taux	7,1	3,3	3,4	1,2	4,5	8,2	6,2	6	10,2	14,3	28	-

Tableau 2C

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – femmes – Canada : 1987-1997

Année du diagnostic		TOTAL	Groupe d'âge										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Inconnu
1987	Cas	841	5	27	39	112	147	105	75	110	113	108	-
	Taux	6,3	2,8	3,7	2,2	5,3	6,1	5,5	5,7	8,9	11,8	15,6	-
1988	Cas	824	9	17	31	99	177	96	79	88	115	113	-
	Taux	6,1	5	2,3	1,7	4,8	7,2	4,8	5,9	7,1	11,7	15,7	-
1989	Cas	883	16	31	39	138	163	106	72	81	114	123	-
	Taux	6,4	8,6	4,2	2,1	6,8	6,5	5,1	5,2	6,6	11,3	16,4	-
1990	Cas	901	28	50	33	96	183	110	64	104	119	113	1
	Taux	6,4	14,3	6,7	1,8	4,8	7,2	5,1	4,4	8,4	11,5	14,5	-
1991	Cas	844	18	33	29	92	164	120	81	104	100	103	-
	Taux	6	9,2	4,4	1,5	4,6	6,5	5,4	5,4	8,4	9,5	12,8	-
1992	Cas	930	9	44	50	113	183	108	75	91	119	137	1
	Taux	6,5	4,6	5,7	2,6	5,7	7,3	4,7	4,7	7,4	11	16,4	-
1993	Cas	877	13	34	46	110	179	116	80	82	113	104	-
	Taux	6	6,8	4,3	2,4	5,6	7,2	5	4,8	6,6	10,2	12,1	-
1994	Cas	953	11	36	46	134	208	110	91	95	121	101	-
	Taux	6,5	5,9	4,6	2,4	6,8	8,5	4,6	5,2	7,6	10,8	11,4	-
1995	Cas	887	18	34	45	117	159	123	83	87	106	114	1
	Taux	5,9	9,7	4,4	2,3	5,9	6,5	5	4,5	6,9	9,3	12,4	-
1996	Cas	863	4	36	28	108	176	146	85	89	106	85	-
	Taux	5,8	2,1	4,7	1,4	5,5	7,5	5,8	4,5	6,9	9,4	9,1	-
1997	Cas	923	3	22	33	121	192	133	98	98	107	116	-
	Taux	6,1	1,7	2,9	1,7	6,1	8,3	5,2	5	7,5	9,4	11,9	-

Tableau 3

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naisssance – Canada : 1987-1997

Lieu de naissance		Année du diagnostic										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Nés au Canada	Autochtones											
	Indiens inscrits	283	236	303	295	259	322	260	268	265	219	212
	Indiens non-inscrits/Métis	89	75	73	72	58	39	55	95	56	51	52
	Inuit	12	21	34	8	22	26	58	35	24	26	19
	Total	**384**	**332**	**410**	**375**	**339**	**387**	**373**	**398**	**345**	**296**	**283**
	Non-Autochtones	720	724	666	682	670	587	576	490	435	371	400
	Total	**1 104**	**1 056**	**1 076**	**1 057**	**1 009**	**974**	**949**	**888**	**780**	**667**	**683**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	30	42	57	52	70	73	53	68	60	57	92
	Les Amériques	107	83	100	79	92	119	98	99	116	99	103
	Méditerranée orientale	32	52	63	90	103	108	112	152	113	146	114
	Europe	219	203	204	181	159	170	148	145	139	114	134
	Asie du Sud-Est	108	91	108	103	114	133	159	167	164	177	197
	Pacifique occidental	255	289	293	435	470	509	491	551	519	553	569
	Lieu de naissance inconnu	117	131	134	-	1	22	2	4	29	25	62
	Total	**868**	**891**	**959**	**940**	**1 009**	**1 134**	**1 063**	**1 186**	**1 140**	**1 171**	**1 271**
Lieu de naissance inconnu		-	-	-	-	-	-	-	-	11	31	21
TOTAL		**1 972**	**1 947**	**2 035**	**1 997**	**2 018**	**2 108**	**2 012**	**2 074**	**1 931**	**1 869**	**1 975**

Tableau 2C

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – femmes – Canada : 1987-1997

Année du diagnostic		TOTAL	Groupe d'âge										
			< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	Inconnu
1987	Cas	841	5	27	39	112	147	105	75	110	113	108	-
	Taux	6,3	2,8	3,7	2,2	5,3	6,1	5,5	5,7	8,9	11,8	15,6	-
1988	Cas	824	9	17	31	99	177	96	79	88	115	113	-
	Taux	6,1	5	2,3	1,7	4,8	7,2	4,8	5,9	7,1	11,7	15,7	-
1989	Cas	883	16	31	39	138	163	106	72	81	114	123	-
	Taux	6,4	8,6	4,2	2,1	6,8	6,5	5,1	5,2	6,6	11,3	16,4	-
1990	Cas	901	28	50	33	96	183	110	64	104	119	113	1
	Taux	6,4	14,3	6,7	1,8	4,8	7,2	5,1	4,4	8,4	11,5	14,5	-
1991	Cas	844	18	33	29	92	164	120	81	104	100	103	-
	Taux	6	9,2	4,4	1,5	4,6	6,5	5,4	5,4	8,4	9,5	12,8	-
1992	Cas	930	9	44	50	113	183	108	75	91	119	137	1
	Taux	6,5	4,6	5,7	2,6	5,7	7,3	4,7	4,7	7,4	11	16,4	-
1993	Cas	877	13	34	46	110	179	116	80	82	113	104	-
	Taux	6	6,8	4,3	2,4	5,6	7,2	5	4,8	6,6	10,2	12,1	-
1994	Cas	953	11	36	46	134	208	110	91	95	121	101	-
	Taux	6,5	5,9	4,6	2,4	6,8	8,5	4,6	5,2	7,6	10,8	11,4	-
1995	Cas	887	18	34	45	117	159	123	83	87	106	114	1
	Taux	5,9	9,7	4,4	2,3	5,9	6,5	5	4,5	6,9	9,3	12,4	-
1996	Cas	863	4	36	28	108	176	146	85	89	106	85	-
	Taux	5,8	2,1	4,7	1,4	5,5	7,5	5,8	4,5	6,9	9,4	9,1	-
1997	Cas	923	3	22	33	121	192	133	98	98	107	116	-
	Taux	6,1	1,7	2,9	1,7	6,1	8,3	5,2	5	7,5	9,4	11,9	-

Tableau 3

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naisssance – Canada : 1987-1997

Lieu de naissance		Année du diagnostic										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Nés au Canada	Autochtones											
	Indiens inscrits	283	236	303	295	259	322	260	268	265	219	212
	Indiens non-inscrits/Métis	89	75	73	72	58	39	55	95	56	51	52
	Inuit	12	21	34	8	22	26	58	35	24	26	19
	Total	**384**	**332**	**410**	**375**	**339**	**387**	**373**	**398**	**345**	**296**	**283**
	Non-Autochtones	720	724	666	682	670	587	576	490	435	371	400
	Total	**1 104**	**1 056**	**1 076**	**1 057**	**1 009**	**974**	**949**	**888**	**780**	**667**	**683**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	30	42	57	52	70	73	53	68	60	57	92
	Les Amériques	107	83	100	79	92	119	98	99	116	99	103
	Méditerranée orientale	32	52	63	90	103	108	112	152	113	146	114
	Europe	219	203	204	181	159	170	148	145	139	114	134
	Asie du Sud-Est	108	91	108	103	114	133	159	167	164	177	197
	Pacifique occidental	255	289	293	435	470	509	491	551	519	553	569
	Lieu de naissance inconnu	117	131	134	-	1	22	2	4	29	25	62
	Total	**868**	**891**	**959**	**940**	**1 009**	**1 134**	**1 063**	**1 186**	**1 140**	**1 171**	**1 271**
Lieu de naissance inconnu		-	-	-	-	-	-	-	-	11	31	21
TOTAL		**1 972**	**1 947**	**2 035**	**1 997**	**2 018**	**2 108**	**2 012**	**2 074**	**1 931**	**1 869**	**1 975**

Tableau 4

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le site diagnostique principal – Canada : 1987-1997

Site diagnostique principal		Année du diagnostic										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Primaire	Cas	144	109	190	230	206	193	189	152	163	120	130
	Taux	0,5	0,4	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4
Miliaire/disséminée	Cas	53	47	47	67	43	60	58	65	48	57	73
	Taux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Cas	1 334	1 344	1 336	1 183	1 217	1 351	1 260	1 325	1 244	1 156	1 230
	Taux	5	5	4,9	4,3	4,3	4,7	4,4	4,5	4,2	3,9	4,1
Méninges et CNS	Cas	15	19	14	17	15	17	19	18	22	19	25
	Taux	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ganglion lymphatique périphérique	Cas	228	218	249	223	223	259	281	301	249	242	266
	Taux	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	1	1	0,8	0,8	0,9
Autres sites*	Cas	198	210	199	220	242	220	202	206	199	263	247
	Taux	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8
Inconnu	Cas	-	-	-	57	72	8	3	7	6	12	4
	Taux	-	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Cas	1 972	1 947	2 035	1 997	2 018	2 108	2 012	2 074	1 931	1 869	1 975
	Taux	7,4	7,3	7,4	7,2	7,2	7,4	7	7,1	6,5	6,3	6,6

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 5A

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – Canada et provinces/territoires : 1997

Groupe d'âge		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 1	Cas	9	-	-	-	-	1	1	-	7	-	-	-	-
	Taux	2,5	-	-	-	-	1,2	0,7	-	53,3	-	-	-	-
1 – 4	Cas	49	-	-	-	-	6	13	1	19	1	7	-	2
	Taux	3,1	-	-	-	-	1,7	2,1	1,5	33	0,6	3,6	-	32,4
5 – 14	Cas	58	-	-	-	-	5	11	2	29	3	8	-	-
	Taux	1,4	-	-	-	-	0,5	0,7	1,2	18,2	0,7	1,5	-	-
15 – 24	Cas	214	1	-	1	-	34	87	14	19	15	31	-	12
	Taux	5,3	1,1	-	0,8	-	3,5	5,9	8,9	12,6	3,7	5,9	-	109,5
25 – 34	Cas	385	1	-	2	-	64	167	12	17	28	90	-	4
	Taux	8,2	1,2	-	1,4	-	5,8	9,3	7,2	12,3	6,1	14,3	-	30,9
35 – 44	Cas	291	2	-	2	-	60	122	19	8	25	50	-	3
	Taux	5,7	2,2	-	1,3	-	4,7	6,4	10,5	5,1	4,9	7,3	-	28,5
45 – 54	Cas	216	1	-	-	1	32	89	10	6	18	54	-	5
	Taux	5,5	1,3	-	-	1	3,1	6,1	7,2	5,3	5,2	10,1	-	75,6
55 – 64	Cas	228	2	1	-	2	39	84	12	5	21	59	1	2
	Taux	8,8	4,3	8,5	-	3,1	5,8	8,6	13	6,1	9,9	17,4	47,5	65
65 – 74	Cas	246	4	2	1	1	46	104	12	3	27	45	1	-
	Taux	11,7	11,6	21,5	1,5	1,9	8,6	12,8	14,7	3,9	16,7	16	97,6	-
75 +	Cas	279	4	2	1	3	73	83	14	8	28	60	-	3
	Taux	18	15,2	23,9	1,8	6,9	20,3	14,4	19,3	11,1	23,9	27,5	-	420,8
TOTAL	Cas	1 975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Taux	6,6	2,7	3,7	0,7	0,9	4,9	6,8	8,4	11,8	5,8	10,2	6,2	45,7

Tableau 4

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le site diagnostique principal – Canada : 1987-1997

Site diagnostique principal		Année du diagnostic										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Primaire	Cas	144	109	190	230	206	193	189	152	163	120	130
	Taux	0,5	0,4	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4
Miliaire/disséminée	Cas	53	47	47	67	43	60	58	65	48	57	73
	Taux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Cas	1 334	1 344	1 336	1 183	1 217	1 351	1 260	1 325	1 244	1 156	1 230
	Taux	5	5	4,9	4,3	4,3	4,7	4,4	4,5	4,2	3,9	4,1
Méninges et CNS	Cas	15	19	14	17	15	17	19	18	22	19	25
	Taux	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ganglion lymphatique périphérique	Cas	228	218	249	223	223	259	281	301	249	242	266
	Taux	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	1	1	0,8	0,8	0,9
Autres sites*	Cas	198	210	199	220	242	220	202	206	199	263	247
	Taux	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8
Inconnu	Cas	-	-	-	57	72	8	3	7	6	12	4
	Taux	-	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**Cas**	**1 972**	**1 947**	**2 035**	**1 997**	**2 018**	**2 108**	**2 012**	**2 074**	**1 931**	**1 869**	**1 975**
	Taux	**7,4**	**7,3**	**7,4**	**7,2**	**7,2**	**7,4**	**7**	**7,1**	**6,5**	**6,3**	**6,6**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 5A

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – Canada et provinces/territoires : 1997

Groupe d'âge		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 1	Cas	9	-	-	-	-	1	1	-	7	-	-	-	-
	Taux	2,5	-	-	-	-	1,2	0,7	-	53,3	-	-	-	-
1 – 4	Cas	49	-	-	-	-	6	13	1	19	1	7	-	2
	Taux	3,1	-	-	-	-	1,7	2,1	1,5	33	0,6	3,6	-	32,4
5 – 14	Cas	58	-	-	-	-	5	11	2	29	3	8	-	-
	Taux	1,4	-	-	-	-	0,5	0,7	1,2	18,2	0,7	1,5	-	-
15 – 24	Cas	214	1	-	1	-	34	87	14	19	15	31	-	12
	Taux	5,3	1,1	-	0,8	-	3,5	5,9	8,9	12,6	3,7	5,9	-	109,5
25 – 34	Cas	385	1	-	2	-	64	167	12	17	28	90	-	4
	Taux	8,2	1,2	-	1,4	-	5,8	9,3	7,2	12,3	6,1	14,3	-	30,9
35 – 44	Cas	291	2	-	2	-	60	122	19	8	25	50	-	3
	Taux	5,7	2,2	-	1,3	-	4,7	6,4	10,5	5,1	4,9	7,3	-	28,5
45 – 54	Cas	216	1	-	-	1	32	89	10	6	18	54	-	5
	Taux	5,5	1,3	-	-	1	3,1	6,1	7,2	5,3	5,2	10,1	-	75,6
55 – 64	Cas	228	2	1	-	2	39	84	12	5	21	59	1	2
	Taux	8,8	4,3	8,5	-	3,1	5,8	8,6	13	6,1	9,9	17,4	47,5	65
65 – 74	Cas	246	4	2	1	1	46	104	12	3	27	45	1	-
	Taux	11,7	11,6	21,5	1,5	1,9	8,6	12,8	14,7	3,9	16,7	16	97,6	-
75 +	Cas	279	4	2	1	3	73	83	14	8	28	60	-	3
	Taux	18	15,2	23,9	1,8	6,9	20,3	14,4	19,3	11,1	23,9	27,5	-	420,8
TOTAL	**Cas**	**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**
	Taux	**6,6**	**2,7**	**3,7**	**0,7**	**0,9**	**4,9**	**6,8**	**8,4**	**11,8**	**5,8**	**10,2**	**6,2**	**45,7**

Tableau 5B

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – hommes – Canada et provinces/territoires : 1997

Groupe d'âge		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 1	Cas	6	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-
	Taux	3,3	-	-	-	-	2,3	1,4	-	59,2	-	-	-	-
1 – 4	Cas	27	-	-	-	-	3	6	-	10	1	6	-	1
	Taux	3,4	-	-	-	-	1,6	1,9	-	34	1,2	6	-	31,3
5 – 14	Cas	25	-	-	-	-	2	5	1	11	-	6	-	-
	Taux	1,2	-	-	-	-	0,4	0,6	1,2	13,5	-	2,3	-	-
15 – 24	Cas	93	1	-	1	-	17	31	7	6	6	14	-	10
	Taux	4,5	2,2	-	1,6	-	3,4	4,1	8,6	7,7	2,9	5,2	-	176,8
25 – 34	Cas	193	-	-	-	-	34	89	5	10	14	38	-	3
	Taux	8,2	-	-	-	-	6,1	9,9	5,9	14,3	6	11,9	-	45
35 – 44	Cas	158	1	-	1	-	32	70	10	4	13	25	-	2
	Taux	6,2	2,2	-	1,3	-	5	7,4	11	5	5	7,3	-	35,6
45 – 54	Cas	118	1	-	-	1	18	45	5	4	8	32	-	4
	Taux	6	2,6	-	-	1,9	3,6	6,3	7,2	6,9	4,6	12	-	109,3
55 – 64	Cas	130	1	-	-	2	24	49	5	4	8	35	-	2
	Taux	10,2	4,3	-	-	6,3	7,4	10,2	10,9	9,8	7,5	20,6	-	120,7
65 – 74	Cas	139	2	1	1	1	29	50	7	3	15	29	1	-
	Taux	14,3	12,1	22,8	3,3	4,1	12,2	13,3	18,7	8,3	19,4	21,7	173,9	-
75 +	Cas	162	2	-	-	2	41	51	7	3	17	39	-	1
	Taux	28	19	-	-	12,3	32,6	23,8	25,6	10,5	37,3	45,7	-	271,7
TOTAL	**Cas**	**1 051**	**8**	**1**	**3**	**6**	**201**	**397**	**47**	**59**	**82**	**224**	**1**	**23**
	Taux	**7,1**	**2,9**	**1,5**	**0,7**	**1,6**	**5,6**	**7,2**	**8,3**	**11,6**	**5,7**	**11,4**	**6**	**64,8**

Tableau 5C

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – femmes – Canada et provinces/territoires : 1997

Groupe d'âge		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 1	Cas	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Taux	1,7	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-
1 – 4	Cas	22	-	-	-	-	3	7	1	9	-	1	-	1
	Taux	2,9	-	-	-	-	1,7	2,4	3,2	31,9	-	1,1	-	33,6
5 – 14	Cas	33	-	-	-	-	3	6	1	18	3	2	-	-
	Taux	1,7	-	-	-	-	0,7	0,8	1,2	23,1	1,4	0,8	-	-
15 – 24	Cas	121	-	-	-	-	17	56	7	13	9	17	-	2
	Taux	6,1	-	-	-	-	3,6	7,7	9,1	17,8	4,5	6,6	-	37,7
25 – 34	Cas	192	1	-	2	-	30	78	7	7	14	52	-	1
	Taux	8,3	2,3	-	2,8	-	5,6	8,7	8,6	10,2	6,2	16,8	-	15,9
35 – 44	Cas	133	1	-	1	-	28	52	9	4	12	25	-	1
	Taux	5,2	2,1	-	1,3	-	4,4	5,4	10,1	5,1	4,8	7,4	-	20,4
45 – 54	Cas	98	-	-	-	-	14	44	5	2	10	22	-	1
	Taux	5	-	-	-	-	2,7	6	7,2	3,6	5,9	8,3	-	33,9
55 – 64	Cas	98	1	1	-	-	15	35	7	1	13	24	1	-
	Taux	7,5	4,4	16,9	-	-	4,4	7	15	2,4	12,4	14,1	107,4	-
65 – 74	Cas	107	2	1	-	-	17	54	5	-	12	16	-	-
	Taux	9,4	11,1	20,3	-	-	5,8	12,3	11,3	-	14,2	10,9	-	-
75 +	Cas	116	2	2	1	1	32	32	7	5	11	21	-	2
	Taux	11,9	12,7	37,7	2,8	3,7	13,7	8,9	15,5	11,5	15,3	15,8	-	579,7
TOTAL	**Cas**	**923**	**7**	**4**	**4**	**1**	**159**	**364**	**49**	**62**	**84**	**180**	**1**	**8**
	Taux	**6,1**	**2,5**	**5,8**	**0,8**	**0,3**	**4,3**	**6,4**	**8,6**	**12,1**	**6**	**9**	**6,5**	**24,8**

Tableau 5B

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – hommes – Canada et provinces/territoires : 1997

Groupe d'âge		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 1	Cas	6	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-
	Taux	3,3	-	-	-	-	2,3	1,4	-	59,2	-	-	-	-
1 – 4	Cas	27	-	-	-	-	3	6	-	10	1	6	-	1
	Taux	3,4	-	-	-	-	1,6	1,9	-	34	1,2	6	-	31,3
5 – 14	Cas	25	-	-	-	-	2	5	1	11	-	6	-	-
	Taux	1,2	-	-	-	-	0,4	0,6	1,2	13,5	-	2,3	-	-
15 – 24	Cas	93	1	-	1	-	17	31	7	6	6	14	-	10
	Taux	4,5	2,2	-	1,6	-	3,4	4,1	8,6	7,7	2,9	5,2	-	176,8
25 – 34	Cas	193	-	-	-	-	34	89	5	10	14	38	-	3
	Taux	8,2	-	-	-	-	6,1	9,9	5,9	14,3	6	11,9	-	45
35 – 44	Cas	158	1	-	1	-	32	70	10	4	13	25	-	2
	Taux	6,2	2,2	-	1,3	-	5	7,4	11	5	5	7,3	-	35,6
45 – 54	Cas	118	1	-	-	1	18	45	5	4	8	32	-	4
	Taux	6	2,6	-	-	1,9	3,6	6,3	7,2	6,9	4,6	12	-	109,3
55 – 64	Cas	130	1	-	-	2	24	49	5	4	8	35	-	2
	Taux	10,2	4,3	-	-	6,3	7,4	10,2	10,9	9,8	7,5	20,6	-	120,7
65 – 74	Cas	139	2	1	1	1	29	50	7	3	15	29	1	-
	Taux	14,3	12,1	22,8	3,3	4,1	12,2	13,3	18,7	8,3	19,4	21,7	173,9	-
75 +	Cas	162	2	-	-	2	41	51	7	3	17	39	-	1
	Taux	28	19	-	-	12,3	32,6	23,8	25,6	10,5	37,3	45,7	-	271,7
TOTAL	Cas	1 051	8	1	3	6	201	397	47	59	82	224	1	23
	Taux	7,1	2,9	1,5	0,7	1,6	5,6	7,2	8,3	11,6	5,7	11,4	6	64,8

Tableau 5C

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge – femmes – Canada et provinces/territoires : 1997

Groupe d'âge		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 1	Cas	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Taux	1,7	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-
1 – 4	Cas	22	-	-	-	-	3	7	1	9	-	1	-	1
	Taux	2,9	-	-	-	-	1,7	2,4	3,2	31,9	-	1,1	-	33,6
5 – 14	Cas	33	-	-	-	-	3	6	1	18	3	2	-	-
	Taux	1,7	-	-	-	-	0,7	0,8	1,2	23,1	1,4	0,8	-	-
15 – 24	Cas	121	-	-	-	-	17	56	7	13	9	17	-	2
	Taux	6,1	-	-	-	-	3,6	7,7	9,1	17,8	4,5	6,6	-	37,7
25 – 34	Cas	192	1	-	2	-	30	78	7	7	14	52	-	1
	Taux	8,3	2,3	-	2,8	-	5,6	8,7	8,6	10,2	6,2	16,8	-	15,9
35 – 44	Cas	133	1	-	1	-	28	52	9	4	12	25	-	1
	Taux	5,2	2,1	-	1,3	-	4,4	5,4	10,1	5,1	4,8	7,4	-	20,4
45 – 54	Cas	98	-	-	-	-	14	44	5	2	10	22	-	1
	Taux	5	-	-	-	-	2,7	6	7,2	3,6	5,9	8,3	-	33,9
55 – 64	Cas	98	1	1	-	-	15	35	7	1	13	24	1	-
	Taux	7,5	4,4	16,9	-	-	4,4	7	15	2,4	12,4	14,1	107,4	-
65 – 74	Cas	107	2	1	-	-	17	54	5	-	12	16	-	-
	Taux	9,4	11,1	20,3	-	-	5,8	12,3	11,3	-	14,2	10,9	-	-
75 +	Cas	116	2	2	1	1	32	32	7	5	11	21	-	2
	Taux	11,9	12,7	37,7	2,8	3,7	13,7	8,9	15,5	11,5	15,3	15,8	-	579,7
TOTAL	**Cas**	**923**	**7**	**4**	**4**	**1**	**159**	**364**	**49**	**62**	**84**	**180**	**1**	**8**
	Taux	**6,1**	**2,5**	**5,8**	**0,8**	**0,3**	**4,3**	**6,4**	**8,6**	**12,1**	**6**	**9**	**6,5**	**24,8**

Tableau 6

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance – Canada et provinces/territoires : 1997

Lieu de naissance			CANADA	Provinces/territoires												
				Total	T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés au Canada	Autochtones			ATLANTIQUE												
	Indiens inscrits	Cas	212	2	-	-	-	2	-	9	38	82	28	35	-	18
		Taux	40,6	10,2					-	8,4	48,1	113,4	37,7	36	-	144
	Indiens non-inscrits/Métis	Cas	52	3	-	-	3	-	10	1	1	24	6	6	-	1
		Taux	8,2	9,3					9,5	0,5	1,7	56,1	5,8	6,1	-	21,7
	Inuit	Cas	19	1	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	11
		Taux	32,6	11,4					60	-	111,1	-	-	-	-	42,1
	Total	**Cas**	**283**	**6**	**1**	-	**3**	**2**	**16**	**10**	**40**	**106**	**34**	**41**	-	**30**
		Taux	**23,3**	**9,9**					**9,4**	**3,3**	**29,2**	**91,7**	**18,8**	**20,7**	-	**69,3**
	Non-Autochtones	Cas	400	20	11	4	1	4	154	102	27	7	28	62	-	-
		Taux	1,7	0,9					2,4	1,3	3,1	0,8	1,3	2,2	-	-
	Total	**Cas**	**683**	**26**	**12**	**4**	**4**	**6**	**170**	**112**	**67**	**113**	**62**	**103**	-	**30**
		Taux	**2,8**	**1,1**	**2,2**	**3**	**0,4**	**0,8**	**2,6**	**1,3**	**6,7**	**11,7**	**2,6**	**3,5**	-	**46,5**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	Cas	92	1	-	-	-	1	19	52	3	-	8	9	-	-
		Taux	55,1	35,8	-	-	-	120,3	81	57,6	69,2	-	60,2	29,1	-	-
	Les Amériques	Cas	103	-	-	-	-	-	48	38	3	2	2	10	-	-
		Taux	11,8	-	-	-	-	-	39,5	8	13,1	21,9	2,9	6,2	-	-
	Méditerranée orientale	Cas	114	2	-	-	2	-	21	77	3	-	3	8	-	-
		Taux	34,1	35,6	-	-	68	-	44,5	42,6	34,6	-	11,3	12,9	-	-
	Europe	Cas	134	1	-	1	-	-	32	70	-	1	10	18	1	1
		Taux	5,4	2,5	-	45,8	-	-	9,6	5,2	-	4	5	4	63,4	65,9
	Asie du Sud-Est	Cas	197	-	-	-	-	-	22	110	2	1	7	55	-	-
		Taux	54,5	-	-	-	-	-	44,1	56	21,1	26,6	24,2	82,4	-	-
	Pacifique occidental	Cas	569	4	3	-	1	-	43	270	17	4	69	161	1	-
		Taux	51,1	21,9	138,1	-	10,4	-	27,9	44,7	58,4	34,5	77,6	78,3	142,5	-

...suite

Tableau 6 *suite*

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance – Canada et provinces/territoires : 1997

Lieu de naissance			CANADA	Provinces/territoires												
				Total	T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Lieu de naissance inconnu	Cas	62	-	-	-	-	-	2	27	1	-	5	27	-	-
		Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	Cas	1 271	8	3	1	3	1	187	644	29	8	104	288	2	1
		Taux	23,9	9,2	30	21	6,6	3,8	25,6	22,3	20,7	14,5	24,4	29,4	59,3	30,5
Lieu de naissance inconnu		Cas	21	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	13	-	-
		Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		Cas	1 975	34	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
		Taux	6,6	1,4	2,7	3,7	0,7	0,9	4,9	6,8	8,4	11,8	5,8	10,2	6,2	45,8

Tableau 6

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance – Canada et provinces/territoires : 1997

Lieu de naissance			CANADA	Provinces/territoires												
				Total	T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés au Canada	Autochtones			ATLANTIQUE												
	Indiens inscrits	Cas	212	2	-	-	-	2	-	9	38	82	28	35	-	18
		Taux	40,6	10,2					-	8,4	48,1	113,4	37,7	36	-	144
	Indiens non-inscrits/Métis	Cas	52	3	-	-	3	-	10	1	1	24	6	6	-	1
		Taux	8,2	9,3					9,5	0,5	1,7	56,1	5,8	6,1	-	21,7
	Inuit	Cas	19	1	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	11
		Taux	32,6	11,4					60	-	111,1	-	-	-	-	42,1
	Total	**Cas**	**283**	**6**	**1**	**-**	**3**	**2**	**16**	**10**	**40**	**106**	**34**	**41**	**-**	**30**
		Taux	**23,3**	**9,9**					**9,4**	**3,3**	**29,2**	**91,7**	**18,8**	**20,7**	**-**	**69,3**
	Non-Autochtones	Cas	400	20	11	4	1	4	154	102	27	7	28	62	-	-
		Taux	1,7	0,9					2,4	1,3	3,1	0,8	1,3	2,2	-	-
	Total	**Cas**	**683**	**26**	**12**	**4**	**4**	**6**	**170**	**112**	**67**	**113**	**62**	**103**	**-**	**30**
		Taux	**2,8**	**1,1**	**2,2**	**3**	**0,4**	**0,8**	**2,6**	**1,3**	**6,7**	**11,7**	**2,6**	**3,5**	**-**	**46,5**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	Cas	92	1	-	-	-	1	19	52	3	-	8	9	-	-
		Taux	55,1	35,8	-	-	-	120,3	81	57,6	69,2	-	60,2	29,1	-	-
	Les Amériques	Cas	103	-	-	-	-	-	48	38	3	2	2	10	-	-
		Taux	11,8	-	-	-	-	-	39,5	8	13,1	21,9	2,9	6,2	-	-
	Méditerranée orientale	Cas	114	2	-	-	2	-	21	77	3	-	3	8	-	-
		Taux	34,1	35,6	-	-	68	-	44,5	42,6	34,6	-	11,3	12,9	-	-
	Europe	Cas	134	1	-	1	-	-	32	70	-	1	10	18	1	1
		Taux	5,4	2,5	-	45,8	-	-	9,6	5,2	-	4	5	4	63,4	65,9
	Asie du Sud-Est	Cas	197	-	-	-	-	-	22	110	2	1	7	55	-	-
		Taux	54,5	-	-	-	-	-	44,1	56	21,1	26,6	24,2	82,4	-	-
	Pacifique occidental	Cas	569	4	3	-	1	-	43	270	17	4	69	161	1	-
		Taux	51,1	21,9	138,1	-	10,4	-	27,9	44,7	58,4	34,5	77,6	78,3	142,5	-

...suite

Tableau 6 *suite*

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance – Canada et provinces/territoires : 1997

Lieu de naissance			CANADA	Provinces/territoires												
				Total	T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Lieu de naissance inconnu	Cas	62	-	-	-	-	-	2	27	1	-	5	27	-	-
		Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**Cas**	**1 271**	**8**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**
		Taux	**23,9**	**9,2**	**30**	**21**	**6,6**	**3,8**	**25,6**	**22,3**	**20,7**	**14,5**	**24,4**	**29,4**	**59,3**	**30,5**
Lieu de naissance inconnu		Cas	21	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	13	-	-
		Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**Cas**	**1 975**	**34**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**
		Taux	**6,6**	**1,4**	**2,7**	**3,7**	**0,7**	**0,9**	**4,9**	**6,8**	**8,4**	**11,8**	**5,8**	**10,2**	**6,2**	**45,8**

Tableau 7

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Primaire	Cas	130	-	-	-	-	4	43	5	58	1	10	-	9
	Taux	0,4	-	-	-	-	0,1	0,4	0,4	5,7	-	0,3	-	13,3
Miliaire/disséminée	Cas	73	-	-	-	-	16	12	7	7	14	17	-	-
	Taux	0,2	-	-	-	-	0,2	0,1	0,6	0,7	0,5	0,4	-	-
Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Cas	1 230	9	3	6	7	250	442	60	42	108	280	2	21
	Taux	4,1	1,6	2,2	0,6	0,9	3,4	3,9	5,3	4,1	3,8	7,1	6,2	31
Méninges et CNS	Cas	25	1	-	-	-	5	10	1	-	1	7	-	-
	Taux	0,1	0,2	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	-	-
Ganglion lymphatique périphérique	Cas	266	3	1	-	-	-	160	10	7	21	63	-	1
	Taux	0,9	0,5	0,7	-	-	-	1,4	0,9	0,7	0,7	1,6	-	1,5
Autres sites*	Cas	247	2	1	1	-	82	93	13	7	21	27	-	-
	Taux	0,8	0,4	0,7	0,1	-	1,1	0,8	1,1	0,7	0,7	0,7	-	-
Inconnu	Cas	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**Cas**	**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**
	Taux	**6,6**	**2,7**	**3,7**	**0,7**	**0,9**	**4,9**	**6,8**	**8,4**	**11,8**	**5,8**	**10,2**	**6,2**	**45,7**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 8

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance, le sexe et le groupe d'âge – Canada : 1997

Lieu de naissance			TOTAL	Groupe d'âge									
				< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Nés au Canada	Autochtones												
	Indiens inscrits	Hommes	109	3	14	9	8	23	17	12	8	6	9
		Femmes	103	2	7	15	15	18	13	7	9	7	10
		Total	**212**	**5**	**21**	**24**	**23**	**41**	**30**	**19**	**17**	**13**	**19**
	Indiens non-inscrits/Métis	Hommes	23	1	1	4	4	2	2	2	6	-	1
		Femmes	29	1	4	3	7	5	1	2	3	-	3
		Total	**52**	**2**	**5**	**7**	**11**	**7**	**3**	**4**	**9**	**-**	**4**
	Inuit	Hommes	12	-	-	1	8	-	-	1	1	1	-
		Femmes	7	-	-	-	3	-	2	-	1	1	-
		Total	**19**	**-**	**-**	**1**	**11**	**-**	**2**	**1**	**2**	**2**	**-**
	Total	**Hommes**	**144**	**4**	**15**	**14**	**20**	**25**	**19**	**15**	**15**	**7**	**10**
		Femmes	**139**	**3**	**11**	**18**	**25**	**23**	**16**	**9**	**13**	**8**	**13**
		Total	**283**	**7**	**26**	**32**	**45**	**48**	**35**	**24**	**28**	**15**	**23**
	Non-Autochtones	Hommes	244	2	10	6	7	22	30	32	38	43	54
		Femmes	156	-	9	6	9	11	18	19	14	28	42
		Total	**400**	**2**	**19**	**12**	**16**	**33**	**48**	**51**	**52**	**71**	**96**
	Total	**Hommes**	**388**	**6**	**25**	**20**	**27**	**47**	**49**	**47**	**53**	**50**	**64**
		Femmes	**295**	**3**	**20**	**24**	**34**	**34**	**34**	**28**	**27**	**36**	**55**
		Total	**683**	**9**	**45**	**44**	**61**	**81**	**83**	**75**	**80**	**86**	**119**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	Hommes	48	-	-	1	5	23	13	2	3	-	1
		Femmes	44	-	-	4	9	19	3	2	4	2	1
		Total	**92**	**-**	**-**	**5**	**14**	**42**	**16**	**4**	**7**	**2**	**2**
	Les Amériques	Hommes	51	-	1	-	4	14	18	4	2	2	6
		Femmes	52	-	1	2	9	12	12	4	2	6	4
		Total	**103**	**-**	**2**	**2**	**13**	**26**	**30**	**8**	**4**	**8**	**10**

...suite

Tableau 7

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal		CANADA	Provinces/territoires											
			T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Primaire	Cas	130	-	-	-	-	4	43	5	58	1	10	-	9
	Taux	0,4	-	-	-	-	0,1	0,4	0,4	5,7	-	0,3	-	13,3
Miliaire/disséminée	Cas	73	-	-	-	-	16	12	7	7	14	17	-	-
	Taux	0,2	-	-	-	-	0,2	0,1	0,6	0,7	0,5	0,4	-	-
Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Cas	1 230	9	3	6	7	250	442	60	42	108	280	2	21
	Taux	4,1	1,6	2,2	0,6	0,9	3,4	3,9	5,3	4,1	3,8	7,1	6,2	31
Méninges et CNS	Cas	25	1	-	-	-	5	10	1	-	1	7	-	-
	Taux	0,1	0,2	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	-	-
Ganglion lymphatique périphérique	Cas	266	3	1	-	-	-	160	10	7	21	63	-	1
	Taux	0,9	0,5	0,7	-	-	-	1,4	0,9	0,7	0,7	1,6	-	1,5
Autres sites*	Cas	247	2	1	1	-	82	93	13	7	21	27	-	-
	Taux	0,8	0,4	0,7	0,1	-	1,1	0,8	1,1	0,7	0,7	0,7	-	-
Inconnu	Cas	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Cas	1 975	15	5	7	7	360	761	96	121	166	404	2	31
	Taux	6,6	2,7	3,7	0,7	0,9	4,9	6,8	8,4	11,8	5,8	10,2	6,2	45,7

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 8

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance, le sexe et le groupe d'âge – Canada : 1997

Lieu de naissance			TOTAL	Groupe d'âge									
				< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Nés au Canada	Autochtones												
	Indiens inscrits	Hommes	109	3	14	9	8	23	17	12	8	6	9
		Femmes	103	2	7	15	15	18	13	7	9	7	10
		Total	212	5	21	24	23	41	30	19	17	13	19
	Indiens non-inscrits/Métis	Hommes	23	1	1	4	4	2	2	2	6	-	1
		Femmes	29	1	4	3	7	5	1	2	3	-	3
		Total	52	2	5	7	11	7	3	4	9	-	4
	Inuit	Hommes	12	-	-	1	8	-	-	1	1	1	-
		Femmes	7	-	-	-	3	-	2	-	1	1	-
		Total	19	-	-	1	11	-	2	1	2	2	-
	Total	**Hommes**	**144**	**4**	**15**	**14**	**20**	**25**	**19**	**15**	**15**	**7**	**10**
		Femmes	**139**	**3**	**11**	**18**	**25**	**23**	**16**	**9**	**13**	**8**	**13**
		Total	**283**	**7**	**26**	**32**	**45**	**48**	**35**	**24**	**28**	**15**	**23**
	Non-Autochtones	Hommes	244	2	10	6	7	22	30	32	38	43	54
		Femmes	156	-	9	6	9	11	18	19	14	28	42
		Total	400	2	19	12	16	33	48	51	52	71	96
	Total	**Hommes**	**388**	**6**	**25**	**20**	**27**	**47**	**49**	**47**	**53**	**50**	**64**
		Femmes	**295**	**3**	**20**	**24**	**34**	**34**	**34**	**28**	**27**	**36**	**55**
		Total	**683**	**9**	**45**	**44**	**61**	**81**	**83**	**75**	**80**	**86**	**119**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	Hommes	48	-	-	1	5	23	13	2	3	-	1
		Femmes	44	-	-	4	9	19	3	2	4	2	1
		Total	92	-	-	5	14	42	16	4	7	2	2
	Les Amériques	Hommes	51	-	1	-	4	14	18	4	2	2	6
		Femmes	52	-	1	2	9	12	12	4	2	6	4
		Total	103	-	2	2	13	26	30	8	4	8	10

...suite

Tableau 8 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance, le sexe et le groupe d'âge – Canada : 1997

Lieu de naissance			TOTAL	Groupe d'âge									
				< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Méditerranée orientale	Hommes	60	-	-	1	15	17	13	3	3	6	2
		Femmes	54	-	1	-	11	19	6	7	6	3	1
		Total	114	-	1	1	26	36	19	10	9	9	3
	Europe	Hommes	82	-	-	-	4	6	6	11	13	19	23
		Femmes	52	-	-	-	2	5	8	6	8	8	15
		Total	134	-	-	-	6	11	14	17	21	27	38
	Asie du Sud-Est	Hommes	105	-	-	-	9	25	16	12	15	12	16
		Femmes	92	-	-	1	20	18	10	10	13	12	8
		Total	197	-	-	1	29	43	26	22	28	24	24
	Pacifique occidental	Hommes	268	-	1	2	28	50	37	36	36	41	37
		Femmes	301	-	-	1	34	82	58	40	30	33	23
		Total	569	-	1	3	62	132	95	76	66	74	60
	Lieu de naissance inconnu	Hommes	36	-	-	1	1	8	5	3	3	6	9
		Femmes	26	-	-	1	2	3	2	1	7	6	4
		Total	62	-	-	2	3	11	7	4	10	12	13
	Total	**Hommes**	**649**	**-**	**2**	**5**	**66**	**143**	**108**	**71**	**75**	**86**	**94**
		Femmes	**621**	**-**	**2**	**9**	**87**	**158**	**99**	**70**	**70**	**70**	**56**
		Total	**1 271**	**-**	**4**	**14**	**153**	**301**	**207**	**141**	**145**	**156**	**150**
Lieu de naissance inconnu		Hommes	14	-	-	-	-	3	1	-	2	3	5
		Femmes	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
		Total	21	-	-	-	-	3	1	-	3	4	10
TOTAL		**Hommes**	**1 052**	**6**	**27**	**25**	**93**	**193**	**158**	**118**	**130**	**139**	**163**
		Femmes	**923**	**3**	**22**	**33**	**121**	**192**	**133**	**98**	**98**	**107**	**116**
		Total	**1 975**	**9**	**49**	**58**	**214**	**385**	**291**	**216**	**228**	**246**	**279**

Tableau 9

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge et le site diagnostique principal – Canada : 1997

Groupe d'âge		TOTAL	Site diagnostique principal						
			Primaire	Miliaire/ disséminée	Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Méninges et CNS	Ganglion lymphatique périphérique	Autres sites*	Inconnu
< 1	Cas	9	8	-	1	-	-	-	-
	Taux	2,5	2,2	-	0,3	-	-	-	-
0 – 4	Cas	49	36	-	9	-	2	2	-
	Taux	3,1	2,3	-	0,6	-	0,1	0,1	-
5 – 14	Cas	58	33	-	10	1	8	6	-
	Taux	1,4	0,8	-	0,2	-	0,2	0,1	-
15 – 24	Cas	214	18	7	142	-	32	15	-
	Taux	5,3	0,4	0,2	3,5	-	0,8	0,4	-
25 – 34	Cas	385	10	11	241	7	74	41	1
	Taux	8,2	0,2	0,2	5,2	0,1	1,6	0,9	-
35 – 44	Cas	291	7	9	167	7	50	51	-
	Taux	5,7	0,1	0,2	3,3	0,1	1	1	-
45 – 54	Cas	216	6	9	119	2	35	44	1
	Taux	5,5	0,2	0,2	3	0,1	0,9	1,1	-
55 – 64	Cas	228	1	9	154	2	29	32	1
	Taux	8,8	-	0,3	6	0,1	1,1	1,2	-
65 – 74	Cas	246	4	10	175	4	21	31	1
	Taux	11,7	0,2	0,5	8,3	0,2	1	1,5	-
75 +	Cas	279	7	18	212	2	15	25	-
	Taux	18	0,5	1,2	13,7	0,1	1	1,6	-
TOTAL	Cas	1 975	130	73	1 230	25	266	247	4
	Taux	6,6	0,4	0,2	4,1	0,1	0,9	0,8	-

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 8 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance, le sexe et le groupe d'âge – Canada : 1997

Lieu de naissance			TOTAL	Groupe d'âge									
				< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Méditerranée orientale	Hommes	60	-	-	1	15	17	13	3	3	6	2
		Femmes	54	-	1	-	11	19	6	7	6	3	1
		Total	**114**	-	**1**	**1**	**26**	**36**	**19**	**10**	**9**	**9**	**3**
	Europe	Hommes	82	-	-	-	4	6	6	11	13	19	23
		Femmes	52	-	-	-	2	5	8	6	8	8	15
		Total	**134**	-	-	-	**6**	**11**	**14**	**17**	**21**	**27**	**38**
	Asie du Sud-Est	Hommes	105	-	-	-	9	25	16	12	15	12	16
		Femmes	92	-	-	1	20	18	10	10	13	12	8
		Total	**197**	-	-	**1**	**29**	**43**	**26**	**22**	**28**	**24**	**24**
	Pacifique occidental	Hommes	268	-	1	2	28	50	37	36	36	41	37
		Femmes	301	-	-	1	34	82	58	40	30	33	23
		Total	**569**	-	**1**	**3**	**62**	**132**	**95**	**76**	**66**	**74**	**60**
	Lieu de naissance inconnu	Hommes	36	-	-	1	1	8	5	3	3	6	9
		Femmes	26	-	-	1	2	3	2	1	7	6	4
		Total	**62**	-	-	**2**	**3**	**11**	**7**	**4**	**10**	**12**	**13**
	Total	**Hommes**	**649**	-	**2**	**5**	**66**	**143**	**108**	**71**	**75**	**86**	**94**
		Femmes	**621**	-	**2**	**9**	**87**	**158**	**99**	**70**	**70**	**70**	**56**
		Total	**1 271**	-	**4**	**14**	**153**	**301**	**207**	**141**	**145**	**156**	**150**
Lieu de naissance inconnu		Hommes	14	-	-	-	-	3	1	-	2	3	5
		Femmes	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
		Total	**21**	-	-	-	-	3	**1**	-	**3**	**4**	**10**
TOTAL		**Hommes**	**1 052**	**6**	**27**	**25**	**93**	**193**	**158**	**118**	**130**	**139**	**163**
		Femmes	**923**	**3**	**22**	**33**	**121**	**192**	**133**	**98**	**98**	**107**	**116**
		Total	**1 975**	**9**	**49**	**58**	**214**	**385**	**291**	**216**	**228**	**246**	**279**

Tableau 9

Taux d'incidence pour 100 000 et nombre de nouveaux cas évolutifs et de cas de rechute de tuberculose signalés selon le groupe d'âge et le site diagnostique principal – Canada : 1997

Groupe d'âge		TOTAL	Site diagnostique principal						
			Primaire	Miliaire/ disséminée	Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Méninges et CNS	Ganglion lymphatique périphérique	Autres sites*	Inconnu
< 1	Cas	9	8	-	1	-	-	-	-
	Taux	2,5	2,2	-	0,3	-	-	-	-
0 – 4	Cas	49	36	-	9	-	2	2	-
	Taux	3,1	2,3	-	0,6	-	0,1	0,1	-
5 – 14	Cas	58	33	-	10	1	8	6	-
	Taux	1,4	0,8	-	0,2	-	0,2	0,1	-
15 – 24	Cas	214	18	7	142	-	32	15	-
	Taux	5,3	0,4	0,2	3,5	-	0,8	0,4	-
25 – 34	Cas	385	10	11	241	7	74	41	1
	Taux	8,2	0,2	0,2	5,2	0,1	1,6	0,9	-
35 – 44	Cas	291	7	9	167	7	50	51	-
	Taux	5,7	0,1	0,2	3,3	0,1	1	1	-
45 – 54	Cas	216	6	9	119	2	35	44	1
	Taux	5,5	0,2	0,2	3	0,1	0,9	1,1	-
55 – 64	Cas	228	1	9	154	2	29	32	1
	Taux	8,8	-	0,3	6	0,1	1,1	1,2	-
65 – 74	Cas	246	4	10	175	4	21	31	1
	Taux	11,7	0,2	0,5	8,3	0,2	1	1,5	-
75 +	Cas	279	7	18	212	2	15	25	-
	Taux	18	0,5	1,2	13,7	0,1	1	1,6	-
TOTAL	**Cas**	**1 975**	**130**	**73**	**1 230**	**25**	**266**	**247**	**4**
	Taux	**6,6**	**0,4**	**0,2**	**4,1**	**0,1**	**0,9**	**0,8**	-

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 10

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et le site diagnostique principal – Canada : 1997

Lieu de naissance		TOTAL	Site diagnostique principal						
			Primaire	Miliaire/ disséminée	Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Méninges et CNS	Ganglion lymphatique périphérique	Autres sites*	Inconnu
Nés au Canada	Autochtones								
	Indiens inscrits	212	62	10	126	3	4	7	-
	Indiens non-inscrits/Métis	52	12	2	26	-	2	10	-
	Inuit	19	1	-	17	-	1	-	-
	Total	**283**	**75**	**12**	**169**	**3**	**7**	**17**	**-**
	Non-Autochtones	400	27	17	281	6	20	46	3
	Total	**683**	**102**	**29**	**450**	**9**	**27**	**63**	**3**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	92	1	2	54	4	16	14	1
	Les Amériques	103	1	6	68	2	4	22	-
	Méditerranée orientale	114	1	3	61	2	28	19	-
	Europe	134	6	5	83	4	13	23	-
	Asie du Sud-Est	197	3	10	117	2	44	21	-
	Pacifique occidental	569	15	14	343	1	125	71	-
	Lieu de naissance inconnu	62	1	2	37	1	9	12	-
	Total	**1271**	**28**	**42**	**763**	**16**	**239**	**182**	**1**
Lieu de naissance inconnu		21	-	2	17	-	-	2	-
TOTAL		**1975**	**130**	**73**	**1 230**	**25**	**266**	**247**	**4**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 11

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et la situation du cas – Canada : 1997

Lieu de naissance		TOTAL	Situation du cas		
			Nouveaux cas évolutifs	Cas de rechute	Situation inconnue
Nés au Canada	Autochtones				
	Indiens inscrits	**212**	181	31	-
	Indiens non-inscrits/Métis	**52**	42	10	-
	Inuit	**19**	14	5	-
	Total	**283**	**237**	**46**	-
	Non-Autochtones	**400**	355	42	3
	Total	**683**	**592**	**88**	**3**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	**92**	86	3	3
	Les Amériques	**103**	93	10	-
	Méditerranée orientale	**114**	109	5	-
	Europe	**134**	116	18	-
	Asie du Sud-Est	**197**	187	9	1
	Pacifique occidental	**569**	512	56	1
	Lieu de naissance inconnu	**62**	57	5	-
	Total	**1 271**	**1 160**	**106**	**5**
Lieu de naissance inconnu		**21**	17	3	1
TOTAL		**1 975**	**1 769**	**197**	**9**

Tableau 10

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et le site diagnostique principal – Canada : 1997

Lieu de naissance		TOTAL	Site diagnostique principal						
			Primaire	Miliaire/ disséminée	Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Méninges et CNS	Ganglion lymphatique périphérique	Autres sites*	Inconnu
Nés au Canada	Autochtones								
	Indiens inscrits	212	62	10	126	3	4	7	-
	Indiens non-inscrits/Métis	52	12	2	26	-	2	10	-
	Inuit	19	1	-	17	-	1	-	-
	Total	**283**	**75**	**12**	**169**	**3**	**7**	**17**	**-**
	Non-Autochtones	400	27	17	281	6	20	46	3
	Total	**683**	**102**	**29**	**450**	**9**	**27**	**63**	**3**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	92	1	2	54	4	16	14	1
	Les Amériques	103	1	6	68	2	4	22	-
	Méditerranée orientale	114	1	3	61	2	28	19	-
	Europe	134	6	5	83	4	13	23	-
	Asie du Sud-Est	197	3	10	117	2	44	21	-
	Pacifique occidental	569	15	14	343	1	125	71	-
	Lieu de naissance inconnu	62	1	2	37	1	9	12	-
	Total	**1271**	**28**	**42**	**763**	**16**	**239**	**182**	**1**
Lieu de naissance inconnu		21	-	2	17	-	-	2	-
TOTAL		**1975**	**130**	**73**	**1 230**	**25**	**266**	**247**	**4**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 11

Nouveaux cas évolutifs et cas de recnute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et la situation du cas – Canada : 1997

Lieu de naissance		TOTAL	Situation du cas		
			Nouveaux cas évolutifs	Cas de rechute	Situation inconnue
Nés au Canada	Autochtones				
	Indiens inscrits	212	181	31	-
	Indiens non-inscrits/Métis	52	42	10	-
	Inuit	19	14	5	-
	Total	**283**	**237**	**46**	**-**
	Non-Autochtones	400	355	42	3
	Total	**683**	**592**	**88**	**3**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique	92	86	3	3
	Les Amériques	103	93	10	-
	Méditerranée orientale	114	109	5	-
	Europe	134	116	18	-
	Asie du Sud-Est	197	187	9	1
	Pacifique occidental	569	512	56	1
	Lieu de naissance inconnu	62	57	5	-
	Total	**1 271**	**1 160**	**106**	**5**
Lieu de naissance inconnu		21	17	3	1
TOTAL		**1 975**	**1 769**	**197**	**9**

Tableau 12

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires : 1997

État bacillaire	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
1. Microscopie positive													
a. Culture positive	759	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
b. Culture négative	52	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
c. Culture non-effectuée/inconnue	142	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
Total	**953**	**7**	**2**	**3**	**6**	**201**	**378**	**51**	**30**	**61**	**199**	**1**	**14**
2. Microscopie négative													
a. Culture positive	415	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
b. Culture négative	87	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
c. Culture non-effectuée/inconnue	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Total	**506**	**2**	**3**	**3**	**1**	**90**	**95**	**41**	**37**	**78**	**139**	**1**	**16**
3. Microscopie non effectuée/inconnue													
a. Culture positive	414	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
b. Culture négative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	77	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
Total	**516**	**6**	**-**	**1**	**-**	**69**	**288**	**4**	**54**	**27**	**66**	**-**	**1**
TOTAL	**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Tableau 13

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le lieu de naissance – Canada : 1997

État bacillaire	TOTAL	Lieu de naissance			
		Nés au Canada Autochtones	Nés au Canada non-Autochtones	Nés à l'étranger	Lieu de naissance inconnu
1. Microscopie positive					
a. Culture positive	759	113	171	466	9
b. Culture négative	52	6	11	35	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	142	1	30	110	1
Total	**953**	**120**	**212**	**611**	**10**
2. Microscopie négative					
a. Culture positive	415	60	86	265	4
b. Culture négative	87	27	22	38	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	4	-	2	2	-
Total	**506**	**87**	**110**	**305**	**4**
3. Microscopie non effectuée/inconnue					
a. Culture positive	414	28	66	314	6
b. Culture négative	25	25	-	-	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	77	23	12	41	1
Total	**516**	**76**	**78**	**355**	**7**
TOTAL	**1 975**	**283**	**400**	**1271**	**21**

Tableau 12

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires : 1997

État bacillaire	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
1. Microscopie positive													
a. Culture positive	759	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
b. Culture négative	52	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
c. Culture non-effectuée/inconnue	142	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
Total	**953**	**7**	**2**	**3**	**6**	**201**	**378**	**51**	**30**	**61**	**199**	**1**	**14**
2. Microscopie négative													
a. Culture positive	415	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
b. Culture négative	87	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
c. Culture non-effectuée/inconnue	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Total	**506**	**2**	**3**	**3**	**1**	**90**	**95**	**41**	**37**	**78**	**139**	**1**	**16**
3. Microscopie non effectuée/inconnue													
a. Culture positive	414	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
b. Culture négative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	77	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
Total	**516**	**6**	**-**	**1**	**-**	**69**	**288**	**4**	**54**	**27**	**66**	**-**	**1**
TOTAL	**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Tableau 13

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le lieu de naissance – Canada : 1997

État bacillaire	TOTAL	Lieu de naissance			
		Nés au Canada Autochtones	Nés au Canada non-Autochtones	Nés à l'étranger	Lieu de naissance inconnu
1. Microscopie positive					
a. Culture positive	759	113	171	466	9
b. Culture négative	52	6	11	35	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	142	1	30	110	1
Total	**953**	**120**	**212**	**611**	**10**
2. Microscopie négative					
a. Culture positive	415	60	86	265	4
b. Culture négative	87	27	22	38	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	4	-	2	2	-
Total	**506**	**87**	**110**	**305**	**4**
3. Microscopie non effectuée/inconnue					
a. Culture positive	414	28	66	314	6
b. Culture négative	25	25	-	-	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	77	23	12	41	1
Total	**516**	**76**	**78**	**355**	**7**
TOTAL	**1 975**	**283**	**400**	**1271**	**21**

Tableau 14

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada : 1997

État bacillaire	TOTAL	Site diagnostique principal						
		Primaire	Miliaire/ disséminée	Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Méninges et CNS	Ganglion lymphatique périphérique	Autres sites*	Inconnu
1. Microscopie positive								
a. Culture positive	759	16	45	556	4	65	70	3
b. Culture négative	52	1	-	44	1	2	4	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	142	8	2	64	4	40	24	-
Total	**953**	**25**	**47**	**664**	**9**	**107**	**98**	**3**
2. Microscopie négative								
a. Culture positive	415	15	19	332	3	30	16	-
b. Culture négative	87	20	-	53	2	5	7	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	4	-	-	2	-	-	2	-
Total	**506**	**35**	**19**	**387**	**5**	**35**	**25**	**-**
3. Microscopie non effectuée/inconnue								
a. Culture positive	414	27	7	150	10	111	108	1
b. Culture négative	25	25	-	-	-	-	-	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	77	18	-	29	1	13	16	-
Total	**516**	**70**	**7**	**179**	**11**	**124**	**124**	**1**
TOTAL	**1 975**	**130**	**73**	**1 230**	**25**	**266**	**247**	**4**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 15

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Primaire	1. Microscopie positive	a. Culture positive	16	-	-	-	-	-	12	-	1	-	1	-	2
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	15	-	-	-	-	-	4	1	4	-	1	-	5
		b. Culture négative	20	-	-	-	-	3	-	4	10	-	1	-	2
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	27	-	-	-	-	1	18	-	8	-	-	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	18	-	-	-	-	-	-	-	10	1	7	-	-
	Total		**130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**43**	**5**	**58**	**1**	**10**	**-**	**9**
Miliaire/ disséminée	1. Microscopie positive	a. Culture positive	45	-	-	-	-	14	2	6	3	8	12	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	19	-	-	-	-	2	2	1	4	6	4	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**12**	**7**	**7**	**14**	**17**	**-**	**-**

...suite

Tableau 14

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada : 1997

État bacillaire	TOTAL	Site diagnostique principal						
		Primaire	Miliaire/ disséminée	Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire)*	Méninges et CNS	Ganglion lymphatique périphérique	Autres sites*	Inconnu
1. Microscopie positive								
a. Culture positive	759	16	45	556	4	65	70	3
b. Culture négative	52	1	-	44	1	2	4	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	142	8	2	64	4	40	24	-
Total	**953**	**25**	**47**	**664**	**9**	**107**	**98**	**3**
2. Microscopie négative								
a. Culture positive	415	15	19	332	3	30	16	-
b. Culture négative	87	20	-	53	2	5	7	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	4	-	-	2	-	-	2	-
Total	**506**	**35**	**19**	**387**	**5**	**35**	**25**	**-**
3. Microscopie non effectuée/inconnue								
a. Culture positive	414	27	7	150	10	111	108	1
b. Culture négative	25	25	-	-	-	-	-	-
c. Culture non-effectuée/inconnue	77	18	-	29	1	13	16	-
Total	**516**	**70**	**7**	**179**	**11**	**124**	**124**	**1**
TOTAL	**1 975**	**130**	**73**	**1 230**	**25**	**266**	**247**	**4**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

Tableau 15

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Primaire	1. Microscopie positive	a. Culture positive	16	-	-	-	-	-	12	-	1	-	1	-	2
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	15	-	-	-	-	-	4	1	4	-	1	-	5
		b. Culture négative	20	-	-	-	-	3	-	4	10	-	1	-	2
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	27	-	-	-	-	1	18	-	8	-	-	-	-
		b. Culture negative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	18	-	-	-	-	-	-	-	10	1	7	-	-
	Total		**130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**43**	**5**	**58**	**1**	**10**	**-**	**9**
Miliaire/ disséminée	1. Microscopie positive	a. Culture positive	45	-	-	-	-	14	2	6	3	8	12	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	19	-	-	-	-	2	2	1	4	6	4	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**12**	**7**	**7**	**14**	**17**	**-**	**-**

...suite

Tableau 15 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Respiratoire (pulm/ autre forme respiratoire)*	1. Microscopie positive	a. Culture positive	556	5	1	2	6	146	156	29	23	42	134	1	11
		b. Culture négative	44	-	-	-	-	6	29	1	-	-	7	-	1
		c. Culture non effectuée/inconnue	64	-	-	-	-	-	62	1	-	-	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	332	1	2	2	1	65	88	24	10	48	84	-	7
		b. Culture négative	53	1	-	1	-	9	-	3	3	9	24	1	2
		c. Culture non effectuée/inconnue	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	150	1	-	1	-	18	106	2	3	6	13	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	29	1	-	-	-	5	1	-	3	3	16	-	-
	Total		**1 230**	**9**	**3**	**6**	**7**	**250**	**442**	**60**	**42**	**108**	**280**	**2**	**21**
Méninges et CNS	1. Microscopie positive	a. Culture positive	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
		b. Culture négative	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	10	1	-	-	-	4	3	-	-	-	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Total		**25**	**1**	**-**	**-**	**-**	**5**	**10**	**1**	**-**	**1**	**7**	**-**	**-**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

...suite

Tableau 15 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Ganglion lymphatique périphérique	1. Microscopie positive	a. Culture positive	65	2	-	-	-	-	27	5	2	3	26	-	-
		b. Culture négative	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	40	-	-	-	-	-	36	2	-	-	2	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	30	-	1	-	-	-	-	2	4	9	14	-	-
		b. Culture négative	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	111	1	-	-	-	-	97	-	-	2	11	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	1
	Total		**266**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**160**	**10**	**7**	**21**	**63**	**-**	**1**
Autres sites*	1. Microscopie positive	a. Culture positive	70	-	1	-	-	31	15	2	1	6	14	-	-
		b. Culture négative	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	24	-	-	1	-	2	18	1	-	1	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	16	-	-	-	-	6	1	5	-	-	4	-	-
		b. Culture négative	7	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	108	2	-	-	-	36	56	2	3	3	6	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	16	-	-	-	-	4	1	-	2	7	2	-	-
	Total		**247**	**2**	**1**	**1**	**-**	**82**	**93**	**13**	**7**	**21**	**27**	**-**	**-**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

...suite

Tableau 15 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Respiratoire (pulm/ autre forme respiratoire)*	1. Microscopie positive	a. Culture positive	556	5	1	2	6	146	156	29	23	42	134	1	11
		b. Culture négative	44	-	-	-	-	6	29	1	-	-	7	-	1
		c. Culture non effectuée/inconnue	64	-	-	-	-	-	62	1	-	-	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	332	1	2	2	1	65	88	24	10	48	84	-	7
		b. Culture négative	53	1	-	1	-	9	-	3	3	9	24	1	2
		c. Culture non effectuée/inconnue	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	150	1	-	1	-	18	106	2	3	6	13	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	29	1	-	-	-	5	1	-	3	3	16	-	-
	Total		**1 230**	**9**	**3**	**6**	**7**	**250**	**442**	**60**	**42**	**108**	**280**	**2**	**21**
Méninges et CNS	1. Microscopie positive	a. Culture positive	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
		b. Culture négative	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	10	1	-	-	-	4	3	-	-	-	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Total		**25**	**1**	**-**	**-**	**-**	**5**	**10**	**1**	**-**	**1**	**7**	**-**	**-**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

...suite

Tableau 15 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Ganglion lymphatique périphérique	1. Microscopie positive	a. Culture positive	65	2	-	-	-	-	27	5	2	3	26	-	-
		b. Culture négative	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	40	-	-	-	-	-	36	2	-	-	2	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	30	-	1	-	-	-	-	2	4	9	14	-	-
		b. Culture négative	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	111	1	-	-	-	-	97	-	-	2	11	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	1
	Total		**266**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**160**	**10**	**7**	**21**	**63**	**-**	**1**
Autres sites*	1. Microscopie positive	a. Culture positive	70	-	1	-	-	31	15	2	1	6	14	-	-
		b. Culture négative	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	24	-	-	1	-	2	18	1	-	1	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	16	-	-	-	-	6	1	5	-	-	4	-	-
		b. Culture négative	7	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	108	2	-	-	-	36	56	2	3	3	6	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	16	-	-	-	-	4	1	-	2	7	2	-	-
	Total		**247**	**2**	**1**	**1**	**-**	**82**	**93**	**13**	**7**	**21**	**27**	**-**	**-**

* Veuillez vous référer aux notes techniques pour les définitions.

...suite

Tableau 15 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires												
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Inconnu	1. Microscopie positive	a. Culture positive	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**4**	-	-	-	-	**3**	**1**	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1. Microscopie positive	a. Culture positive	**759**	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
		b. Culture négative	**52**	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
		c. Culture non effectuée/inconnue	**142**	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	**415**	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
		b. Culture négative	**87**	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
		c. Culture non effectuée/inconnue	**4**	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	**414**	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
		b. Culture négative	**25**	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	**77**	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
	Total		**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Tableau 16

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés au Canada	Autochtones														
	Indiens inscrits														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	84	-	-	-	2	-	5	24	16	15	14	-	8
		b. Culture négative	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	49	-	-	-	-	-	-	10	14	10	7	-	8
		b. Culture négative	20	-	-	-	-	-	-	-	13	1	5	-	1
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue.	a. Culture positive	17	-	-	-	-	-	4	-	8	2	3	-	-
		b. Culture négative	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	14	-	-	-	-	-	-	-	9	-	5	-	-
	Total Indiens inscrits		**212**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**9**	**38**	**82**	**28**	**35**	**-**	**18**
	Indiens non-inscrits/Métis														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	20	-	-	1	-	3	1	-	8	5	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
		b. Culture négative	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	11	-	-	1	-	4	-	-	4	-	2	-	-
		b. Culture négative	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	7	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-
	Total Indiens non-inscrits/Métis		**52**	**-**	**-**	**3**	**-**	**10**	**1**	**1**	**24**	**6**	**6**	**-**	**1**

...suite

Tableau 15 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon l'état bacillaire et le site diagnostique principal – Canada et provinces/territoires : 1997

Site diagnostique principal	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires												
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Inconnu	1. Microscopie positive	a. Culture positive	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**4**	-	-	-	-	**3**	**1**	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1. Microscopie positive	a. Culture positive	**759**	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
		b. Culture negative	**52**	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
		c. Culture non effectuée/inconnue	**142**	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	**415**	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
		b. Culture negative	**87**	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
		c. Culture non effectuée/inconnue	**4**	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	**414**	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
		b. Culture negative	**25**	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non effectuée/inconnue	**77**	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
	Total		**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Tableau 16

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés au Canada	Autochtones														
	Indiens inscrits														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	84	-	-	-	2	-	5	24	16	15	14	-	8
		b. Culture négative	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	49	-	-	-	-	-	-	10	14	10	7	-	8
		b. Culture négative	20	-	-	-	-	-	-	-	13	1	5	-	1
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue.	a. Culture positive	17	-	-	-	-	-	4	-	8	2	3	-	-
		b. Culture négative	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	14	-	-	-	-	-	-	-	9	-	5	-	-
	Total Indiens inscrits		**212**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**9**	**38**	**82**	**28**	**35**	**-**	**18**
	Indiens non-inscrits/Métis														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	20	-	-	1	-	3	1	-	8	5	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
		b. Culture négative	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	11	-	-	1	-	4	-	-	4	-	2	-	-
		b. Culture négative	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	7	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-
	Total Indiens non-inscrits/Métis		**52**	**-**	**-**	**3**	**-**	**10**	**1**	**1**	**24**	**6**	**6**	**-**	**1**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés au Canada *(suite)*	Autochtones *(suite)*														
	Inuit														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	9	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	5
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
		b. Culture négative	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Total Inuit		**19**	**1**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**
	Total														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	113	-	-	1	2	6	6	25	24	20	16	-	13
		b. Culture négative	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	60	-	-	-	-	2	-	11	17	11	8	-	11
		b. Culture négative	27	1	-	-	-	2	-	-	14	1	5	-	4
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	28	-	-	1	-	4	4	-	12	2	5	-	-
		b. Culture négative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	23	-	-	-	-	2	-	-	14	-	6	-	1
	Total Autochtones		**283**	**1**	**-**	**3**	**2**	**16**	**10**	**40**	**106**	**34**	**41**	**-**	**30**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés au Canada *(suite)*	Non-Autochtones														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	171	4	2	1	4	92	22	8	2	8	28	-	-
		b. Culture négative	11	-	-	-	-	4	4	1	-	-	2	-	-
		c. Culture non eff./incon.	30	-	-	-	-	-	26	2	-	1	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	86	1	2	-	-	25	17	12	2	10	17	-	-
		b. Culture négative	22	-	-	-	-	8	-	3	1	4	6	-	-
		c. Culture non eff./incon.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	66	5	-	-	-	22	33	1	1	2	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	12	1	-	-	-	2	-	-	1	3	5	-	-
	Total non-Autochtones		**400**	**11**	**4**	**1**	**4**	**154**	**102**	**27**	**7**	**28**	**62**	**-**	**-**
	Nés au Canada														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	284	4	2	2	6	98	28	33	26	28	44	-	13
		b. Culture négative	17	-	-	-	-	4	4	5	-	-	3	-	1
		c. Culture non eff./incon.	31	-	-	1	-	-	26	2	-	1	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	146	1	2	-	-	27	17	23	19	21	25	-	11
		b. Culture négative	49	1	-	-	-	10	-	3	15	5	11	-	4
		c. Culture non eff./incon.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	94	5	-	1	-	26	37	1	13	4	7	-	-
		b. Culture négative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	35	1	-	-	-	4	-	-	15	3	11	-	1
	Total nés au Canada		**683**	**12**	**4**	**4**	**6**	**170**	**112**	**67**	**113**	**62**	**103**	**-**	**30**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés au Canada *(suite)*	Autochtones *(suite)*														
	Inuit														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	9	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	5
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
		b. Culture négative	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Total Inuit		**19**	**1**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**
	Total														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	113	-	-	1	2	6	6	25	24	20	16	-	13
		b. Culture négative	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	60	-	-	-	-	2	-	11	17	11	8	-	11
		b. Culture négative	27	1	-	-	-	2	-	-	14	1	5	-	4
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	28	-	-	1	-	4	4	-	12	2	5	-	-
		b. Culture négative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	23	-	-	-	-	2	-	-	14	-	6	-	1
	Total Autochtones		**283**	**1**	**-**	**3**	**2**	**16**	**10**	**40**	**106**	**34**	**41**	**-**	**30**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés au Canada *(suite)*	Non-Autochtones														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	171	4	2	1	4	92	22	8	2	8	28	-	-
		b. Culture négative	11	-	-	-	-	4	4	1	-	-	2	-	-
		c. Culture non eff./incon.	30	-	-	-	-	-	26	2	-	1	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	86	1	2	-	-	25	17	12	2	10	17	-	-
		b. Culture négative	22	-	-	-	-	8	-	3	1	4	6	-	-
		c. Culture non eff./incon.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	66	5	-	-	-	22	33	1	1	2	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	12	1	-	-	-	2	-	-	1	3	5	-	-
	Total non-Autochtones		**400**	**11**	**4**	**1**	**4**	**154**	**102**	**27**	**7**	**28**	**62**	**-**	**-**
	Nés au Canada														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	284	4	2	2	6	98	28	33	26	28	44	-	13
		b. Culture négative	17	-	-	-	-	4	4	5	-	-	3	-	1
		c. Culture non eff./incon.	31	-	-	1	-	-	26	2	-	1	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	146	1	2	-	-	27	17	23	19	21	25	-	11
		b. Culture négative	49	1	-	-	-	10	-	3	15	5	11	-	4
		c. Culture non eff./incon.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	94	5	-	1	-	26	37	1	13	4	7	-	-
		b. Culture négative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	35	1	-	-	-	4	-	-	15	3	11	-	1
	Total nés au Canada		**683**	**12**	**4**	**4**	**6**	**170**	**112**	**67**	**113**	**62**	**103**	**-**	**30**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	37	-	-	-	-	11	18	1	-	3	4	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	17	-	-	-	1	5	6	1	-	2	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	22	-	-	-	-	2	17	1	-	1	1	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Total Afrique		**92**	**-**	**-**	**-**	**1**	**19**	**52**	**3**	**-**	**8**	**9**	**-**	**-**
	Les Amériques														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	54	-	-	-	-	28	16	2	1	2	5	-	-
		b. Culture négative	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
		c. Culture non eff./incon.	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	12	-	-	-	-	6	1	-	1	-	4	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	23	-	-	-	-	9	13	1	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Total les Amériques		**103**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48**	**38**	**3**	**2**	**2**	**10**	**-**	**-**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS) *(suite)*	Méditerranée orientale														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	28	-	-	-	-	8	15	2	-	-	3	-	-
		b. Culture négative	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	24	-	-	1	-	6	11	-	-	3	3	-	-
		b. Culture négative	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	36	-	-	-	-	6	29	-	-	-	1	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Total Méditerranée orientale		**114**	**-**	**-**	**2**	**-**	**21**	**77**	**3**	**-**	**3**	**8**	**-**	**-**
	Europe														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	49	-	-	-	-	14	21	-	-	4	10	-	-
		b. Culture négative	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	39	-	1	-	-	13	16	-	-	3	5	-	1
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	33	-	-	-	-	4	25	-	1	1	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	Total Europe		**134**	**-**	**1**	**-**	**-**	**32**	**70**	**-**	**1**	**10**	**18**	**1**	**1**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	37	-	-	-	-	11	18	1	-	3	4	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	17	-	-	-	1	5	6	1	-	2	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	22	-	-	-	-	2	17	1	-	1	1	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Total Afrique		**92**	**-**	**-**	**-**	**1**	**19**	**52**	**3**	**-**	**8**	**9**	**-**	**-**
	Les Amériques														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	54	-	-	-	-	28	16	2	1	2	5	-	-
		b. Culture négative	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
		c. Culture non eff./incon.	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	12	-	-	-	-	6	1	-	1	-	4	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	23	-	-	-	-	9	13	1	-	-	-	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Total les Amériques		**103**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48**	**38**	**3**	**2**	**2**	**10**	**-**	**-**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS) *(suite)*	Méditerranée orientale														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	28	-	-	-	-	8	15	2	-	-	3	-	-
		b. Culture négative	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	24	-	-	1	-	6	11	-	-	3	3	-	-
		b. Culture négative	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	36	-	-	-	-	6	29	-	-	-	1	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Total Méditerranée orientale		**114**	**-**	**-**	**2**	**-**	**21**	**77**	**3**	**-**	**3**	**8**	**-**	**-**
	Europe														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	49	-	-	-	-	14	21	-	-	4	10	-	-
		b. Culture négative	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	39	-	1	-	-	13	16	-	-	3	5	-	1
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	33	-	-	-	-	4	25	-	1	1	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	Total Europe		**134**	**-**	**1**	**-**	**-**	**32**	**70**	**-**	**1**	**10**	**18**	**1**	**1**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS) *(suite)*	Asie du Sud-Est														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	76	-	-	-	-	14	30	-	1	3	28	-	-
		b. Culture négative	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		c. Culture non eff./incon.	23	-	-	-	-	1	21	-	-	-	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	35	-	-	-	-	4	10	2	-	3	16	-	-
		b. Culture négative	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	51	-	-	-	-	3	45	-	-	1	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	Total Asie du Sud-Est		**197**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**110**	**2**	**1**	**7**	**55**	**-**	**-**
	Pacifique occidental														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	200	3	-	-	-	18	80	4	2	18	74	1	-
		b. Culture négative	13	-	-	-	-	-	10	-	-	1	2	-	-
		c. Culture non eff./incon.	48	-	-	-	-	1	43	2	-	-	2	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	124	-	-	1	-	12	31	6	2	28	44	-	-
		b. Culture négative	28	-	-	-	-	2	-	4	-	10	12	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	134	-	-	-	-	8	105	1	-	4	16	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	22	-	-	-	-	2	1	-	-	8	11	-	-
	Total Pacifique occidental		**569**	**3**	**-**	**1**	**-**	**43**	**270**	**17**	**4**	**69**	**161**	**1**	**-**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS) *(suite)*	Lieu de naissance inconnu														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	22	-	-	-	-	1	6	-	-	1	14	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	14	-	-	-	-	1	3	1	-	3	6	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	15	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
	Total lieu de naissance inconnu		**62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**27**	**1**	**-**	**5**	**27**	**-**	**-**
	Nés à l'étranger														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	466	3	-	-	-	94	186	9	4	31	138	1	-
		b. Culture négative	35	-	-	-	-	2	28	-	-	1	4	-	-
		c. Culture non eff./incon.	110	-	-	-	-	2	103	2	-	-	3	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	265	-	1	2	1	47	78	10	3	42	80	-	1
		b. Culture négative	38	-	-	1	-	3	-	5	-	10	18	1	-
		c. Culture non eff./incon.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	314	-	-	-	-	32	247	3	1	7	24	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	41	-	-	-	-	5	2	-	-	13	21	-	-
	Total nés à l'étranger		**1 271**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS) *(suite)*	Asie du Sud-Est														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	76	-	-	-	-	14	30	-	1	3	28	-	-
		b. Culture négative	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		c. Culture non eff./incon.	23	-	-	-	-	1	21	-	-	-	1	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	35	-	-	-	-	4	10	2	-	3	16	-	-
		b. Culture négative	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	51	-	-	-	-	3	45	-	-	1	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	Total Asie du Sud-Est		**197**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**110**	**2**	**1**	**7**	**55**	**-**	**-**
	Pacifique occidental														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	200	3	-	-	-	18	80	4	2	18	74	1	-
		b. Culture négative	13	-	-	-	-	-	10	-	-	1	2	-	-
		c. Culture non eff./incon.	48	-	-	-	-	1	43	2	-	-	2	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	124	-	-	1	-	12	31	6	2	28	44	-	-
		b. Culture négative	28	-	-	-	-	2	-	4	-	10	12	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	134	-	-	-	-	8	105	1	-	4	16	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	22	-	-	-	-	2	1	-	-	8	11	-	-
	Total Pacifique occidental		**569**	**3**	**-**	**1**	**-**	**43**	**270**	**17**	**4**	**69**	**161**	**1**	**-**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Nés à l'étranger (régions de l'OMS) *(suite)*	Lieu de naissance inconnu														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	22	-	-	-	-	1	6	-	-	1	14	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	14	-	-	-	-	1	3	1	-	3	6	-	-
		b. Culture négative	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	15	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
	Total lieu de naissance inconnu		**62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**27**	**1**	**-**	**5**	**27**	**-**	**-**
	Nés à l'étranger														
	1. Microscopie positive	a. Culture positive	466	3	-	-	-	94	186	9	4	31	138	1	-
		b. Culture négative	35	-	-	-	-	2	28	-	-	1	4	-	-
		c. Culture non eff./incon.	110	-	-	-	-	2	103	2	-	-	3	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	265	-	1	2	1	47	78	10	3	42	80	-	1
		b. Culture négative	38	-	-	1	-	3	-	5	-	10	18	1	-
		c. Culture non eff./incon.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	314	-	-	-	-	32	247	3	1	7	24	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	41	-	-	-	-	5	2	-	-	13	21	-	-
	Total nés à l'étranger		**1 271**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**

...suite

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Lieu de naissance inconnu	1. Microscopie positive	a. Culture positive	9	-	-	-	-	1	2	-	-	-	6	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	6	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Total		**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**5**	**-**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**
TOTAL	1. Microscopie positive	a. Culture positive	759	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
		b. Culture négative	52	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
		c. Culture non eff./incon.	142	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	415	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
		b. Culture négative	87	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
		c. Culture non eff./incon.	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	414	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
		b. Culture négative	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	77	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
	Total		**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Tableau 17

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon la méthode de détection – Canada et provinces/territoires : 1997

Méthode de détection	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Immigration	70	-	-	-	-	-	32	-	-	10	28	-	-
Symptômes/constatations accessoires	1 560	15	5	6	7	282	626	81	68	137	313	2	18
Post-mortem	27	-	-	-	-	7	6	2	-	-	12	-	-
Suivi des contacts	105	-	-	1	-	14	17	11	25	6	18	-	13
Dépistage	129	-	-	-	-	30	46	1	28	7	17	-	-
Autre	61	-	-	-	-	24	24	1	-	-	12	-	-
Inconnu	23	-	-	-	-	3	10	-	-	6	4	-	-
TOTAL	**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Tableau 18

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon la méthode de détection et le lieu de naissance – Canada : 1997

Méthode de détection	TOTAL	Lieu de naissance					
		Nés au Canada				Nés à l'étranger	Lieu de naissance inconnu
		Indiens inscrits	Indiens non-inscrits/Metis	Inuit	Non-Autochtones		
Immigration	70	-	-	-	-	70	-
Symptômes/constatations accessoires	1 560	132	40	13	321	1 038	16
Post-mortem	27	2	-	-	8	14	3
Suivi des contacts	105	42	9	6	25	23	-
Dépistage	129	32	2	-	24	70	1
Autre	61	-	1	-	21	39	-
Inconnu	23	4	-	-	1	17	1
TOTAL	**1 975**	**212**	**52**	**19**	**400**	**1 271**	**21**

Tableau 16 *suite*

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le lieu de naissance et l'état bacillaire – Canada et provinces/territoires – Canada : 1997

Lieu de naissance	État bacillaire		CANADA	Provinces/territoires											
				T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Lieu de naissance inconnu	1. Microscopie positive	a. Culture positive	9	-	-	-	-	1	2	-	-	-	6	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	6	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-
		b. Culture négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Total		**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**5**	**-**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**
TOTAL	1. Microscopie positive	a. Culture positive	**759**	7	2	2	6	193	216	42	30	59	188	1	13
		b. Culture négative	**52**	-	-	-	-	6	32	5	-	1	7	-	1
		c. Culture non eff./incon.	**142**	-	-	1	-	2	130	4	-	1	4	-	-
	2. Microscopie négative	a. Culture positive	**415**	1	3	2	1	74	95	33	22	63	109	-	12
		b. Culture négative	**87**	1	-	1	-	13	-	8	15	15	29	1	4
		c. Culture non eff./incon.	**4**	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	3. Microscopie non effectuée/ inconnue	a. Culture positive	**414**	5	-	1	-	60	286	4	14	11	33	-	-
		b. Culture négative	**25**	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		c. Culture non eff./incon.	**77**	1	-	-	-	9	2	-	15	16	33	-	1
	Total		**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Tableau 17

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon la méthode de détection – Canada et provinces/territoires : 1997

Méthode de détection	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Immigration	70	-	-	-	-	-	32	-	-	10	28	-	-
Symptômes/constatations accessoires	1 560	15	5	6	7	282	626	81	68	137	313	2	18
Post-mortem	27	-	-	-	-	7	6	2	-	-	12	-	-
Suivi des contacts	105	-	-	1	-	14	17	11	25	6	18	-	13
Dépistage	129	-	-	-	-	30	46	1	28	7	17	-	-
Autre	61	-	-	-	-	24	24	1	-	-	12	-	-
Inconnu	23	-	-	-	-	3	10	-	-	6	4	-	-
TOTAL	**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

Tableau 18

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon la méthode de détection et le lieu de naissance – Canada : 1997

Méthode de détection	TOTAL	Lieu de naissance					
		Nés au Canada				Nés à l'étranger	Lieu de naissance inconnu
		Indiens inscrits	Indiens non-inscrits/Métis	Inuit	Non-Autochtones		
Immigration	70	-	-	-	-	70	-
Symptômes/constatations accessoires	1 560	132	40	13	321	1 038	16
Post-mortem	27	2	-	-	8	14	3
Suivi des contacts	105	42	9	6	25	23	-
Dépistage	129	32	2	-	24	70	1
Autre	61	-	1	-	21	39	-
Inconnu	23	4	-	-	1	17	1
TOTAL	**1 975**	**212**	**52**	**19**	**400**	**1 271**	**21**

Tableau 19

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose chez les Canadiens nés à l'étranger signalés selon le lieu de naissance et l'année d'arrivée au Canada : 1997

Lieu de naissance (régions de l'OMS)	TOTAL	Année d'arrivée									
		≤ 1962	1963-1972	1973-1982	1983-1992	1993	1994	1995	1996	1997	Inconnu
Afrique	92	-	2	5	32	3	6	7	15	19	3
Les Amériques	103	4	5	13	35	10	4	5	5	15	7
Méditerranée orientale	114	1	6	5	40	6	14	8	20	13	1
Europe	134	45	20	16	10	3	2	7	4	8	16
Asie du Sud-Est	197	3	14	21	61	17	9	14	24	25	9
Pacifique occidental	569	7	22	93	213	27	58	47	44	35	23
Inconnu	62	6	4	2	5	1	1	1	6	2	34
TOTAL	**1 271**	**66**	**73**	**155**	**396**	**67**	**94**	**89**	**118**	**117**	**93**

Tableau 20

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose chez les Canadiens nés à l'étranger, selon leur statut d'immigrant(e) – Canada et provinces/territoires : 1997

Statut d'immigrant(e)	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Immigrant reçu ou citoyen canadien	330	1	-	1	-	-	-	28	-	93	204	2	1
Demandeur du statut de réfugié	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-
Non-résident (visiteur, étudiant, immigrant illégal)	36	1	-	1	-	-	-	1	-	6	27	-	-
Autre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inconnu	897	-	1	-	1	187	644	-	8	4	52	-	-
TOTAL	**1 271**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**

Tableau 21

Cas de rechute de tuberculose signalés selon l'intervalle inactif – Canada et provinces/territoires : 1997

Intervalle	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 2 ans	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
2-5 ans	24	-	-	-	-	2	-	4	6	2	8	-	2
6-9 ans	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-
10-19 ans	10	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	-	-
20+ ans	67	2	1	1	1	20	-	6	3	11	18	-	4
Inconnu	88	-	-	1	-	8	70	-	-	-	9	-	-
TOTAL	**197**	**2**	**1**	**2**	**1**	**34**	**70**	**10**	**11**	**16**	**43**	**-**	**7**

Tableau 19

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose chez les Canadiens nés à l'étranger signalés selon le lieu de naissance et l'année d'arrivée au Canada : 1997

Lieu de naissance (régions de l'OMS)	TOTAL	Année d'arrivée									
		≤ 1962	1963-1972	1973-1982	1983-1992	1993	1994	1995	1996	1997	Inconnu
Afrique	92	-	2	5	32	3	6	7	15	19	3
Les Amériques	103	4	5	13	35	10	4	5	5	15	7
Méditerranée orientale	114	1	6	5	40	6	14	8	20	13	1
Europe	134	45	20	16	10	3	2	7	4	8	16
Asie du Sud-Est	197	3	14	21	61	17	9	14	24	25	9
Pacifique occidental	569	7	22	93	213	27	58	47	44	35	23
Inconnu	62	6	4	2	5	1	1	1	6	2	34
TOTAL	**1 271**	**66**	**73**	**155**	**396**	**67**	**94**	**89**	**118**	**117**	**93**

Tableau 20

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose chez les Canadiens nés à l'étranger, selon leur statut d'immigrant(e) – Canada et provinces/territoires : 1997

Statut d'immigrant(e)	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Immigrant reçu ou citoyen canadien	330	1	-	1	-	-	-	28	-	93	204	2	1
Demandeur du statut de réfugié	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-
Non-résident (visiteur, étudiant, immigrant illégal)	36	1	-	1	-	-	-	1	-	6	27	-	-
Autre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inconnu	897	-	1	-	1	187	644	-	8	4	52	-	-
TOTAL	**1 271**	**3**	**1**	**3**	**1**	**187**	**644**	**29**	**8**	**104**	**288**	**2**	**1**

Tableau 21

Cas de rechute de tuberculose signalés selon l'intervalle inactif – Canada et provinces/territoires : 1997

Intervalle	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 2 ans	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
2-5 ans	24	-	-	-	-	2	-	4	6	2	8	-	2
6-9 ans	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-
10-19 ans	10	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	-	-
20+ ans	67	2	1	1	1	20	-	6	3	11	18	-	4
Inconnu	88	-	-	1	-	8	70	-	-	-	9	-	-
TOTAL	**197**	**2**	**1**	**2**	**1**	**34**	**70**	**10**	**11**	**16**	**43**	**-**	**7**

Tableau 22

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose et nombre de diagnostics signalés selon le site diagnostique principal – Canada : 1997

	Site diagnostique principal							
	TOTAL	Primaire	Miliaire/ disséminée	Respiratoire (pulm/ autre forme respiratoire)	Méninges et CNS	Ganglion lymphatique périphérique	Autres sites	Inconnu
Nombre total de cas	**1 975**	**130**	**73**	**1 230**	**25**	**266**	**247**	**4**
Primaire	**130**	130	-	-	-	-	-	-
Miliaire/disséminée	**73**	-	73	-	-	-	-	-
Pulmonaire	**1 136**	2	11	1 123	-	-	-	-
Pulmonaire (avec silicose)	**-**	-	-	-	-	-	-	-
Pleurésie (tuberculose)	**117**	-	1	116	-	-	-	-
Autre forme respiratoire	**24**	1	1	22	-	-	-	-
Méninges et CNS	**27**	-	2	-	25	-	-	-
Ganglion lymphatique périphérique	**292**	-	3	23	-	266	-	-
Abdominale	**38**	-	2	14	-	-	22	-
Os et articulations	**74**	-	6	8	1	3	56	-
Appareil génito-urinaire	**75**	-	7	10	-	-	58	-
Autre forme non respiratoire	**136**	-	2	17	-	2	115	-
Inconnu	**4**	-	-	-	-	-	-	4
Nombre total de diagnostics	**2 123**							

Tableau 23

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés en 1996 qui sont décédés en 1996, selon la cause de décès – Canada et provinces/territoires : 1997

Cause de décès	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
La tuberculose était la cause initiale de décès	27	1	-	-	-	9	9	2	1	1	4	-	-
La tuberculose a contribué au décès mais n'était pas la cause initiale	42	-	-	-	-	13	12	-	3	7	6	-	1
La tuberculose n'a pas contribué au décès	47	1	1	-	-	10	15	1	1	5	13	-	-
La cause n'a pas été signalée	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**120**	**2**	**1**	**-**	**-**	**33**	**39**	**3**	**5**	**13**	**23**	**-**	**1**

Tableau 24

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés en 1996 qui sont décédés en 1996, selon le groupe d'âge et le sexe – Canada : 1997

Sexe	TOTAL	Groupe d'âge									
		< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Hommes	74	-	-	-	1	8	2	4	3	19	37
Femmes	46	-	-	-	1	2	3	7	7	7	19
TOTAL	**120**	**-**	**-**	**-**	**2**	**10**	**5**	**11**	**10**	**26**	**56**

N.B. : Ces chiffres sont fondés sur le nombre de décès connus au moment de la présentation du rapport.

Tableau 22

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose et nombre de diagnostics signalés selon le site diagnostique principal – Canada : 1997

	Site diagnostique principal							
	TOTAL	Primaire	Miliaire/ disséminée	Respiratoire (pulm/ autre forme respiratoire)	Méninges et CNS	Ganglion lymphatique périphérique	Autres sites	Inconnu
Nombre total de cas	**1 975**	**130**	**73**	**1 230**	**25**	**266**	**247**	**4**
Primaire	**130**	130	-	-	-	-	-	-
Miliaire/disséminée	**73**	-	73	-	-	-	-	-
Pulmonaire	**1 136**	2	11	1 123	-	-	-	-
Pulmonaire (avec silicose)	**-**	-	-	-	-	-	-	-
Pleurésie (tuberculose)	**117**	-	1	116	-	-	-	-
Autre forme respiratoire	**24**	1	1	22	-	-	-	-
Méninges et CNS	**27**	-	2	-	25	-	-	-
Ganglion lymphatique périphérique	**292**	-	3	23	-	266	-	-
Abdominale	**38**	-	2	14	-	-	22	-
Os et articulations	**74**	-	6	8	1	3	56	-
Appareil génito-urinaire	**75**	-	7	10	-	-	58	-
Autre forme non respiratoire	**136**	-	2	17	-	2	115	-
Inconnu	**4**	-	-	-	-	-	-	4
Nombre total de diagnostics	**2 123**							

Tableau 23

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés en 1996 qui sont décédés en 1996, selon la cause de décès – Canada et provinces/territoires : 1997

Cause de décès	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
La tuberculose était la cause initiale de décès	27	1	-	-	-	9	9	2	1	1	4	-	-
La tuberculose a contribué au décès mais n'était pas la cause initiale	42	-	-	-	-	13	12	-	3	7	6	-	1
La tuberculose n'a pas contribué au décès	47	1	1	-	-	10	15	1	1	5	13	-	-
La cause n'a pas été signalée	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**120**	**2**	**1**	**-**	**-**	**33**	**39**	**3**	**5**	**13**	**23**	**-**	**1**

Tableau 24

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés en 1996 qui sont décédés en 1996, selon le groupe d'âge et le sexe – Canada : 1997

Sexe	TOTAL	Groupe d'âge									
		< 1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +
Hommes	74	-	-	-	1	8	2	4	3	19	37
Femmes	46	-	-	-	1	2	3	7	7	7	19
TOTAL	**120**	**-**	**-**	**-**	**2**	**10**	**5**	**11**	**10**	**26**	**56**

N.B. : Ces chiffres sont fondés sur le nombre de décès connus au moment de la présentation du rapport.

Tableau 25

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le statut sérologique pour le VIH – Canada et provinces/territoires: 1997

Statut sérologique pour le VIH	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Positif	32	-	-	-	-	-	12	2	1	2	15	-	-
Négatif	80	1	-	-	2	-	-	38	-	13	13	-	13
Inconnu	1 863	14	5	7	5	360	749	56	120	151	376	2	18
TOTAL	**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

ANNEXE 1A

Estimations de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces/territoires : 1997

TOTAL

	CANADA	T-N	I-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
< 1	356 261	5 550	1 609	10 118	8 073	82 450	135 780	14 882	13 138	37 516	45 265	460	1 420
1 – 4	1 567 274	23 946	7 109	45 038	35 468	362 844	606 761	64 782	57 636	160 243	195 382	1 896	6 169
5 – 14	4 065 267	75 835	20 175	125 052	99 521	924 295	1 528 721	165 590	159 480	430 837	516 675	5 132	13 954
15 – 24	4 056 924	87 451	19 696	127 098	107 516	981 457	1 478 534	157 911	150 534	407 199	524 306	4 261	10 961
25 – 34	4 667 557	85 146	19 611	140 965	114 917	1 097 645	1 799 315	166 837	138 674	457 759	628 077	5 672	12 939
35 – 44	5 116 961	92 525	21 364	156 089	126 048	1 279 088	1 896 015	180 430	158 263	509 366	680 658	6 602	10 513
45 – 54	3 933 599	76 925	17 813	125 659	101 973	1 018 497	1 452 119	139 217	113 889	344 084	532 168	4 645	6 610
55 – 64	2 584 878	45 995	11 760	82 613	64 562	670 745	977 551	92 444	82 332	212 040	339 651	2 106	3 079
65 – 74	2 110 648	34 485	9 315	65 553	52 446	532 290	813 336	81 730	76 286	161 793	280 969	1 025	1 420
75 +	1 549 047	26 286	8 383	56 349	43 336	358 864	574 411	72 665	71 972	117 369	218 249	450	713
TOTAL	30 008 416	554 144	136 835	934 534	753 860	7 308 175	11 262 543	1 136 488	1 022 204	2 838 206	3 961 400	32 249	67 778

Hommes

< 1	183 619	2 786	866	5 272	4 266	42 584	69 607	7 659	6 758	19 518	23 304	254	745
1 – 4	803 182	12 384	3 681	23 033	18 280	185 055	311 245	33 146	29 441	82 364	100 399	962	3 192
5 – 14	2 084 480	38 809	10 244	64 157	50 981	472 681	784 741	84 951	81 585	221 124	265 363	2 689	7 155
15 – 24	2 075 994	44 874	10 049	64 377	55 335	503 074	754 762	81 127	77 491	209 167	267 831	2 252	5 655
25 – 34	2 359 559	42 213	9 821	70 326	58 386	561 401	901 340	85 201	69 964	233 262	318 151	2 821	6 663
35 – 44	2 561 930	45 795	10 609	77 286	62 976	644 213	941 005	90 955	80 156	259 384	340 592	3 340	5 619
45 – 54	1 963 212	38 692	8 893	62 638	51 327	505 879	719 207	69 835	57 682	175 328	267 543	2 530	3 658
55 – 64	1 274 285	23 235	5 827	40 853	31 955	326 346	480 150	45 786	40 734	106 808	169 759	1 175	1 657
65 – 74	975 160	16 547	4 382	29 884	24 109	238 649	375 383	37 532	36 182	77 497	133 664	575	756
75 +	578 135	10 504	3 081	20 678	16 325	125 794	214 403	27 392	28 496	45 570	85 331	193	368
TOTAL	14 859 556	275 839	67 453	458 504	373 940	3 605 676	5 551 843	563 584	508 489	1 430 022	1 971 937	16 801	35 468

Femmes

< 1	172 642	2 764	743	4 846	3 807	39 866	66 173	7 223	6 380	17 998	21 961	206	675
1 – 4	764 092	11 562	3 428	22 005	17 188	177 789	295 516	31 636	28 195	77 879	94 983	934	2 977
5 – 14	1 980 787	37 026	9 931	60 895	48 540	451 614	743 980	80 639	77 895	209 713	251 312	2 443	6 799
15 – 24	1 980 930	42 577	9 647	62 721	52 181	478 383	723 772	76 784	73 043	198 032	256 475	2 009	5 306
25 – 34	2 307 998	42 933	9 790	70 639	56 531	536 244	897 975	81 636	68 710	224 497	309 926	2 841	6 276
35 – 44	2 555 031	46 730	10 755	78 803	63 072	634 875	955 010	89 475	78 107	249 982	340 066	3 262	4 894
45 – 54	1 970 387	38 233	8 920	63 021	50 646	512 618	732 912	69 382	56 207	168 756	264 625	2 115	2 952
55 – 64	1 310 593	22 760	5 933	41 760	32 607	344 399	497 401	46 658	41 598	105 232	169 892	931	1 422
65 – 74	1 135 488	17 938	4 933	35 669	28 337	293 641	437 953	44 198	40 104	84 296	147 305	450	664
75 +	970 912	15 782	5 302	35 671	27 011	233 070	360 008	45 273	43 476	71 799	132 918	257	345
TOTAL	15 148 860	278 305	69 382	476 030	379 920	3 702 499	5 710 700	572 904	513 715	1 408 184	1 989 463	15 448	32 310

Source : Statistics Canada

Tableau 25

Nouveaux cas évolutifs et cas de rechute de tuberculose signalés selon le statut sérologique pour le VIH – Canada et provinces/territoires: 1997

Statut sérologique pour le VIH	CANADA	Provinces/territoires											
		T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
Positif	32	-	-	-	-	-	12	2	1	2	15	-	-
Négatif	80	1	-	-	2	-	-	38	-	13	13	-	13
Inconnu	1 863	14	5	7	5	360	749	56	120	151	376	2	18
TOTAL	**1 975**	**15**	**5**	**7**	**7**	**360**	**761**	**96**	**121**	**166**	**404**	**2**	**31**

ANNEXE 1A

Estimations de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces/territoires : 1997

TOTAL

	CANADA	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yuk.	T.N.-O.
< 1	356 261	5 550	1 009	10 118	8 073	82 450	135 760	14 082	11 118	47 510	45 265	403	1 420
1 – 4	1 507 274	23 946	7 109	45 038	35 468	362 844	646 761	64 782	57 636	160 243	195 382	1 896	6 169
5 – 14	4 065 267	75 835	20 175	125 052	90 321	923 295	1 528 721	165 580	150 880	440 837	516 675	5 132	13 934
15 – 24	4 056 924	87 451	19 096	127 008	107 316	981 457	1 478 514	157 911	150 534	407 190	524 306	4 261	10 961
25 – 34	4 667 557	85 116	19 011	140 965	111 917	1 097 615	1 709 115	166 817	138 674	457 750	628 077	5 672	12 939
35 – 44	5 116 961	92 525	21 364	156 089	126 086	1 279 088	1 896 015	180 410	158 261	509 166	680 658	6 602	10 511
45 – 54	3 933 599	76 925	17 813	125 659	101 973	1 038 497	1 452 119	139 217	111 889	344 084	512 168	4 645	6 610
55 – 64	2 584 878	45 995	11 760	82 611	64 562	670 745	977 551	92 444	82 112	212 040	319 651	2 106	3 079
65 – 74	2 110 648	34 485	9 115	65 551	52 446	542 290	811 146	81 740	76 286	161 791	280 969	1 025	1 420
75 +	1 349 047	26 280	8 183	56 449	43 116	458 864	574 411	72 065	71 972	117 169	218 249	430	711
TOTAL	30 008 416	554 144	136 835	934 534	753 860	7 308 175	11 262 543	1 136 488	1 022 204	2 838 206	3 961 400	32 249	67 778

Hommes

< 1	184 619	2 786	866	5 272	4 266	42 584	69 607	7 659	6 758	19 518	23 804	254	745
1 – 4	803 182	12 384	3 681	24 031	18 280	185 055	333 245	33 146	29 441	82 164	100 199	962	1 192
5 – 14	2 084 480	38 809	10 244	64 157	50 981	472 681	784 741	84 951	81 585	221 124	265 363	2 689	7 133
15 – 24	2 075 994	44 874	10 049	64 377	55 335	503 074	754 762	81 127	77 491	209 167	267 831	2 252	5 655
25 – 34	2 359 559	42 213	9 821	70 126	58 186	561 401	903 340	85 201	69 964	233 262	318 151	2 841	6 003
35 – 44	2 561 930	45 795	10 609	77 286	62 976	644 213	941 005	90 955	80 156	259 184	340 592	3 340	5 619
45 – 54	1 961 212	38 692	8 891	62 638	51 127	505 879	719 207	69 815	57 662	175 328	260 343	2 530	3 638
55 – 64	1 274 285	23 235	5 827	40 853	31 955	326 146	480 150	45 786	40 714	106 808	169 759	1 175	1 657
65 – 74	975 160	16 547	4 182	29 884	24 109	248 649	375 881	37 532	36 182	77 497	133 664	575	736
75 +	578 135	10 504	3 081	20 678	16 425	125 794	214 403	27 392	28 496	45 570	85 131	191	368
TOTAL	14 859 556	275 839	67 453	458 504	373 940	3 605 676	5 551 843	563 584	508 489	1 430 022	1 971 937	16 801	35 468

Femmes

< 1	172 642	2 764	743	4 846	3 807	39 866	66 153	7 223	6 380	17 998	21 961	200	675
1 – 4	704 092	11 562	3 428	22 005	17 188	177 789	295 516	31 636	28 195	77 879	94 983	934	2 977
5 – 14	1 980 787	37 026	9 931	60 895	48 340	451 014	744 980	80 629	77 295	200 713	251 312	2 443	6 799
15 – 24	1 980 930	42 577	9 047	62 721	52 181	478 383	723 752	76 784	73 043	198 032	256 475	2 009	5 306
25 – 34	2 307 998	42 903	9 190	70 839	53 731	536 214	805 775	81 616	68 710	224 497	309 926	2 841	6 276
35 – 44	2 555 031	46 730	10 755	78 803	63 072	634 875	955 010	89 455	78 105	249 982	340 066	3 262	4 894
45 – 54	1 970 387	38 233	8 920	63 021	50 846	532 618	732 912	69 402	56 207	168 756	264 825	2 115	2 972
55 – 64	1 310 593	22 760	5 933	41 760	32 607	344 599	497 401	46 658	41 598	105 232	169 892	931	1 422
65 – 74	1 135 488	17 938	4 933	35 669	28 137	293 641	435 953	44 198	40 104	84 296	147 305	450	664
75 +	970 912	15 782	5 402	35 671	27 011	234 070	360 808	43 273	43 476	71 799	132 918	257	345
TOTAL	15 148 860	278 305	69 382	476 030	379 920	3 702 499	5 710 700	574 904	513 715	1 408 184	1 989 463	15 448	32 110

Source : Statistique Canada

ANNEXE 1B

Estimations de la population, selon une origine canadienne ou lieu de naissance à l'étranger, Canada et provinces/territoires : 1997

TOTAL	CANADA	T-N	I-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
	30 008 416	554 144	136 835	934 534	733 860	7 308 175	11 262 543	1 136 488	1 022 204	2 838 206	3 961 400	32 249	67 778
Nés au Canada													
Autochtones				Région de l'Atlantique									
Indiens inscrits	522 400			19 600		54 800	107 000	70 000	72 300	74 300	97 100	5 600	12 500
INL Métis	632 800			12 100		105 000	187 600	57 200	42 800	103 400	98 300	1 700	4 600
Inuit	38 300			8 800		10 000	6 100	900	600	3 300	2 300	200	26 100
Total Autochtones	1 213 400			60 500		169 800	300 800	137 200	115 600	181 100	197 700	7 500	43 300
Non-Autochtones	23 476 747			2 232 186		6 408 919	8 067 864	859 416	851 568	2 231 442	2 782 478	21 374	21 200
Total	**24 690 147**	**544 142**	**132 064**	**2 292 886**	**888 899**	**6 578 719**	**8 368 664**	**996 616**	**967 168**	**2 412 142**	**2 980 178**	**28 874**	**64 500**
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)													
Afrique	166 966	344	153	1 465	831	23 465	90 222	4 335	1 762	13 285	30 895	105	103
Les Amériques	875 653	1 724	794	7 596	4 326	121 342	474 871	22 886	9 149	69 886	161 787	552	540
Méditerranée orientale	334 448	697	307	2 943	1 668	47 144	180 566	8 669	3 538	26 592	61 908	209	207
Europe	2 466 176	4 867	2 183	20 874	11 982	333 226	1 347 571	65 364	25 216	198 089	454 209	1 578	1 518
Asie du Sud-Est	361 357	695	326	3 117	1 778	49 848	196 311	9 475	3 757	28 883	66 716	229	223
Pacifique occidental	1 112 957	2 171	1 007	9 635	5 490	154 134	603 949	29 123	11 607	88 873	205 577	702	686
Autre inconnu	711	1	1	6	1	97	388	19	7	57	131	-	-
Total	**5 318 269**	**10 002**	**4 771**	**45 635**	**26 079**	**729 456**	**2 893 879**	**139 872**	**55 036**	**425 664**	**981 222**	**3 375**	**3 278**

Source(s) : Canada : Division de la démographie, Statistique Canada
Autochtones : Projections – Affaires indiennes et du Nord Canada
Non-Autochtones : Calculs – fondés sur les Statistiques de la Division de la démographie, Statistique Canada
Étrangers : Projections – Division de la démographie, Statistique Canada (régions de l'OMS)

ANNEXE 1B

Estimations de la population, selon une origine canadienne ou lieu de naissance à l'étranger, Canada et provinces/territoires : 1997

TOTAL	CANADA	T-N	Î-P-É	N-É	N-B	Qc	Ont	Man	Sask	Alb	C-B	Yuk	TN-O
	30 008 416	554 144	136 835	934 534	733 860	7 308 175	11 262 543	1 136 488	1 023 204	2 838 206	3 961 400	32 249	67 778
Nés au Canada													
Autochtones		Région de l'Atlantique											
Indiens inscrits	522 400		19 600			54 800	107 000	79 000	72 300	74 300	97 100	5 600	12 500
INU/Métis	632 800		32 100			105 000	187 600	57 200	42 800	103 400	98 300	1 700	4 600
Inuit	38 300		8 800			10 000	6 100	900	600	3 300	2 300	200	26 100
Total Autochtones	1 213 400		60 500			169 800	300 800	137 200	115 600	181 100	197 700	7 500	43 300
Non-Autochtones	23 476 747		2 232 386			6 408 919	8 067 864	859 416	831 568	2 231 442	2 782 478	21 374	21 200
Total	**24 690 147**		**2 292 886**			**6 578 719**	**8 368 664**	**996 616**	**947 168**	**2 412 542**	**2 980 178**	**28 874**	**64 500**
		544 142	133 064	888 899	727 781								
Nés à l'étranger (régions de l'OMS)													
Afrique	166 966	344	153	1 465	831	23 465	90 222	4 335	1 762	13 285	30 895	105	103
Les Amériques	875 633	1 724	794	7 596	4 326	121 542	474 871	22 886	9 149	69 886	161 787	552	540
Méditerranée orientale	334 448	697	307	2 943	1 668	47 144	180 566	8 669	3 538	26 592	61 908	209	207
Europe	2 446 176	4 367	2 183	20 874	11 982	333 226	1 347 571	65 364	25 216	198 089	454 209	1 578	1 518
Asie du Sud-Est	361 337	695	326	3 117	1 778	49 848	196 311	9 475	3 757	28 883	66 716	229	223
Pacifique occidental	1 112 957	2 173	1 007	9 635	5 490	154 134	603 949	29 123	11 607	86 873	205 577	702	686
Autre/inconnu	711	1	1	6	3	97	388	19	7	57	131	-	-
Total	**5 318 269**	**10 002**	**4 771**	**45 635**	**26 079**	**729 456**	**2 893 879**	**139 872**	**55 036**	**425 664**	**981 222**	**3 375**	**3 278**

Source(s) : Canada : Division de la démographie, Statistique Canada
Autochtones : Projections – Affaires indiennes et du Nord Canada
Non-Autochtones : Calculs – fondés sur les statistiques de la Division de la démographie, Statistique Canada
Étrangers : Projections – Division de la démographie, Statistique Canada (régions de l'OMS)

ANNEXE 2

Formulaire de déclaration des cas de tuberculose évolutive
Nouveaux cas et cas de rechute

N° de série _____

Pour usage interne seulement
Date de réception au LLCM: Année Mois Jour
Numéro de LLCM

Confidentiel une fois rempli

Province/Territoire/Déclaration

1. Province/territoire déclarant(e)
2. Numéro au registre (NEER)
3. Identification unique du malade (peut être le nom ou l'identificateur du malade)
4. Date de naissance: Année Mois Jour
5. Sexe: 1 M 2 F

Nom du malade

6. Nom de famille — Prénom — Nom de famille à la naissance

Domicile habituel

7. Numéro — Rue — Ville/Village — Comté et unité sanitaire — Code postal — Codes géo. PR CSD — SGC/SAC

Origine

8.
1 Indien inscrit
2 Métis
3 Inuit
Vit la plupart du temps à la réserve: 1 Oui 2 Non 9 Sans objet 9 Situation inconnue
4 Autre autochtone (préciser) _____
5 Non-autochtones né au Canada. Pour les moins de 20 ans: Pays de naissance de la mère _____ Pays de naissance du père _____
6 Né à l'étranger
(a) Pays de naissance _____
(b) Année de l'arrivée au Canada _____
(c) Situation en ce qui concerne l'immigration (Situation actuelle)
1 Immigrant/résident/citoyen reçu/citoyen canadien
2 Réfugié, demandeur du statut de réfugié
3 Non-résident (travailleur migrant, visiteur, immigrant illégal)
4 Autre (préciser) _____
9 Situation inconnue

Diagnostic

9. Date du diagnostic: Année Mois Jour

10. Diagnostic (CIM)
Énumérez les diagnostics (cochez toutes les cases qui s'appliquent)

- Pulmonaire 011.0; 011.1; 011.2; 011.3; 011.4; 011.5; 011.6; 011.7; 011.8; 011.9
  - Avec silicose: 502
- Miliaire/disséminée: 018.0; 018.8; 018.9
- Primaire: 010.0; 010.1; 010.8; 010.9
- Pleurale (tuberculeuse): 012.0
- Autre forme respiratoire: 012.1; 012.2; 012.3; 012.8; 137.0
- Système nerveux central: 013.0; 013.1; 013.8; 013.9; 137.1
- Abdominale: 014
- Ostéo-articulaire: 015.0; 015.1; 015.2; 015.7; 015.8; 015.9; 137.3
- Génito-urinaire: 016.0; 016.1; 016.2; 016.3; 016.4; 016.5; 137.2
- Ganglionnaire périphérique (non-respiratoire): 017.2
- Autre forme non respiratoire, préciser: 017.0; 017.1; 017.3; 017.4; 017.5; 017.6; 017.7; 017.8; 137.4

Sanitary Status

11. Cochez toutes les cases qui s'appliquent:

	Microscopie: Diagnostic clinique	Microscopie: Lésions du tissu bronchique	Microscopie: Lésions du tissu pulmonaire	Microscopie: Preuve sans précision	Microscopie: Ulcère	Microscopie: CSF	Microscopie: Autre	Culture: Diagnostic clinique	Culture: Lésions du tissu bronchique	Culture: Lésions du tissu pulmonaire	Culture: Preuve sans précision	Culture: Ulcère	Culture: CSF	Culture: Autre
Négatif														
Positif														
Non effectué/ inconnu														

12. Critères de diagnostic
1 Culture positive
2 Culture négative, diagnostic clinique

13. Antibiorésistance de la première culture positive:
1 Oui – (cochez toutes les réponses pertinentes) 1 INH 2 SM 3 EMB 4 RMP 5 PZA 6 Autre (préciser) _____
2 Non 9 Situation inconnue

14. Date du début du traitement: Année Mois Jour

15. Médicaments prescrits initialement (cochez toutes les réponses pertinentes)
1 INH 2 SM 3 EMB 4 RMP 5 PZA 6 Autre (préciser) _____ 7 Aucun médicament prescrit 9 Situation inconnue

16. Méthode de détection:
1 Symptômes compatibles avec le lieu du diagnostic
2 Détection fortuite
3 Autopsie
4 Enquête auprès des contacts
5 Surveillance après l'octroi du droit d'établissement
6 Évaluation avant l'octroi du droit d'établissement (au Canada)
7 Programme de dépistage en lieu de travail
8 Autre dépistage
9 Autre (préciser) _____
10 Méthode inconnue

17. Premier épisode de tuberculose
1 Oui 2 Non
Dans le cas de réponse négative: (a) Année du diagnostic précédent _____
(b) Diagnostic précédent posé:
1 Au Canada 2 À l'étranger: _____
(c) Traitement précédent (énumérez tous les antibiotiques administrés)
1 INH 2 SM 3 EMB 4 RMP 5 PZA 6 Autre (préciser) _____

18. Décès du malade avant la fin du traitement
1 Oui 1 La tuberculose est la cause du décès
2 La tuberculose a contribué au décès, mais n'en est pas la cause première
3 La tuberculose n'a pas contribué au décès et a été constatée fortuitement
Date du décès: Année Mois Jour
2 Non 3 Sans objet 9 Situation inconnue

19. Test de dépistage du VIH positif
1 Oui
2 Non
9 Situation inconnue

HCSC 4566f (01-97) — AVAILABLE IN ENGLISH

ANNEXE 3
NOTES TECHNIQUES

MÉTHODOLOGIE ET RAPPORT SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES

Collecte des données

Le Système canadien de déclaration de la tuberculose, maintenu par la Division de la lutte antituberculeuse du Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, Santé Canada, s'appuie sur les données des registres provinciaux et territoriaux sur la tuberculose, sur lesquelles repose le système de lutte antituberculeuse dans chaque province et territoire. Le système de déclaration vise à obtenir des renseignements sur chacun des nouveaux cas évolutifs et cas de rechute chez des résidents du Canada et chez les visiteurs. Dans toutes les provinces et les territoires, des lois obligent les médecins, les laboratoires et les autres autorités sanitaires à déclarer systématiquement les cas de tuberculose à un bureau de lutte antituberculeuse. Dans la plupart des provinces et territoires, les renseignements sur les cas sont recueillis au moyen d'une formule de déclaration normalisée (voir l'annexe 2), puis ils sont communiqués annuellement à la Division de la lutte antituberculeuse.

Les renseignements visent à déterminer l'âge, le sexe, le lieu de résidence, l'origine autochtone, le pays de naissance, le diagnostic et l'état bactériologique. Le Comité canadien de lutte antituberculeuse est responsable de déterminer le contenu de la base de données. Les modifications récemment apportées ont permis d'ajouter des renseignements plus détaillés sur les populations à risque élevé, les méthodes de détection des cas, la résistance aux antibiotiques, la date du traitement, les médicaments prescrits, les antécédents tuberculeux et, dans le cas des personnes décédées, des renseignements sur la cause et la date du décès.

Des rapports de cas sont remplis dans les registres provinciaux et territoriaux, où l'on indique les codes pertinents pour le diagnostic (au moyen de la CIM-9), le lieu de résidence, le lieu de naissance et d'autres éléments. Certaines provinces ont informatisé leurs données, et quatre provinces envoient actuellement leurs données sous forme électronique.

Traitement des données

Les avis de déclaration de cas reçus par la Division de la lutte antituberculeuse sont enregistrés, examinés afin de vérifier s'ils sont complets et fondés, puis ils sont classés. Les données sont entrées dans l'ordinateur, sous une forme normalisée, les contrôles de validité et de corrélation faisant partie intégrante des programmes de saisie des données. Les listes de cas, de même que les questions découlant des rejets à la vérification, sont retournées annuellement aux directeurs provinciaux et territoriaux, qui les examineront, corrigeront les erreurs et veilleront à ce que les listes de cas pour l'année soient complètes.

Calcul des taux

Les taux utilisés dans le présent rapport ont été calculés à partir des estimations de la population fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada, et par les Affaires indiennes et du Nord Canada (voir les annexes 1A et 1B). Les estimations de la population ont été rajustées pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement et elles comprennent les résidents non permanents. Pour plus de renseignements, voir les «Estimations de la population» dans la section Définition des termes et la référence[1]. En raison du rajustement des estimations de la population et de la mise à jour du nombre de cas déclarés dans certaines provinces, le nombre de cas et les taux présentés dans ce rapport pourraient être légèrement différents de ceux présentés dans des rapports antérieurs.

Qualité des données

Plusieurs aspects de la qualité des données influent sur l'utilité de ces dernières : l'exhaustivité des données recueillies (ou de la couverture), l'exhaustivité de chacune des réponses, l'exactitude ou la validité des réponses, et l'actualité des données.

La couverture assurée par le Système canadien de déclaration de la tuberculose n'a pas expressément fait l'objet d'un examen à l'échelle nationale, bien que certains éléments indiquent que la couverture peut varier d'un bureau provincial et territorial de lutte antituberculeuse à l'autre selon leur vigilance à rechercher les cas de tuberculose.

L'un des types d'erreur de couverture est dû à la prise en compte, dans le système national, de cas qui ne répondent pas aux critères d'inclusion prévus au titre de la définition de cas ou du statut de résident au Canada. De plus, les tableaux présentés dans les rapports annuels peuvent être incomplets, étant donné que les avis de déclaration de cas reçus après la date d'échéance prévue ne sont pas pris en compte. Dans le présent rapport, les données pour 1996 diffèrent légèrement de celles présentées dans des rapports antérieurs. Ces différences s'expliquent par la mise à jour des données sur les cas déclarés.

En ce qui concerne les cas signalés à la Division de la lutte antituberculeuse, les données de base sont pratiquement complètes. Les rapports sont moins complets dans le cas des éléments de données ajoutés en 1997.

Il faudrait tenir compte de certaines limites lorsqu'on utilise et interprète les données. En effet, pour la variable concernant «l' origine», les définitions «d' Indien inscrit», «d' Indien non inscrit ou Métis» «d'Inuit» et «Autre» prévues sur les avis de déclaration de cas peuvent ne pas correspondre exactement aux définitions utilisées à des fins de recensement ou par les Affaires indiennes et du Nord Canada à des fins d'évaluation de ces populations. De plus, les expressions «nouveau cas évolutif» et «cas de rechute» peuvent être interprétées différemment selon les provinces ou territoires; les définitions de ces expressions ont été révisées, et les nouvelles définitions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997 (voir la section Définition des termes).

En outre, alors que les données contenues dans le présent rapport sont généralement présentées dans les tableaux selon l'année du diagnostic, depuis 1990, les données pour l'Ontario l'ont été selon la date de l'épisode (soit la date la plus proche de la date du début de la maladie). Depuis 1997, les données du Québec ont été présentées selon la date signalée.

Autres sources de renseignements

Outre ces données annuelles sur les nouveaux cas évolutifs de tuberculose et cas de rechute au Canada, le nombre de cas de tuberculose sont présentés mensuellement, selon la date du diagnostic, la province, le groupe d'âge et le sexe dans le «Sommaire des maladies à déclaration obligatoire» publié dans le *Relevé des maladies transmissibles au Canada*.

Bien que ce sommaire fournisse des renseignements pertinents, les données annuelles regroupées sur les nouveaux cas évolutifs et cas de rechute contenues dans le présent rapport doivent être considérées comme étant la source d'information la plus fiable sur la tuberculose au Canada.

DÉFINITION DES TERMES

Registre de la tuberculose

Le service central dans la province et le territoire qui reçoit, enregistre et accumule des renseignements sur tous les cas de tuberculose déclarés, assure le suivi de ces cas et tient un registre des personnes atteintes de tuberculose.

Avis

La réception d'un rapport concernant un nouveau cas évolutif de tuberculose ou cas de rechute, selon la définition de cas de tuberculose.

Définition de cas de tuberculose

En vigueur à compter du 1er janvier 1997

I Définition des cas de tuberculose enregistrés dans le Système canadien de déclaration de la tuberculose

a. Cas pour lesquels le complexe *Mycobacterium tuberculosis* (c.-à-d. *M. tuberculosis*, *M. bovis* [sauf la souche BCG] ou *M. africanum*) est mis en évidence par culture,

OU

b. Si on ne possède pas de preuves bactériologiques, cas présentant des signes manifestes d'activité, par exemple, ceux pour lesquels :

i les modifications de la radiographie des poumons sont compatibles avec le diagnostic de tuberculose évolutive, y compris la pleurésie idiopathique avec épanchement;

ii le diagnostic de tuberculose extrapulmonaire évolutive (méninges, os, rein, ganglions lymphatiques périphériques, etc.) a été posé;

iii l'examen microscopique de prélèvements ou l'autopsie confirme le diagnostic de tuberculose évolutive

Remarque : Les méthodes relevant de la biologie moléculaire sont des instruments de recherche et ne sont pas incluses dans la definition.

II Les cas de tuberculose diagnostiqués au Canada incluent tous les cas, à savoir ceux diagnostiqués chez les personnes nées au Canada, les immigrants, les réfugiés, les personnes demandant le statut de réfugié, les étudiants, les visiteurs, les travailleurs migrants et les immigrants illégaux.

Visiteurs = les personnes non canadiennes, titulaires ou non d'un visa, qui voyagent, s'arrêtent en chemin au Canada.

III Nouveaux cas de tuberculose et cas de rechute (réactivation)

Nouveau cas : Aucune preuve accompagnée de pièces justificatives ni antécédent de tuberculose évolutive antérieure.

Rechute (réactivation) : Preuve accompagnée de pièces justificatives ou antécédents de tuberculose évolutive antérieure.

Tuberculose inactive :

a. Cultures de *Mycobacterium tuberculosis* négatives depuis au moins six mois,

OU

b. En l'absence de cultures, radiographie pulmonaire (ou autre), stable depuis au moins six mois.

Classification diagnostique

La classification utilisée est la *Classification internationale des maladies*, 9e édition. Jusqu'à cinq diagnostics par cas sont capturés et présentés sous forme de «Site diagnostique principal» selon l'hiérarchie suivante : Primaire, Miliare, Respiratoire (pulm/autre forme respiratoire), Méninges et CNS, Ganglion lymphatique périphérique et Autres sites. D'après cette classification, un cas peut comporter plus d'un diagnostic.

Décès

Le présent rapport contient des statistiques sur les décès, tirées du Système canadien de déclaration de la tuberculose, qui tient compte de nouvelles questions depuis 1990 concernant les décès enregistrés comme des cas de tuberculose évolutive. Ces statistiques sont présentées dans les tableaux 23 et 24 et sont fondées sur l'état du patient au moment de la déclaration du cas (pour l'Ontario, elles sont fondées sur la «date de l'épisode»).

Estimations de la population

En 1993, Statistique Canada a préparé une nouvelle série d'estimations de la population qui comprennent les résidents non permanents et qui ont été rajustées pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement. Les séries pour les provinces et les territoires comprennent les estimations annuelles de la population depuis 1971.

Dans le présent rapport, les estimations de la population globale de 1997 pour le Canada et les provinces/territoires selon le sexe et le groupe d'âge sont fondées sur les données de recensement de 1996 ajustées.

Les estimations de la population d'origine autochtone au Canada sont fondées sur les Prévisions d'une population d'ascendance autochtone, Canada, Provinces/Régions et Territoires, 1991-2016 (Statistique Canada), et les Projections démographiques des Indiens inscrits, 1991-2015 (Affaires indiennes et du Nord Canada).

Les estimations de la population née à l'étranger sont fondées sur les données de recensement de 1996 (Statistique Canada).

Les estimations de la population née au Canada sont calculées en soustrayant les chiffres de recensement (1996) de la population née à l'étranger à partir des projections démographiques de 1996 (Statistique Canada).

Les estimations de la population canadienne non autochtone sont calculées en soustrayant le total des estimations de la population autochtone du total des estimations de la population née au Canada.

Population
Les personnes dont le lieu habituel de résidence se trouve dans une région du Canada, de même que celles qui sont considérées comme des résidents non permanents. Pour les années de recensement, il s'agit de la population recensée, rajustée pour tenir compte du

sous-dénombrement net du recensement, tandis que pour les années intercensitaires, on utilise les estimations de la population.

Résidents non permanents
Les cinq groupes suivants, qui constituent ce qu'on définit comme résidents non permanents, ont été ajoutés à la population visée par le recensement en 1991 : les personnes qui demandent le statut de réfugié, les personnes qui détiennent un permis de séjour pour étudiants, les personnes qui détiennent un permis de travail, les personnes qui détiennent un permis ministériel et toutes les personnes à charge des personnes énumérées précédemment non natives du Canada.

Sous-dénombrement net de la population
La différence entre le taux de sous-dénombrement et le taux de surdénombrement : le premier concerne les personnes qui n'ont pas été recensées mais qui étaient visées par le recensement, tandis que le deuxième concerne les personnes qui n'auraient pas dû être recensées ou qui l'ont été plus d'une fois. Le taux de sous-dénombrement dépasse le taux de surdénombrement, à quelques exceptions près, à tous les niveaux de désagrégation démographique et géographique.

Renseignements supplémentaires

On peut obtenir, sur demande, des renseignements supplémentaires sur les définitions utilisées et les instructions relatives au codage auprès de la Division de la lutte antituberculeuse, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Santé Canada. La terminologie médicale concernant les aspects bactériologiques, le diagnostic, la propagation, le traitement, la prévention et le dépistage de la tuberculose, ainsi que de la lutte contre cette maladie est bien expliquée dans les *Normes canadiennes pour le traitement de la tuberculose*, 4e édition, 1996, disponible à l'Association pulmonaire du Canada[2].

Références

(1) *Statistiques démographiques annuelles*. Statistique Canada, Catalogue 91-213.
(2) *Normes canadiennes pour le traitement de la tuberculose. 4e édition*, Association pulmonaire du Canada, Ottawa, 1996.